

2012 Februári kedvencünk: a gyöngy dánió



2012. Év díszhala második legnagyobb esélyese.

Az utóbbi pár évek legfelkapottabb nanohala.

A legújabban felfedezett fajok legkeresettebbike.

És még sokáig sorolhatnám a jelzőit február hó díszhalának!



Danio margaritatus - gyöngy dánió

A gyöngy dániónak magyar nyelven több szinonimája is ismeretes. Ezek között szerepel például a tejút dánió vagy a galaxy razbóra, hogy csak a gyakoribbakat említsem! Latin tudományos neve *Danio margaritatus*. Több latin névváltozáson esett már át, először *Microrasbora sp. galaxy*-ként ismerhettük meg, majd a *Celestichthys margaritatus* következett. Ezek után állapotodott csak meg jelenleg elfogadott, végleges nemében, ami a *Danio*-k közé sorolja.

Danio margaritatus

Feltételezem, a legtöbben már ráismertek, a tél utolsó hónapjában nem más hal kerül a középpontba, mint a gyöngy dánió (*Danio margaritatus*), közismertebb nevén a galaxy razbóra!

Úgy döntöttünk, hogy az Év díszhala pályázat esélyeseit nem hagyjuk figyelmen kívül, hiszen sokan űrájuk szavaztak, így számottevőbb érdeklődésre tarthatnak számot. És mint egy elégtételt véve, bár Év díszhalai nem lehettek, a Hónap hala címet viszont mindegyikük megkaphatja, ezért sincsenek vesztesek a mi mezőnyünkben!

No de lássunk is hozzá témánkhöz:

2006-ban találták meg az Inle-tóban, ahonnét például a vörösrú gyémántrazbóra is származik. Leírója Roberts volt. A *M. sp. galaxy* nevet felfedezésekor kapta, a *Celestichthys*ek közé 2007-ben került, majd a pontos DNS-vizsgálatoknak hála véglegesítették (legalábbis egyelőre) helyzetét 2008-ban. Hazánkban aránylag újdonságnak számít, csak néhány éve kapható. Sajnos elterjedését némiképp gátolja, hogy 600 és 1000 Ft közötti ára van egy darabnak ezen fajból, és igenis nagy rajt igényel, hogy egyáltalán mutasson is... Ennek ellenére népszerű, közkedvelt és aránylag jól eladható hal.



Danio margaritatus - gyöngy dánió

A nőstények tompább, kevésbé hivalkodóbb színezetűek, mint a hímek, illetve ők jóval „kövérebbek” az ikrateltség végett. Színezete elképesztő, kékesfekete és aranyszürkésbarna árnyalatok alkotják alapszínezetét, amin egy galaxishoz hasonlóan vannak gyémántfényű kis foltocskák. Az úszók vörös csíkozásúak! Csapatban pompás látvány nyújt, nem véletlenül nagy kedvenc világszerte!



Danio margaritatus - gyöngy dánió

Napjainkban oly divatosak lettek a 30-40 literes, kis kocka alakú medencék. Garnélák, csigák és egy, esetleg kétféle hal alkotja a dús növényzetű élő sarok lakosságát. Nem kell nagy hely, sem technika eme akváriumoknak, bármelyik íróasztalon elférnek. És igen, a gyöngy dánió kiszorította

gyakorlatilag minden eddigi nano-akvárium-lakót jól megérdemelt helyéről. Persze, ez nem azt jelenti, hogy senkinek nem kell törperazbóra, Endler-guppi és más hasonló fajok, de messze a galaxy a tán legkeresettebb.

Mindösszesen 2-3 cm-re nő meg, így 30-40 literes medence már bőségesen elegendő lehet gondozására. 40 literre úgy körülbelül 6-8 darab halat számíthatunk. Érdekes legalább 8, sőt akár 10 fölötti példányszámban tartani, különben színezete nem lesz olyannyira tündöklő, és félénken fog a növények közt bujkálni. Ettől függetlenül a dús növényzet messzemenőig fontos. Ajánlott, célszerű fekete kavicsaljatot tölteni medencéjébe. Amennyiben nem lesznek bajuszos, talajtúró fajok, bár nem a legtermészetesebb, fekete bazaltzúzalékot helyezünk alulra, fekete háttérrel kerítsünk, növényesítsünk dúsán, és szórt megvilágítással emeljük még inkább színeit. Egy több hím is tartalmazó csapat apróbb erőfitogtatásai során elképesztő színeket produkálnak; csapatban!



Danio margaritatus - gyöngy dánió

Nagyon békés rajhal. Persze lehet 40-50 literben már társítani is, de ha ez a társítás harcsákat, csíkokat is tartalmaz, akkor viszont a bazalttalajt kerülni célszerű. Ebben az esetben már törpe *Corydorasok* (*pygmaeus*, *habrosus*, *hastatus*), és *Otocinclusok* gond nélkül tarthatóak vele. Csigák, garnélák alapvető társai. Minden féle-fajta problémától mentesen társíthatjuk más törpe pontyfélékkel (törperazbórak, *Microrasbora*-k, stb.),

illetve például *Pseudomugil* fajokkal is. Nagybacska halak tápláléknak tekintik még a kifejlett egyedeket is, ezért hasonló méretű fajok társaságát részesítjük előnyben.

Nem annyira melegigényes, 24-26 C-al megelégszik. A pH érték az enyhén savas és enyhén lúgos között változhat nyugodtan, 5,5-7,5 problémamentes. Az nk-értéket, vagyis a vízkeménységet mérsékelten lágyan próbáljuk tartani, úgy 5 és 15 között. Érdekes erősebben szűrt kristálytisza, oxigéndús medencébe helyezni. Betegségekre különösebb érzékenysége nincsen. Vizét kezelhetjük égartobozzal, tőzeggel, vagy *Tebang*-levéllel. Ezek elszínezik a vizet teaszínűre, és kellően savasíthatják is. A *Tebang*-levél (indiai mandulafa – *Terminalia cattapa*) ezen felül még egy kis fertőtlenítő antibakteriális hatással is van, a garnélák például szívesen fogyasztják.

A berendezésre különösebben nem igényes, lehetnek kövek, fák, tetszés szerint. A dús növényzetre ügyeljünk, elől kis úszóteret hagyva.



Danio margaritatus - gyöngy danió

Mint írtam, akváriumban tenyésztethető. Dús növényzetű akváriumban, ahol csak őbelőlük van nagy raj, és apró eleséget kapnak, amiből esetleges kicsiknek is jut, akkor biztosan ráakadunk néha 1-1 porontyra, amik így is felcseperedtek. Tervezett tenyésztéssel viszont még több eredményt érhetünk el. Kis tenyészakváriumba beállítjuk a vizet. A lágy

víz mindig jól jön. Jávai mohával kibéleljük, esetleg ikrarácsot, perlonvattát használunk (a moha a legjobb tán). A szülőket este tesszük ki, másnap hajnalban már akár ívhatnak is. Akár párban, akár csapatban tenyésztethetők. Az ikráikat (úgy 30 db átlagosan) a növénybe rejtjük, de érdemes őket ívás után kihalászni, és visszahelyezni tartó medencéjükbe, mivel veszélyt jelenthetnek ivadékaikra. Ha 24-25 C-t állítunk be, néhány nap múlva már ki is kelnek, két héttel az elúszás után színesednek. Kezdetben apró élő eleséggel próbálkozzunk (frissen kelt *artemia*, papucsállatka), vagy folyékony ivadéktáppal. Az *infusoriás*odásra érzékenyen reagálhatnak, ezért a tojássárgáját lehetőleg kerüljük. Később apró, por finomságú eleséget, *artemiát* kapjanak, ezek után etethetők csak őrölt lemezes tápokkal.

Jól beszerezhető, kedvelt divathal. Tartása nem túl problémás, ezért nem kell túlságosan tapasztaltnak lenni hozzá.

Mindenkinek sok szerencsét és sikert kívánok eme pompás kis lények eredményes gondozásához, esetleg tenyésztéséhez!

Danio margaritatus - Gyöngy danió:

Robbentó	ELŐFÉLŐ:
Cyprinidae	CSALÁD:
2-3	MÉRET:
24-26	°C:
5,8-7,5	°pH
2-10	°Nk:
45 liter	HELYIGÉNY:
békes,	VISSZAKEDÉS:
mindenféle	TÁPLÁLÉK:
HOLGARTÓZKODIK?:	
3-4	ÉLETTARTAM:
TERMÉSZETV. BES.:	

**TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE :**



Danio margaritatus - gyöngy dánió elterjedési területe (distribution map)

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A gyöngy dánió nevét gyöngyház módjára csillogó, színjátzó színeiről kapta, és emiatt is vált az egyik legvonzóbb akvárium halunkká. Háta zöldes, a kékes-lilás alapszínű gyöngyházfénnyel ragyogó - a dánió-félék között kissé tömzsinek ható - testét narancssárga-vörösen irizáló aranyszínű pettyek ékesítik. Úszói vörösen és feketén csíkozottak, mely színek a villásalakú farokúszón is fellelhetők, de itt a vörös szín mintha faroklapát folytatását imitálná. Páros bajusza van. Ivari különbségek: A hímek karcsúbbak és színeesebbek a nőstényeknél, akik általában kisebbek is náluk (1,5 cm-esek). A nőstények az ikrák miatt teltebb alakúak, és a hasukon világos folt figyelhető meg. A hímek száján apró feketeszínű pontok találhatóak, mely jegy a nőstényeken nem fellelhető. Szaporodási időszakban a hímek színei felerősödnek, a nőstények ivarnyílásánál pedig egy sötét folt jelenik meg. A kezdetben csíkos fiatal halakon fokozatosan jelenik meg a jellegzetes csillag mintázat. Természetes élőhelyén néhol előfordul egy sárgás-okker színű változata, az úgynevezett "sárga gyöngy dánió".

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Mivel jellegzetes csapathal, legalább 8-10 példányt tartunk belőlük. Szeretik a világos, sok növényzettel ellátott kristálytisza vizű akváriumot. Nem túl igényes faj, de ha szaporítani szeretnénk, ezt elő kell segítenünk néhány dologgal. Biztosítsuk számára hazájában leginkább megszokott vízkörülményeket (azért leginkább, mert élőhelyén eléggé kiszámíthatatlan a vízjárás), melyet félkemény jellegűre (pl. ozmó- és csapvíz keveréke) és 24 °C körüli hőmérsékletűre állítsunk be. Ez ugyan javasolható, de ha nem áll rendelkezésünkre ozmó berendezés, a jól előkészített csapvízben is vidáman megvannak. Kisebb hőmérséklet ingadozásra sem érzékenyek. Kitűnően társítható más, békés természetű, hasonló méretű fajokkal, úgymint más dánió fajok, pontylazacok, törperazbórák. Akváriumát jól takarjuk le, mert hajlamos az ugrálásra. Táplálása nagyon fontos, adjunk számukra minél több és változatosabb élő eleséget (planktonikus táplálékot, artemiát, mikrót, stb.), amit bátran kiegészíthetünk kiváló minőségű száraztáppal is. Naponta kétszer etessük őket. Megfelelően tartott halaink akár a közös medencében is leívnak, de ha szaporításával jó eredményeket akarunk elérni (ami erősen ajánlott, hiszen eredeti élőhelyükön - pont az akvaristáknak való féktelen gyűjtés miatt - létszámuk alaposan megcsappant), akkor külön ívassuk le őket. Ehhez szükségünk lesz egy kb. 15 literes medencére, melybe szivacs szűrőt, fűtőtestet és ívató növényt (jávaimohát, Myriophyllumot, egyéb finomgyökerű vagy levelű növényt) helyezünk el. Nagyon fontos, hogy olyan helyre állítsuk a tenyészmedencét, ahol a reggeli fény közvetlenül éri azt. A víz paramétereit 8 °Nk körülire, semleges Ph-júra, a hőmérsékletet 25-26°C-osra állítsuk be. Párosával szaporíthatjuk, egy élénk színű hímmel egy jól beikrásodott nőstényt helyezünk át az előkészített medencébe. Általában már másnap elszórják ikráikat, melyek száma nagyjából 30 lehet. A lárvák kb. 3-4 nap alatt kelnek ki, majd elúszás után apró élőeleséggel (papucsállatkák, infuzórium) vagy púder minőségűre tört jó minőségű száraztáppal indíthatók. Jó megvilágításról és kétóránkénti etetésükről gondoskodjunk. Ha egy kicsit megnöttek *Artemia* naupliuszaival kínáljuk meg az

ivadékok. 3 hónapos korukra színezetük kifejlődik. Színeik is csak csapatban, dús növényzet és sötét talaj esetén mutatkoznak igazán. Égertobozzal vagy tebang-levéllel kezelhetjük vizüket! Új faj, csupán pár éve fedezték fel! Sajnos elterjedésének drága ára is határt szab, de ennek ellenére mégis szinte rohamos a kereslet iránta. Ez odáig vezet sajnos, hogy élőhelyén a faj egyre inkább fogyatkozik, fennáll a veszélyeztetetté válás veszélye is. **EGYÉB ELNEVEZÉSEK:**

tejút danió, galaxy danió, galaxy razbóra; **syn:** *Celestichthys margaritatus*, *Microrasbora sp.* "Galaxy", *Rasbora toei*. **Eng:** Galaxy Rasbora, Fireworks Rasbora, Chilli Rasbora, Celestial Pearl Danio. **Egyéb köznevei:** Dánio perlové, Perlhuhnbräbling, Hemelse Pareldanio, Stjernerdanio.

Gyöngy danió a halkatalógusban: [katt!](#)

KATEGÓRIÁK:

[2012](#), [Akvarista Lexikon](#), [A hónap díszhala](#)

KULCSSZAVAK:

[díszhala](#), [hónap](#), [Danio](#), [február](#), [gyöngy](#), [margaritatus](#), [tenyésztés](#), [tartás](#), [mark24](#), [akvárium](#), [aquarium](#)

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2012-01-31 08:54:00

Legutolsó frissítés: 2022-01-18 14:54:10

Katalógus ID: 6729

Oldal linkje:

<https://akvaristalexikon.hu/akvarista-lexikon/2012-februari-kedvencunk-a-gyongy-danio.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva