

2014 augusztus díszhala a bohócmárna



Nem árt néha egy kicsit viccelődni, úgyszólván bohóckodni, főleg így nyár végén, mikor sokan megérdemelt szabadságukat töltik. Mi ezen cikkben viszont komolyan fogunk bohóckodni, ugyanis nem más halról lesz most szó, mint a szép bohócmárnáról!

Barbodes dunckeri



Bohócmárna - Barbodes dunckeri

Fajunk a délkelet-ázsiai szigetvilág lakója, Szumátra, Borneó, Malajzia elsősorban a leőhelye, ahol megtalálható a folyókban, patakokban. A víznek itt – esőerdő lévén – meglehetősen magas a cser- és huminsavtartalma az aláhulló levelek miatt, ezt tartásánál is figyelembe kell venni. Színezete is némileg a sárgásbarna vízhez alkalmazkodott, narancsos-enyhén rózsaszínes beütésű az alapszíne,

de ez kedélyállapottól és közegtől függően is változik, egész ezüstösbe vagy sárgásba is eltolódhat. Dekorativitását azonban az adja, hogy több nagy – esetenként szabálytalan – alakú türkizzöld folt díszíti testét, és úszói pirosak. A fiatal példányok egész élénk színekben játszanak, a nagyobbak kissé megfakulhatnak, de akkor is látványosak maradnak.



Bohócmárna - pár

Kiválóan alkalmas nagy bemutató medencékbe. Egyre több helyen – rendelőintézetekben, oktatási intézményekben, hivatalokban – állítanak fel akár csak dekor, akár látványosság, akár oktatási, akár egyéb célzattól díszmedencéket, melyek az esetek többségében közepes-nagy méretűnek számítanak. E dekoratív, mozgékony és aktív faj tökéletesen megfelel az ilyen típusú akváriumokba, hiszen látványosnak számít, így megragadja az ember tekintetét. Délkelet-ázsiai társításban kerülhetnek mellé ázsiai harcsák, csíkfélék, más márnák, nagytestű danió- és razbórafajok, talajlakó pontyfélék, gurámik. Békés természetű, de a nagyon apró halakat tápláléknak nézheti.

Mindenképp tágas akváriumra lesz szükség, ajánlott 200-250 liter feletti, mivel rajhal (legalább 6-8 példányt kell gondozni) és nagy térre van szüksége az úszáshoz. Bátran dekoráljunk, de ügyeljünk, hogy megfelelő kiúszótér maradjon halainknak.

Sajnos van egy hibája a fajnak, erőteljesen vegetáriánus, így a legtöbb vízinövény nem összeegyeztethető vele, még az *Anubiasok* friss hajtásait is lerágcsálják. Etetésénél is ügyeljünk a növényi kiegészítésre, de száraz tápokon jól tartható. Néha kapjon fagyasztott vagy élő – állati eredetű – táplálékot is.



Bohócmárna - Barbodes dunckeri



Bohócmárna - csapat

Habár nem nehéz hozzájutni, és egyáltalán nem számít drága fajnak, mégsem elterjedt az akváriumokban, holott szépsége és látványossága nem ezt sejtetné.

Bohócmárna - Barbodes dunckeri adattábla:

ELSŐ LEÍRÓJA:

Boulenger, 1894

CSALÁD:

CYPRINIDAE

MÉRET:

15 cm

°C:

24-28

°pH:

6-7

°Nk:

5-15

HELYIGÉNY:

250 liter

VISELKEDÉS:

békés

TÁPLÁLÉK:

mindenevő

HOL TARTÓZKODIK?:

középső

ÉLETTARTAM:

5-6 év

TERMÉSZETV. BES.:

felmértelen

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE :


Malajzia, Szingapúr, Borneó és Szumátra teszi ki elterjedési területét.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA :

Alapszíne aranylő barnásrózsaszín, a hason ezüstös árnyalattal. Oldalán néhány egyenletes eloszlású sötét folt van. A nőstények teste teltebb. 2 pár bajuszszála van. D 12, A 8.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE :

Mozgékony hal, lágy vizet kíván, bár csapvízben is elvan. Könnyen szaporodik nagy medencében, sűrű növények között. Tartásához a méretének megfelelő nagy tartályra van szükség, melyben sok helye van az úszáshoz. Aktívan úszó faj, szeret nekiiramodni, ezért nemcsak hogy nagy, hanem hosszú akvárium is szükséges. Tartáshoz 24-25, a tenyésztéshez 28 C° közeli hőmérséklet a megfelelő. 22 C°-os vízben már láthatóan rosszul érzi magát. Öreg vízben betegségekre hajlamos. Ajánlatos ezért a gyakori részleges vízcsere, a nitrátos vizet sem kedveli. Nagy akváriumát mindenféleképpen külső filtrálással lássuk el. Nyugodtan keltsünk áramlást, mivel kedveli a vízmozgást, amiben kedvére tud mozogni. A puhább levelű növényeket megrágcsálhatja. Mindenképp csapatban kell tartani, ami legalább 6 egyedet feltételez. Ha nem csapatban tartjuk őket, félénkké válnak! Társítása is könnyű, hiszen békés faj minden olyan hallal, ami nem nagyon kicsi. Az apró termetű fajokat kerüljük, eleinte amíg kisebb, békés velük, viszont amikor megnőtt, nem célszerű apró lazacokat, törperazbórákat hozni mellé. Biotóp-megfelelő módon robosztus

márnákkal, dániókkal, razbórákkal társíthatjuk, talajlakó gyanánt pedig néhány fonálgázó, garra vagy dízscsík érkezhethet. A gurámiféléket mellőzzük, zavarhatják márnáink őket. Vegyes társas medencében nagyobb lazacok (pl.: nyúllazac, kongólazac), békésebb sügerek (pl.: meggyhasú sügér), xifók, mollik, vagy éppen színpompás kalászhalak lehetnek társai, míg az aljzaton páncélosarcsák csapata dolgozik. Mindenevő; szívesen fogadja a szárított eledeleket, de mohón veti rá magát mindenféleforma élő és fagyasztott tápra egyaránt. Zöld növényi kiegészítést is adjunk nekik, hogy megkíméljék medencénk növényállományát, bár nem jellemző rájuk, hogy az erősebb levelű növényeket egyáltalán képesek legyenek bántani. Mohón táplálkoznak, sokat esznek! Már a 10 cm hosszú állat ivarérett. Érdekes, hogy az ivarérett nőstények gyakran hímek módjára viselkednek. A kergetődzést a nőstény kezdi, majd a hím folytatja. Ikráikat árnyékos helyre, növények közé rakják. Az ivadékok érzékenyek a hőmérséklet ingadozására. Ajánlatos ezért a hőmérsékletet állandóan 27 C°-on tartani. A kifejlett állatok számára javasolt vízváltás az ivadékokra is érvényes, mielőtt eléri a 2 cm-es hosszúságot. Az ivadékok gyors növésűek ugyan, de figyelembe véve az elérendő nagyságot, csak két év múlva válnak szaporodóképessé. Ívatásuk lehetőleg lágú és enyhén savas vízben, ikrarács fölött történjék. A kishalak amint pár napja már a mikroszkópikus eleséget fogyasztják, remekül nevelhetőek walter- és banánférgen, frissen kelt artémian, rotatórián. Tágas hely szükséges a bohócmárna-csapat felneveléséhez. Nagy díszakváriumok feltűnő lakója lehet, kitűnő választás nagyobb méretű társas medencékbe, biotópokba egyaránt (akár nyilvános medencékbe is, pl.: iskolákba)!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Puntius dunckeri*, *Barbus dunckeri*. **Eng:** Clown barb, Bigspot barb. **Egyéb köznevei:** Parmička Everettova, Klovnbarbe, Ilveilijäbarbi, Clownbarbe, Everetts Barbe, Berbaju, Telotong, Brzanka everetta, Puntius-kloun, Clownbarb.

KATEGÓRIÁK:

[2014, Akvarista Lexikon, A hónap díszhala](#)

KULCSSZAVAK:

[díszhala](#), [élőhely](#), [jellemzők](#), [augusztus, 2014](#), [tenyésztés](#), [tartás](#), [mark24](#), [akvárium](#), [Barbodes dunckeri](#), [Bohócmárna](#)

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2014-08-01 16:16:00

Legutolsó frissítés: 2022-01-18 14:59:53

Katalógus ID: 6772

Oldal linkje:

<https://akvaristalexikon.hu/akvarista-lexikon/2014-a-ugusztus-diszhala-a-bohocmarna.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva