Acantopsis dialuzona - Lófejű csík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Bleeker, 1854
CSALÁD:	Cobitidae
MÉRET:	20 cm
C°:	25,0-27,0
pH°:	6,5-7,8
Nk°:	6,0-10
HELYIGÉNY:	250 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt

Acantopsis dialuzona
Lófejű csík
(Bleeker, 1854)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:

Acantopsis dialuzona – Lófejű csík elterjedési területe (Map)

Burma, Jáva, Szumátra és Thaiföld gyors folyású vizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Teste megnyúlt, feje hosszú és elkeskenyedő. Aranyló sárgásbarna alapszínén a test középvonala mentén, egymástól egyenletes távolságra sötét foltok sorakoznak. Hátoldalát kisebb keresztsávok és egy sor apró sötét folt tarkítja. Az egyes példányok színe eltérő lehet. Hosszúra nyúlt, oldalt lapított testű, a hátúszók kezdetéig tetőszerűen emelkedő, majd eső hátvonalú hal. Feltűnő nagy feje, és a hátul fekvő szemek miatt nagyon hosszú orra van. Úszói igen fejlettek. A védőbőrrel bevont szemei a fejen igen magasan helyezkednek el. A szeme alatti tüskék kétcsúcsúak és felállíthatók. A kicsiny és alsóállású száján az alsó ajak rojtos; három pár bajuszszála van, elülső orrnyílásai csőszerűek. A pikkelyek igen kicsinyek.

Hosszúság: 18-20 cm-ig. Barnás alapon több sor sötétbarna folt, amelyek közül a felsők a háton is áthúzódnak. A színezet a származási helytől függően igen változó lehet. Az állatok kitűnően alkalmazkodnak a talaj színéhez, úgyhogy a szabad vizekben mindaddig alig találhatók meg, amíg meg nem mozdulnak és árnyékot nem vetnek. A hím mellúszói sokkal nagyobbak, mint a nőstényéi.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A Csíkfélék (*Cobitidae*) családjának egyik neme, amely Ázsia trópusi vidékein nagyon el van terjedve. A halak főleg gyors folyású, tiszta vizű patakokban élnek, ahol egészen a szemükig befúrják magukat a talajba. Erőteljes szellőztetésre van szükségük, mert pataki halakként oxigénigényesek.

A finom-szemcséjű fenéktalaj előnyös.

Etetés talajeleséggel: *Tubifexszel*, vörösszúnyoglárvákkal, *Enchytraeusszal*, valamint a fenékre lesüllyedt száraz-eleséggel (eleségtabletták!). Emellett kedvelik a növényi táplálékot is.

Igen gyorsan be tudja magát ásnia talajba, sőt még előrehaladni is képes benne.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Cobitis choirorhynchos*.

Eng: Horseface loach, Longnose loach, Long Nosed Loach, Banana Loach.

Egyéb köznevei: Sekavec koňský, Hestehovedsmerling, Banana fish, Cobitis choii, Kärsänuoliainen, Lanstirnschmerle, Pa it, Jeler, Tryngrönling.

KATEGÓRIÁK:

Akváriumi halak, Csíkfélék

KULCSSZAVAK:

Lófejű csík, Bleeker, Acantopsis dialuzona, Cobitidae, Csíkfélék, Akváriumi halak, akvarisztika, 1854

JELLEMZŐK:

Indokína, Nagy-Szunda-szk, bújós, Jáva, hosszú életű 6 év fölött, nagy (több 200 liternél), féllúgos (7.5-8 pH), félsavas (6-6.5 pH), hőigényes (25-30 °C), normál (6.5-7.5 pH), alsó szint, békés viselkedés, lágyvízi (5-10 Nk°), gyors vízáramlású, átlátszó vízi, közepesen áramló vízi, mindenevő, lassú mozgású, sűrű növényzetigényű, nagyméretű 10-20 cm, Ázsia, Dél-Ázsia, Indonézia, Szumátra, Thaiföld.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2008-05-08 09:01:16
Legutolsó frissítés: 2017-06-30 08:26:47
Katalógus ID: 4262
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/acantopsis-dialuzona.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva