Anomalochromis thomasi - Tamás sügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1915
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	5 cm
C°:	23,0-27,0
pH°:	6,0-8,0
Nk°:	5,0-12
HELYIGÉNY:	75 liter
VISELKEDÉS:	ragadozó
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső- és alsó szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt

Ezzel a fajjal részletesebben foglalkozunk a következő cikkben:
2013 júniusi halunk: a Tamás sügér
Anomalochromis thomasi
Tamás sügér
(Boulenger, 1915)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:

Tamás sügér – Anomalochromis thomasi elterjedési területe (distribution map)

TOVÁBBI KÉPEK:

Libéria és Sierra Leone patakjai.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Ovális-testű bölcsőszájú hal, kissé ívelt háttal. Az alapszínezet sárga-barna, inkább barnába hajlik. Az oldalán szembetűnő három sötétebb foltocska, és öt gyenge, fekete csík, ami a hát felől a test közepe felé halad. Az oldalán több sor petty található, melyek színe a lilától a sárgán, kéken keresztül zöldbe hajlik. Ezeken a foltokon a ráeső fény rengeteg árnyalatban tükröződik vissza (sárga, zöld, türkizkék), majd sötétebb színárnyalatokká fejlődik (kék, lila) a farok közelében.

Egy fekete szalag fut a száj alól a szemen keresztül, és a homlok közelében ér véget, egy sötét folt pedig a kopoltyúfedőn helyezkedik el, mely aranyszínnel kombinálódik. A farokuszony legyező alakú és a felső íve piros, és a piros csík alatt egy türkizkék csík is van. A hátuszony élét piros pontsor díszíti, amit egy párhuzamos sárgás-kékes pontvonal követ. A szem szivárványhártyája piros színben játszik. A hímek 10 centiméteresre, a nőstények 7 centiméteresre nőnek meg. A nőstények színei valamivel halványabbak és kerekebbek is a hímeknél. A vadon fogott példányok jóval színesebbek az akváriumban tenyésztetteknél.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A tamás sügér a békésebb bölcsőszájúhalak közé tartozik, ezért megfelelő alanya lehet biotóp jellegű akváriumok lakóközösségének. Az akváriumnak, ahol tartani szeretnénk, növényekkel meglehetősen jól beültetettnek kell lennie, sziklákkal és uszadék fákkal tarkítva, lehetőleg sötét altalajjal. Ha kialakult egy pár, elfoglal egy területet és azt meg is védi azt saját fajtársaitól. Mikor ivadékai vannak, az akvárium talaját saját ízlése szerint rendszerint alaposan átalakítja.

Halaink az akvárium középső és alsó szintjein szeretnek tartózkodni. Nem igényelnek semmilyen különleges vízfeltételt, hacsak nem a tenyésztési célból tartjuk őket. A hőmérséklet alsó határa kb. 20°C legyen. Bár életben maradnak alapvető eleségeken is, ajánlatos olyan étrenden tartani, mely alkalmanként tartalmaz zöldtakarmányt és élőtáplálékot (pl. tubifex, szúnyoglárva) is.

A tamás sügér meglehetősen könnyen szaporítható, és igen gondos szülő. Hogy rávegyünk egy párt szaporodásra, csak lágy és enyhén savas kémhatású, tiszta vizet kell biztosítanunk számukra. A tenyésztő-akvárium meglehetősen nagyméretű legyen. Az ikrákat általában egy lapos sziklára helyezik. Mindkét szülő gondozza az ikrákat, melyekből akár 500 ivadék is kikelhet. Az ivadékot az első néhány napon keresztül a talajba mélyített sekély gödrökben helyezik el. Az ivadékokat Artemia naupliis-szal és száraz eleségekkel etethetjük. A szülők sokáig folytatják a fészekalja gondozását.

Néha akvaristák tapasztalnak veszteségeket a fészekaljából, ami általában a tenyésztő-akvárium kis méretének, vagy túlnépesítés miatti táplálékhiánynak tudható be. Az ívás közeli idejét onnan lehet észrevenni, hogy a nőstény egyre jobban kikerekedik, testesebb lesz a hímnél. A hím és a nőstény körülbelül egy 8 cm átmérőjű territóriumot véd. Akváriumuk ideális mérete így legalább 90 cm legyen, vagy még több. Erősen monogám viselkedésű,és nagyon összetartó családokban él. Némelykor ez a családi harmónia is felbomlik, veszekedhetnek, ilyenkor a hímet kell eltávolítani és a helyét egy másik hím példánnyal próbálhatjuk meg betölteni.

Az tamás sügér hazájában áramló, erősen benövényesedett vizekben honos, amilyenek például a őserdei vízfolyások. Ezek még tágabban értelmezve Nyugat-Afrika: Sierra Leone, Guinea és Libéria folyóvizei, melyek jellemzően: pH 6-7.8 (6.8), Nk 4-15 (°8), és 24-27°C-osak.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Négyfoltú sügér. afrikai pillangósügér;

syn: *Hemichromis thomasi, Paratilapia thomasi, Pelmatochromi thomasi.*

Eng: African Butterfly Cichlid.

Egyéb köznevei: Barwniak Thomasa, Timanttikirjoahven, Thomas Prachtbarsch.

KATEGÓRIÁK:

Afrikai fajok, Akváriumi halak, Bölcsőszájú halak

KULCSSZAVAK:

Tamás sügér, Boulenger, 1915, Cichlidae, Afrikai sügérek, Anomalochromis thomasi, Akváriumi halak, akvarisztika

JELLEMZŐK:

barna vízi, Afrika, Atlanti országok, nagyméretű 10-20 cm, féllúgos (7.5-8 pH), félsavas (6-6.5 pH), hőigényes (25-30 °C), normál (6.5-7.5 pH), alsó szint, békés viselkedés, kissé agresszív viselkedés, lágyvízi (5-10 Nk°), sűrű növényzetigényű, közepes hőigényű 20-25°C, átlátszó vízi, közepesen keményvízi 10-15°Nk, közepesméretű akvárium 50-100 literig, közepesen áramló vízi, lassan mozgó vízi, mindenevő, középső szint, átlagos élethossza 3-6 év, átlagos növényzetigényű, lassú mozgású.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2008-05-07 09:01:16
Legutolsó frissítés: 2017-09-04 14:46:23
Katalógus ID: 4169
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/anomalochromis-thomasi.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva