

Anostomus anostomus - Díszes fejenállólazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Linnaeus, 1758
CSALÁD:	Anostomidae
MÉRET:	15-20 cm
C°:	22-28
pH°:	6-8
Nk°:	4-15
HELYIGÉNY:	180 liter
VISELKEDÉS:	békés és csapatos faj
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó-középső
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Anostomus anostomus
Díszes fejenállólazac
(Linnaeus, 1758)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Anostomus anostomus – Díszes fejenállólazac elterjedési területe (Map)

Az *Orinoco* és az *Amazonas* mellékfolyói *Manaustól* fölfelé, Peruban, Brazíliában és Venezuelában, patakok Guyanában és Surinamban. A faj megtalálható olyan oldalágakban is, amelyekben az életviszonyok biológiailag nagyon kedvezőtlenek, pl. ahol a folyók időnként szinte teljesen kiszáradnak. Szívesen rejtőzködik a dús vízi vegetáció közt.

Térkép:[aquamap](#)

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

E közepes nagyságú halak teste egyrészt szinte orsószerű, hengeres keresztmetszetű, másrészt oldalt enyhén lapított is. A fej felső része enyhén ellapuló. Az ajkak vastagok és redősek; a szaglógödör elülső nyílásai némileg csószszerűen megnyúltak. A felső állású szájában kevés fog van. A szájállás látszólag ellentétben van a halak fenékhez közeli életmódjával. Valójában éppen ez teszi lehetővé, hogy testtartásuk ellenére le tudják legelni a növényi sarjakat. Testtartásukat ideiglenesen csak akkor adják föl, ha izgatottak, éhesek vagy megijednek valamitől.

D 11-12, A 10. A pikkelyek közepes nagyságúak. Hosszúság: maximum 18 cm. Élénk okkersárga alapon három sötét barnászöld, csipkézett szélű hosszanti csík fut végig. Az egész test pirosas árnyalatú; az úszók alapja élénkpiros. Az ivari különbségek nem egy könnyen megállapíthatók.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Mutatós, szívós faj, kedveli a víz alatti gyökereket és az erős levelű növényeket, melyek között jellegzetesen fejen állva kutat élelem után. A halak szívesen álldogálnak agy sodródnak fejjel lefelé a függőlegesen fölfelé álló növények között, ezért a felületes szemlélőnek úgy tűnik, mintha állandóan inaktívak lennének. De ez csak a látszat - időnként nagyon élénkek is tudnak lenni. Ezért szabad kiúszótérre is szükségük van. Általában békések és nyugodtak, csak néha tanusítanak kergetőzős magatartást. Fajon belül legalább 6-8-10 példányt szerezzünk be, így valószínűleg megoszlik az enyhe territoriáció is, hiszen a vadonban is nagy csapatokban élnek a növények közt.

A táplálkozást illetően korántsem válogatósak. A fenékről mindent felesznek, de pl. a lesüllyedt eleség lenyeléséhez a díszes fejreálló lazacoknak a hátukra kell feküdniük, mert másként nem jutnak hozzá. Meg kell néha ugyan kínálni őket szúnyoglárvákkal, férgekkel, de jobbára az algákat részesítik előnyben, de sajnos a vízi vegetációt sem kímélik, növénypusztító hírében állnak. Kevés az a növény, ami ellen tud állni nekik, még az Anubiast is esetenként megcsipkedhetik. Épp ezért tartásánál sokszor a növénymentes medence a javasolt, ilyenkor különböző ágkombinációkkal és egyéb mutatós uszadékfákkal is lenyűgöző vízi világot biztosíthatunk. Bambuszrudakkal is dekorálhatunk, több akváriumban látni nagyon szép összeállításokat ilyen nád- vagy bambuszszállakkal.

Társíthatjuk más dél-amerikai fajok többségével különösebb probléma nélkül, de azért törpe fajokat ne tegyünk melléjük. Pontylazacok közül például a gyönyörű csillogású, de szintén növénypusztító hírében álló tányérlazacokkal lehet célszerű társítást alkotni. Békésebb, de közepesebb-nagyobb sügérfélékkel is megfér.

Érdeemes akváriumát külső filtrálással ellátni, és tompítva világítani. Nagyon mutatós lehet enyhén sötétített vízben, amit égetobozzal vagy tőzegteával érhetünk el, de egy közepesen áramló, kristálytisza vizű akváriumban is jól érzi magát. Csapvízben gondozható, bár az enyhén lágyabb víz a legmegfelelőbb.

Tenyészteni akváriumi körülmények között sajnos még nem lehet.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Anostomus salmoneus*, *Mormyrinchus gronoveii*, *Salmo anostomus*.

Eng: Striped headstander, Striped anostomus.

Egyéb köznevei: Stribet bundkigger, Juováseisojakala, Juovaseisojatetra, Prachtkopfsteher, Anostomo, Polosatyi anostomus, Anostomus rayados, Lisa, Sardina, Praktbottentittare.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Pontylazacok](#), [Anostomidae](#), [1758](#), [Anostomus anostomus](#), [Díszes fejenállólazac](#), [Linnaeus](#)

JELLEMZŐK:

[Amerika](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [lassú mozgású](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [Amazónia](#), [barna vízi](#), [Dél-amerika](#), [sárga vízi](#), [Orinoco](#), [Guyanák](#), [békés rajhal](#), [fekete vízi](#), [gyér növényzetigényű](#), [Andok orsz.](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [Peru](#), [növényt nem igényel](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [alsó szint](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

http://www.aquamaps.org/am_americas/premap.php?map=cached&SpecID=Fis-27918&cache=1

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-03-20 11:44:02

Katalógus ID: 4014

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/anostomus-anostomus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva