

Anubias heterophylla - Kongói vízilándzsa

| | |
|---------------|--------------------------------|
| ELSŐ LEÍRÓJA: | Engler |
| CSALÁD: | Araceae |
| MAGASSÁGA: | 60 cm |
| C°: | 22-28 |
| pH°: | 6-8 |
| Nk°: | 0-18 |
| HELYIGÉNY: | 120 liter |
| TALAJTÍPUS: | sóder, kvarchomok |
| TÁPANYAG: | gyökér, alacsony tápanyagigény |
| ÜLTETÉS: | hátral |
| FÉNYIGÉNYE: | alacsony |
| TERM.VÉD.: | gyakori |



Anubias heterophylla
Kongói vízilándzsa
 (Engler)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Nyugat-Afrika: Kamerun, Kongó, Egyenlítői Guinea, Gabon, Kongói Demokratikus Köztársaság és Angola.

Esőerdei vizek, mocsaras területek lakója.

TOVÁBBI KÉPEK:



KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hosszú, hegyes levelei aránylag hosszú száron ülnek. Közepesen mélyzöld színű. Rizómája van, levélnyelei ebből fejlődnek felfelé, és gyökereket is ebből hajt, rizómájának osztásával szaporítható. Levelei viszonylag nagy méretűek, robusztusak, ellenállóak; gyökerei is viszonylag erőteljesek. Víz fölött és alatt is egyaránt hozza fehér virágzatát.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nem érzékeny növény, kezdőknek kitűnően megfelel. Nagyobb afrikai medencék biotóp növénye, ahol a mocsaras jellegű társítástól a nyugodtabb folyókat mintázó biotópokig sok mindenhez megfelel, de társas medencébe is ültethető. Nem fényigényes, külön tápozásra sincs igazán igénye. Levelei nagyon ellenállóak és kemények, a halak általában nem bántják, csak kevés fajuk képes lerágni azt (pl.: ugarlazac, tányérlazacok). Kiválóan megfelel akváriumok középső-hátsó régiójába, jól betölti a teret. Számos halfaj szívesen keres pihenőhelyet levelei között. Előfordulhat, hogy levelein ecsetalgák telepednek meg, ezek ellen *Crossocheilus* fajok telepítésével védekezhetünk.

Rizómáját talaj alá temetni nem szabad, mert könnyedén elrothad. Kövek közé kell szorítani, vagy fára kötözni (ez utóbbi formában gyakran árusítják is). Gyökerei hamar köré nőnek a tereptárgynak és benőnek az aljzatba. A rizómáján fejleszt hajtásokat az anyató, innen szaporíthatóak. Lassú növekedése miatt drága, csak kevés levelet hoz.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Anubias affinis*, *Anubias bequaertii*, *Anubias congensis*, *Anubias engleri*, *Anubias undulata*.

Eng: Congo Anubias

Egyéb köznevei: Verschiedenblättriges Speerblatt

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai növények](#), [Akváriumi növények](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi növények](#), [Engler](#), [Anubias heterophylla](#), [Araceae](#), [akvarisztika](#), [Kongói vízilándzsa](#), [Afrikai növények](#)

JELLEMZŐK:

[keményvízi 15-20°Nk](#), [sóder talaj](#), [lassú növekedésű](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [hátsó zónába ültetendő](#), [alacsony fényigényű \(kisebb 500 lux-nál\)](#), [állóvízi](#), [kemény és ellenálló](#), [alacsony tápanyagigényű](#), [barna vízi](#), [sárga vízi](#), [berendezési tárgyakon nő](#), [Afrika](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [Atlanti országok](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Nyugat-Afrika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [Kongó](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Közép-Afrika](#), [nagy \(50-100 cm\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [kvarchomok talaj](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba: **Akvarisztika**

www.iucnredlist.org

Beküldte: mark24

Katalógusba került: 2012-10-22 14:19:04

Legutolsó frissítés: 2018-01-28 22:19:36

Katalógus ID: 5020

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/afrikai-novenyek/anubias-heterophylla.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva