

Aphanius dispar - Gyöngyös fogasponty

ELSŐ LEÍRÓJA:	Rüppell, 1829
CSALÁD:	Cyprinodontidae
MÉRET:	7 cm
C°:	10,0-28,0
pH°:	7,0-8,0
Nk°:	8,0-15
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó és középső szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Aphanius dispar
Gyöngyös fogasponty
(Rüppell, 1829)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Aphanius dispar – Gyöngyös fogasponty elterjedési területe (Map)

Kis-Ázsia, a Vörös- és Arab-tenger parti vizei, egészen Északnyugat-Indiáig. Úgy tűnik, hogy a faj az utóbbi időben a Földközi-tenger térségében is kezd elterjedni. Édes-, félsós- és sósvizekben egyaránt megtalálható.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A kissé rövidnek és erőteljesnek tűnő test oldalt lapos, a fej felső fele is kissé lapos, a szájrés kicsiny és fölfelé irányul. Mindkét úszó messze hátul van. A pikkelyek meglehetősen kicsinyek. A hím hossza 8 cm-ig, a nőstényé 7 cm-ig. A faj nagyon változékony, ezenkívül az ivarok is különböző színűek. A hímen kékesszürke-acélszürke alapon ezüstösen csillogó vonalak hosszanti sora, a faroknyélen sötét haránt

irányú sávok láthatók; a nőstény ezüstös színű, oldalait sötét harántsvávok díszítik. A hímek úszói jóval nagyobbak, és szép színesek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Igen szívós halak, amelyek az akvarisztikában nagyobb figyelmet érdemelnének. Élénkek, mozgékonyak, de kissé veszekedősek. Egyébként meglehetősen igénytelenek. Az importált állatok akváriumának vizéhez az eredetüktől függően több-kevesebb sót vagy tengervizet kell adni. Egyes példányok viszonylag könnyen hozzászoktathatók az édesvízhez, míg mások édesvízben szinte teljesen elvesztik színüket, szürkévé és jelentéktelenné válnak. Ajánlatos olyan medencékbe tenni a halakat, ahol elég sok a rejtekhely, amennyiben a sómennyiség ezt lehetővé teszi, célszerű sűrű növényzet betelepítése. Hőmérséklet 16-25, de legjobb a 21-24 C°.

Tenyésztés előtt bőségesen kell etetni, mert egyébként nem kezdődik meg az ívás. A petéket úszónövények gyökereire rakják, s minden petét külön-külön termékenyítenek meg. Az ivadék 10—14 nap múlva bújik ki. Többnyire a felszínen tartózkodik, s bármilyen — por finomságú — élő- és szárazelest elfogad. Az ivadék könnyen felnevelhető, gyors növésű, de a faj meglehetősen rövid életű.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Lebias dispar*, *Aphaniops dispar*, *Aphanius dispar dispar*.

Eng: Arabian killifish.

Egyéb köznevei: Celiku, Perlmutterkärpfling.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Ikrázó fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[1829](#), [Aphanius dispar](#), [Cyprinodontidae](#), [Gyöngyös fogasponty](#), [Ikrázó fogaspontyok](#), [Rüppell](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Kelet-Afrika](#), [Nyugat-Ázsia](#), [Afrika](#), [Arab-félsziget](#), [Észak-Afrika](#), [India](#), [föllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [alsó szint](#), [békés viselkedés](#), [lágyszívű \(5-10 Nk°\)](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [Dél-Ázsia](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [lassan mozgó vízi](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [lassú mozgású](#), [sűrű növényzetigényű](#), [állóvízi](#), [barna vízi](#), [Ázsia](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-07-17 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-06-20 12:47:23

Katalógus ID: 4058

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/ikrazo-fogaspontyok/aphanius-dispar.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva