

Aphyocharax rathbuni - Zöld pontylazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Eigenmann, 1907
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	4,5 cm
C°:	23-26
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső
ÉLETTARTAM:	3-4 év
TERM.VÉD.:	



Aphyocharax rathbuni
Zöld pontylazac
(Eigenmann, 1907)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Aphyocharax rathbuni – Zöld pontylazac elterjedési területe (Map)

Dél-Amerika; Rio Paraguay

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Testének alapszíne ezüstösen fénylő zöld, míg hasalja rubinvörös, ami a farkúszóra is ráterjed egy gyengébb mintában. Az úszók hegye szép fehér.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kezdőknek ajánlható, igénytelen rajhal. Legalább 6-8 egyedet tartsunk, leginkább dél-amerikai biotóp medencébe való, ott kiválóan mutat és remek közösségi hal. Biotóp medencében törpesügérekkel,

talajlakó harcsákkal, más lazacokkal társítható, de vegyes akváriumban más hasonló, kisebb-közepesebb halakkal is társítható gond nélkül (mollik, plattik, razbórák, dániók, üvegharcsák, stb.).

Sötét aljzatot tegyünk medencéjébe, az kiemeli színezetét, illetve szívesen bujkál a sűrű növényzet közepette. Némi úszónövényzet, tompított világítás remekül kiemeli színezetüket. A szűrésre nem igényes, átlagos erősségen megfelel. A vizet kezelhetjük tőzeggel, égertobozzal, Tebang-levéllel, a legjobban enyhén savas lágyvízben érzik magukat. Igénytelenségükkel és színezettségükkel, mutatóságukkal sokkal elterjedtebbek is lehetnének, bár talán egyre inkább terjednek e kis érdekes lazacok a hazai akvaristák körében.

Etetésükre a száraz tápok (lemezese, granulátumok) is alkalmasak, de vitalitásuk, színpompájuk nem mutatkozik annyira ezek mellett. Ha fagyasztott és élő eledelkkel (pl. grindál, artemia, cyclops, banánféreg, walterféreg, szúnyoglárva, tubifex, stb.) is etetünk, akkor valóban pompás halakat kapunk.

A tenyésztő medencéjükbe savas lágy vizet töltünk, és egy légpumpával meghajtott szivacs szűrőt is elindíthatunk. A tenyészhalakat előzőleg etessük jófajta élő és fagyasztott eleséggel (pl. szúnyoglárva, Daphnia). A legkerekebb nőtényt a legszebb hímekkel tegyük ki, vagy csapatosan. Ikrarácsot használjunk! Az ikrarács fölé különféle mohákat, Ricciát is tehetünk, szívesen ívnak ebbe is. Ívás után távolítsuk el a szülőket. Az elúszási idővel együtt az ikrázástól számított kb. 1. hét letelte után kezdjük etetni, akár Artemiával is indíthatóak, de banánféreg, walterféreg az első 1-2 napban még talán jobb. Rendszeresen cseréljük vizüket!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Aphyocharax stramineus*.

Eng: Rathbun's Bloodfin, Redflank Bloodfin, Green Fire Tetra, Greenfire Tetra.

Egyéb köznevei: Tulipyrstötetra, Rubinsalmler, Zwawik rathbuniego, Tetra Rathbunova, Rødbuget tetra, Tétra Rathbuni, Rødfinnetetra, Афиохаракс ратбуна, Афиохаракс рубиновый, Rubintetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Characidae](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Pontylazacok](#), [Aphyocharax rathbuni](#), [Zöld pontylazac](#), [Eigenmann, 1907](#)

JELLEMZŐK:

[fekete vízi](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Amerika](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Paraguay](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [átlátszó vízi](#), [barna vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Dél-amerika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepes méretű akvárium 50-100](#)

[literig](#), [igenlágynyízi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [lágynyízi \(5-10 Nk°\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [békés rajhal](#), [közepesen aktív mozgású](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-10-22 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2015-08-19 21:08:07

Katalógus ID: 4478

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/aphyocharax-rathbuni.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva