

Aphyosemion bivittatum - Szalagos fogaspony

ELSŐ LEÍRÓJA:	Lönnberg, 1895
CSALÁD:	Nothobranchiidae
MÉRET:	6,5 cm
C°:	20-26
pH°:	6,0-6,5
Nk°:	1,0-6
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Aphyosemion bivittatum
Szalagos fogaspony
(Lönnberg, 1895)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Aphyosemion bivittatum – Szalagos fogaspony elterjedési területe (Map)



Nyugat-Afrika mocsaraiban és kisebb vizeiben, Kameruntól egészen a Niger torkolatáig. Itt gyakran kis rajokat alkotnak.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Egész sereg alfaj névadó faja, de az alfajok indokoltsága még nem minden esetben tisztázott dolog. A pikkelyek viszonylag nagyok. A fark-úszó háromlebenyes. Hosszúság: 6,5 cm-ig. Igen színpompás faj, azonban nagyon változékony, s az alfajok színezete is tetemesen eltérő. Valamennyiükön közös a nőstényeken is többé-kevésbé meglevő, hosszanti csíkrajzat.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nagyon élénk faj, amely különösen az alsó és középső vízrétegekben szeret tartózkodni. A tenyésztési hőmérséklet mintegy 24—25 °C lehet. A hím nagyon erősen hajt. A viszonylag nagy, eleinte üveges, később enyhén sárgás petéket a fenék közelében növényekre vagy gyökerekre rakják, ahol megtapadnak. Egy-egy ikrázási periódus 8—12 napig tart; összesen 60—80 petét raknak le. A nőstények három héttel később ismét íváásra érettek, úgyhogy újból felhasználhatók tenyésztésre. A szülők általában nem nevezhetők ikrarablóknak. Az ivadékok kiköltése úgy történhet, ahogyan a nem leírásánál „növények közé ikrázók” leírásában közöltük. Az ivadékok még bőséges etetéskor is eleinte kissé lassan fejlődnek, az elmulasztottakat azonban koruk előrehaladtával gyorsan behozzák. Az ivarok már 10—12 héttel később megkülönböztethetők; az ivarérettség 4—6 hónap múlva következik be. A károsodás elkerülése céljából nem ajánlatos az ivadékokat 9 hónapnál hamarabb bevonni a tenyésztésbe.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Fundulus bivittatus*, *Aphyosemion bivittatus*, *Aphyosemion hollyi*.

Eng: Red lyretail, Two-banded killi, Twostripe lyretail.

Egyéb köznevei: Tobándet fanekarpe, Gebänderter Prachtkärpfling, Deba-ogoin, Afiosemion dvukhpolosyi.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Ikrázó fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[1895](#), [Ikrázó fogaspontyok](#), [Nothobranchiidae](#), [Akváriumi halak](#), [Aphyosemion bivittatum](#), [akvarisztika](#), [Lönnberg](#), [Szalagos fogasponty](#)

JELLEMZŐK:

[Afrika](#), [alsó szint](#), [lassan mozgó vízi](#), [Nyugat-Afrika](#), [békés viselkedés](#), [mindenevő](#), [Niger](#), [igenlágynyí](#) (0-5°Nk), [középső szint](#), [lágynyí](#) (5-10 Nk°), [felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [lassú mozgású](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [állóvízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [barna vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-07-17 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-08-24 09:07:46

Katalógus ID: 4065

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/ikrazo-fogaspontyok/aphyosemion->

[bivittatum.html](#)

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva