

Aphyosemion lujae - Vöröspettyes cifra fogaspony

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1911
CSALÁD:	Nothobranchiidae
MÉRET:	5 cm
C°:	20-23,5
pH°:	5,8-7,2
Nk°:	5,0-12
HELYIGÉNY:	50 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Aphyosemion lujae

Vöröspettyes cifra fogaspony
(Boulenger, 1911)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:

Képek feltöltés alatt!



Aphyosemion lujae – Vöröspettyes cifra fogaspony elterjedési területe (Map)

Leopoldville környékén, a Kongó vidékén fordul elő, elterjedési területe azonban valószínűleg nagyobb ennél.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Ugyanaz a faj *A. striatum* szinonim elnevezéssel is forgalomban van. Az *A. cameronensis*nek közeli rokona. Alakja nyújtott, a test vége felé csak kevésbé lapított. Még a hím hát- és fark alatti úszója is alig hegyesedik ki. A farkúszó lapát alakú; a felső és alsó sugarak esetleg egy kissé megnyúlnak, anélkül azonban, hogy úszófonalakat alkotnának. Hosszúság: kb. 5 cm. A színezet a származási helytől, de a hangulattól, a környezettől és az élet-kortól függően is változó. Az alapszín többé-kevésbé élénk, de a különböző színváltozatok lehetnek inkább citrom- vagy narancssárga, esetleg vöröses színezetűek. A fej, a

mell és a test felső harmada sárgászöld, a hát olajzöld, a has narancsszínű. A fej két oldalán élénkvörös, féregszerű szalagok, az oldalakon ugyanilyen színű hosszanti csíkok láthatók, amelyek a hát- és hasoldalon esetleg pontsorokba mennek át. Az úszók narancsvörösek. A hát- és fark alatti úszónak a töve, a farkúszónak a középmezeje sárgászöld, s rajta élénkvörös színű mintázat látható. A hím barnás alapszínű, amely kékesen csillog, világos-vörös pontsorok láthatók rajta.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Békés halfaj, még a hímek is alig viaskodnak egymással, legalábbis sérülések nem tapasztalhatók. Kedveli a lágy- és savanyúvizet, s valószínűleg nagyon alacsony pH-értékeket is képes elviselni. A vizet ajánlatos tőzegen átszűrni. Nem nagyon falánk, a táplálékban sem igen válogatós. Különösebben nem is hőigényes: 20—23 C° megfelelő, de átmenetileg alacsonyabbat is elvisel. Tenyésztése nem nehéz, de az importált állatok viselkedésében a természetes ívási időszakot világosan fel lehetett ismerni. A talaj közelében növények gyökerei vagy műanyag fonalak közé, de ha lehetséges, magába a talajba rakják le ikráikat. Valószínűleg az ikratapasztók (gyökerekre) és a fenékre ívók közti átmeneti formáról van szó. Ha tőzeges a talaj, a pár egymás mellett fekszik a talajon, s ha fonál az ikráaljazat, ezzel szorosan érintkezve folyik le az ívás. Az ikrák kikeltetése történhet vízben (tenyésztőcsésze!), vagy nedves tőzegben. Az ivadékok 20—22 C° hőmérsékleten, általában 14—17 nap múlva, nedves periódus beiktatásakor azonban csak 4—6 hét múlva bújnak ki. Az ivadékok gyors növésűek, s kibúvásuk után azonnal fogyasztják apró rákok és *Artemia* naupliusait.

Egyfajosan kis akváriumban is tartható, körülbelül 30 literben, a megszabott akváriumméreten már bátran társíthatjuk hasonló, békésebb ikrarakó fogaspontyokkal.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Haplochilus lujae*, *Panchax lujae*.

Eng: -.

Egyéb köznevei: Kongonviiripyrstő, Krasnopolosyi lirokhvost .

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Ikrázó fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[akvarisztika](#), [Ikrázó fogaspontyok](#), [Nothobranchiidae](#), [Aphyosemion lujae](#), [Vöröspettyes cifra fogasponty](#), [1911](#), [Boulenger](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[Kongó](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Közép-Afrika](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [lassú](#)

[mozgású](#), [átlátszó vízi](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [nagyéretű 10-20 cm](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [állóvízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [fekete vízi](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [középső szint](#), [Afrika](#), [alsó szint](#), [felső szint](#), [békés viselkedés](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-07-17 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-08-24 16:37:52

Katalógus ID: 4076

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/ikrazo-fogaspontyok/aphyosemion-lujae.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva