

Apistogramma cacatuoides - Kakadu törpesügér



ELSŐ LEÍRÓJA:	Hoedeman, 1951
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	7 cm
C°:	24,0-27,0
pH°:	6,0-8,0
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	85 liter
VISELKEDÉS:	ragadozó, társas
TÁPLÁLÉK:	élő eleség
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Apistogramma cacatuoides

Kakadu törpesügér
(Hoedeman, 1951)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Apistogramma cacatuoides – Kakadu törpesügér elterjedési területe (Map)

Az Amazonas perui szakaszának folyói és patakjai.

Térkép: [aquamap](#)

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A faj legfeltűnőbb jellegzetessége az úszói. A hátúszó megnyúlt sugarai úgy néznek ki, mint a kakadu bőbitája; a farokúszó vörös és fekete mintás. A test színe szürkészöld. Oldalán egy széles, sötét, vízszintes sáv fut, ami alább egy töredezett vonalként megismétlődik. A nőstények szemén sötét sáv húzódik keresztül és úszóik kisebbek, mint a hímeké. A test hosszúra nyúlt és hengerszerű. Oldalról csak kevésbé lapított. A hím farkúszójának felső és alsó sugarai megnyúltak; s a külső szegélye homorú. Színezet és ivarikülönbségek: Az olajbarna alapszínen sötét hosszanti csík, a szemtől a kopolyúfedő széléig

függőleges sáv húzódik. A lágy sugarú hátúszó alaprészén sötét folt van. Az úszók mind enyhén kékesek vagy zöldesek. A hátúszó első sugarai megnyúltak és sötét színűek. Az ikrázási időben erősebben, máskor gyengébben sárga, sötét fekete rajzolatok díszítette nőstények sugarai nem hosszabbodtak meg.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Egy közepesen nagy akváriumban egy hím és néhány nőstény példány tartható. Változatok: Fényes narancs, Vörös, Sárga/Arany, Duble Red, stb... . Tartás és tenyésztés: Részben ugyanolyan, mint az [A. agassizii](#) esetében, de az ivadék gondozás inkább az [A. borellii](#)éhez hasonlít. A halat Apistogramma U 2 elnevezéssel hozták be Európába.

Ne kapjon vörös szúnyoglarvát, és tubifexszel is csak óvatosan, pihentetés után tápláljuk!!! Fordított esetben hamar elpusztul bélgyulladásban vagy más emésztőszervrendszeri megbetegedésekben!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Cockatoo Apisto, Crested Apisto, Crested Dwarf Cichlid, Cockatoo Dwarf Cichlid, Cockatoo Cichlid.

Egyéb köznevei: Kakaduedvargcichlide, Töyhtökääpiöahven, Kakadu-Zwergbuntbarsch, Pielegniczka kakadu.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváiumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1951](#), [akvarisztika](#), [Amerikai sügérek](#), [Cichlidae](#), [Apistogramma cacatuoides](#), [Kakadu törpesügér](#), [Hoedeman](#), [Akváiumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[átlagos élethossza 3-6 év](#), [igenlágyvízi \(0-5°Nk\)](#), [lassú mozgású](#), [Amerika](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [ragadozó](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Amazónia](#), [átlátszó vízi](#), [barna vízi](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Andok orsz.](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Peru](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [plankton és detrituszfogyasztó](#), [alsó szint](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés viselkedés](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- http://www.aquamaps.org/am_americas/premap.php?map=cached&SpecID=Fis-35090&cache=1

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2016-06-09 07:42:34

Katalógus ID: 4172

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/apistogramma-cacatuoides.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva