

Apistogramma hongsloui - Vöröscsíkos törpesügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Kullander, 1979
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	4,5-7 cm
C°:	24-27
pH°:	6-7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	aránylag társas
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	elsősorban középű
ÉLETTARTAM:	3-4 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Apistogramma hongsloui

Vöröscsíkos törpesügér


(Kullander, 1979)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Apistogramma hongsloui – Vöröscsíkos törpesügér elterjedési területe (Map)



Dél-Amerika; Venezuela, Kolumbia

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Tipikus törpesügér formájú nagy fejjel. A nőstények barnásak, kevés sötétebb mintával, úszóik is csak halványan színesek. A hímek alapszíne szintén barna, de vörösen csíkozott, ami a pikkelyek közti egyéb mintáktól látszódhat így. Leggyakrabban nem is csíkos, hanem részelegesen bíbor színű, például a hasán, és az oldalon mentén csík lilás-sötétszürkés. Egyes példányok szinte teljesen pirosak. Az úszók többsége is vörössel mintázott.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A törpesügérek közt nem számít annyira nehéz fajnak, de nem ajánlom az akvarisztikával csak most ismerkedőknek. Lágy és savas vízben érzi jól magát, nem szabad megfélekezni a rendszeres, gyakori vízcseréről sem, ami 20-30 %-os legyen. Erős, akár külső szűrőt használjunk, mivel kristálytiszta és bomlástermékektől mentes vizet igényel. Társaságnak elsősorban kisebb-közepesebb harcsákat, pontylazacokat, nagy akváriumban más törpesügeket, vitorláshalat javasolok. Más kontinens halainál is tartuk ezt szem előtt. Csipkelődős nagyobb márnákkal, ragadozó harcsákkal, agresszívebb labirinthalakkal kerüljük egybehelyezését. Cserepekből, kókuszhéjakból könnyen megfelelő búvóhelyeket készíthetünk nekik, amik ívóhelynek is megfelelnek. Nem árt a dús növényzet, hogy jól érezze magát. Sötét talaj és háttér, valamint szűrt fény mellett mutatja színeit leginkább.

A száraz eleséget csak megfelelő szoktatás után fogadja el, de nem mindig sikerül rászoktatni. Élő és fagyasztott eledeleket kapjon, de lehetőleg tubifexszet kerüljük, vagy csak ritkán és alaposan kimosva, pihentetve. Szigorúan tilos vörös szúnyoglárvával etetni, mivel ettől súlyos bélgyulladást, emésztőszervi betegségeket szerezhet, ami legtöbbször végzetes.

Tenyésztéséhez lágyvíz szükséges. Kezelhetjük égertobozzal vagy Tebang-levéllel akár, ami mellesleg tartásakor is jól jöhet. A hőfokon is emelhetünk akár egy keveset. Háremben tartva egyszerre több nősténnyel is ívhat, a hím védi a területet, a domináns nőstény az ikrákat. A kishalak kikeltük után sőrakkal, rotatóriával indíthatóak.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Red Streak Cichlid, Rotstrich Cichlid, Blackseam Cichlid.

Egyéb köznevei: Rødstribet dværgcichlide, Tulikääpiöahven, Rostrich-Zwergbuntbarsch, Rotstrich Apistogramma.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [Apistogramma hongsloui](#), [Vöröscsíkos törpesügér](#), [Kullander](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Cichlidae](#), [1979](#)

JELLEMZŐK:

[ragadozó](#), [átlátszó vízi](#), [Amazónia](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [barna vízi](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Dél-amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Andok orsz.](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [békés viselkedés](#), [középső szint](#), [plankton és detrituszfogyasztó](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [átlagos élethossza](#)

3-6 év, Ecuad.-Kol., Amerika, igenlágvyízi (0-5°Nk), lassú mozgású, közepes méretű 5-10 cm, lágvyízi (5-10 Nk°), sűrű növényzetigényű, közepes hőigényű 20-25°C.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-08-25 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2015-06-14 21:07:20

Katalógus ID: 4420

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/apistogramma-hongslói.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva