

Apistogramma ortmanni - Ortmann - törpesügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Eigenmann, 1912
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	5,5 cm
C°:	23,0-29,0
pH°:	6,0-6,5
Nk°:	0-8
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	ragadozó, társas
TÁPLÁLÉK:	élő eleség
TARTÓZKODIK?	alsó és középső szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Apistogramma ortmanni


Ortmann - törpesügér
(Eigenmann, 1912)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Guyana és az Amazonas-medence középső része.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A test megnyúlt, hosszúkasan tojásdad. A hím farkúszója kissé befelé hajló, a nőstényé kerek. Színezet és ivarikülönbségek: Az alapszín sárga, a nőstény kék csillogású. Hol halvány, hol erőteljesebb 8—9 keresztsáv látható rajta, ezeket gyakran hosszanti csík köti össze. A sárga szín a nőstényen erőteljesebb lehet. Izgalmi állapotban a fejen megjelenő tipikus *Apistogramma* csíkokon kívül a test közepén és a faroktőnél is egy-egy fekete pont látható. A faj színváltoztató képessége igen nagy; bizonyos színbeli jelenségek a többi *Apistogramma* fajéhoz hasonlóan meghatározott viselkedési fázisokhoz kapcsolódnak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Hőmérséklet 22—26 C°. A gondozás és tenyésztés nem okoz különösebb problémákat. A nőstény a peték védelmében nagyon támadó kedvű. A hímeket nem tűri meg a közelben, de a költési terület egészének védelmében mégis van valami szerepe a hímnek is. A peték színe narancsszínűtől téglavörösig változhat. Az ivadékok 75 órával később kibújnak, s először homokgödörbe teszik őket. A 8 nappal később szabadon úszkáló utódok barnás színűek.

Célszerű élő eleségekkel táplálni, de a vörös szúnyoglárvát és a tubifexet is lehetőleg kerüljük.

Az erős szűrő fontos lehet, gyakori vízcserékkel egybekötve. Békés amerikai halakkal remekül társítható, érdemes 1 hím 2 nőstény arányban gondozni. Lágú és savas vízben, dús növényzet között, és sötét háttér és talaj "össztüzében" érzi igazán jól magát.

Idehaza csak ritkán kapható.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Heterogramma ortmanni*.

Eng: Ortmann s Dwarf Cichlid.

Egyéb köznevei: Ortmanns dvargcichlide, Savukääpiöahven, Zumuremo-Apistogramma, Pielegniczka ortmana.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [1912](#), [akvarisztika](#), [Cichlidae](#), [Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [Apistogramma ortmanni](#), [Ortmann - törpesügér](#), [Eigenmann](#)

JELLEMZŐK:

[alsó szint](#), [lassan mozgó vízi](#), [Guyanák](#), [békés viselkedés](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [középső szint](#), [plankton és detrituszfogyasztó](#), [igenlágúvízi \(0-5°Nk\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [lágúvízi \(5-10 Nk°\)](#), [lassú mozgású](#), [Amerika](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [ragadozó](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Amazónia](#), [átlátszó vízi](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Dél-amerika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-10-01 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-06-15 09:07:26

Katalógus ID: 4176

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/apistogramma-ortmanni.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva