

Aponogeton crispus - Fodros vízikalász

ELSŐ LEÍRÓJA:	Thunb.
CSALÁD:	Aponogetonaceae
MAGASSÁGA:	40 cm
C°:	24-27
pH°:	5,5-7,5
Nk°:	0-20
HELYIGÉNY:	100 liter
TALAJTÍPUS:	sóder, kvarchomok
TÁPANYAG:	gyökér útján elsődlegesen, közepes igényű
ÜLTETÉS:	hátsó zóna
FÉNYIGÉNYE:	közepes
TERM.VÉD.:	gyakori



Aponogeton crispus
Fodros vízikalász
 (Thunb.)


TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Ázsia; India, Srí Lanka (Ceylon) és Banglades lassúbb vízfolyásai, állóvizei.

TOVÁBBI KÉPEK:



KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Némileg hasonlít a fodroslevelű vízikéhez, de nem "buborkás" leveleinek felülete, hanem enyhén csavarodott, főleg a levélszéleken tűnik ez fel. Hosszú levélnyele van, szép üdezőld leveleinek széle fodros, erről kapta magyar elnevezését. Hosszú levelei relative keskenyek, majdhogynem hegyesek. Gyöktörzsről hajt. Kalászszerű virágzatát víz fölött hozza.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nem túl nehéz tartása, aránylag jól fejlődik átlagos körülmények között is. Gyors növekedéséhez hozzájárulhatunk, ha tápanyagokban dús talajt biztosítunk neki. Szén-dioxid tápozást nem igényel, közepes megvilágítás mellett már tarthatjuk. Nem igényel speciálisan beállított vizet, s bár a lágú és enyhén savas közeget kedveli igazán, még akár kemény és kissé bázikus vízben is fejlődik.

Könnyedén elbokrosodik, remek háttér, vagy saroknövény, a halaknak is jó búvóhelyet jelent. A víz fölé is kinyúlhat esetenként, ilyenkor virágozhat is. Társas medencékbe is kitűnő választás, az átlag halak nem eszik meg leveleit. Magról szaporítható, de ez inkább csak vízinövény-kertészetekben jellemző. Ilyenkor úgy járnak el, hogy alacsony vízborítottságú homokba ültetik, majd növekedésével párhuzamosan kell a vízszlop magasságát emelni és tápozni a növényt. Sárga, vagy elöregedett leveleit a tónél válasszuk le.

Élőhelyén olyan területeken nő, ahol az esős évszakban borítja csak víz teljesen, de akváriumban nincs szüksége nyugalmi periódusra, egész évben tartható víz alatt. Kedvelt, gyakori akváriumi növény. Magas akváriumokba különösen ajánlott.

Ismerjük pirosas levelű változatát is. Könnyen kereszteződhet más *Aponogeton* fajokkal.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Aponogeton echinatus*, *Spathium crispum*, *Spathium echinatum*

Eng: Ruffled Aponogeton, Crinkled Aponogeton, Wavy-edged Aponogeton, Ruffled Sword Plant

Egyéb köznevei: Krause Wasserähre

KATEGÓRIÁK:

[Indoausztrál régió növényei](#), [Akváriumi növények](#)

KULCSSZAVAK:

[Thunb.](#), [Indoausztrál régió növényei](#), [Akváriumi növények](#), [akvarisztika](#), [Aponogetonaceae](#), [Aponogeton crispus](#), [Fodros vízikalász](#)

JELLEMZŐK:

[közepesen fényigényes \(500-1000 lux\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Sri-Lanka](#), [mérsékelt tápanyagigényű](#), [közepesen áramló vízi](#), [igenlágúvízi \(0-5°Nk\)](#), [kvarchomok talaj](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#),

[lassan mozgó vízi](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [sóder talaj](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [közepes növekedésű](#), [gyöngykavics talaj](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [hátsó zónába ültetendő](#), [állóvízi](#), [átlagos keménységű](#), [közepes\(20-50 cm\)](#), [barna vízi](#), [közepes tápanyagigényű](#), [Ázsia](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Dél-Ázsia](#), [gyors növekedésű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [sárga vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [átlátszó vízi](#), [India](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Horn Péter, Zsilinszky Sándor: **Akvarisztika**

Larousse: **Halak és akváriumok**

www.aquaticplantcentral.com/forumapc/plantfinder/details.php?id=87

Beküldte: mark24

Katalógusba került: 2012-10-31 13:42:07

Legutolsó frissítés: 2018-01-29 07:58:07

Katalógus ID: 5103

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/indoausztral-regio-novenyei/aponogeton-crispus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva