

Aulonocara baenschi - Napfény császársügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Mayer, 1985
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	hím 15 cm, nőstény 13 cm
C°:	25-28
pH°:	7-8,5
Nk°:	12-25
HELYIGÉNY:	250 liter
VISELKEDÉS:	társíthatósága viszonylagos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	az összeset bejárja, de elsősorban a középső szint
ÉLETTARTAM:	~8-10 év
TERM.VÉD.:	



Ezzel a fajjal részletesebben foglalkozunk a következő cikkben:

[2012 Április díszhala: a napfény császársügér](#)

Aulonocara baenschi

Napfény császársügér

(Mayer, 1985)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Aulonocara baenschi – Napfény császársügér elterjedési területe (Map)

TOVÁBBI KÉPEK:



Kelet-Afrika, Malawi-tó, *Nkhomo* zátony (8 kilométerre *Benga* településétől) közelében, továbbá *Maleri*, *Nankoma*, *Nakatenga*, *Namalenje* és *Mumbo* szigetének környéke.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Magasabb testfelépítésű, nagyobbacska termetű sügérféle. A fej csúcsos. Színezete gyönyörű. Az alapváltozat aranyárga, torka kék, és hátúszójának szegélye világos. Létezik narancsos és vörös színváltozata is.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A napfény császársügérhez van egy nagyon hasonló faj, vagy valamilyen alfaj, aminek tudományos helye még nem tisztázott, a következő variánsai fordulnak elő, melyeket általában az *A. baenschi*-vel együtt emlegetnek: - Aulonocara spec. "stuartgranti maleri" - Aulonocara spec. "stuartgranti maleri Nankoma" - Aulonocara spec. "stuartgranti maleri Cidunga" (Narancsos nyaki részével kitűnik a sügérkavalkádból!) - Aulonocara "Red Rubin" (Nagyon szép piros színekben tündököl!) - Aulonocara "Super Red Selected" (Az *A. jacobfreibergi* "Eureka" mellett az egyik legszebb vörös színezetű császársügér!) A tündöklő vörös színezet csak plankton és spirulina etetésével tartható fenn!

A szaporítása nem olyannyira egyszerű, de egy gyakorlottabb császársügéres már meg tudja oldani. Szájköltők, a nőstényektől bizonyos idő után érdemes lehet elvenni a kicsiket, melyek száma 20 és 50 között változik általában. Fontos tudni, hogy nem érdemes más császársügérekkel társítani, mivel összevérsájkából nem kívánt keverékek keletkezhetnek! A nőstények ezüstszerű színezetükkel nem olyan színesek mint a hímek, ezért gyakran a hatalmas bemutató medencékben csak hímeket gondolnak, és így több fajt és változatot tarthatnak együtt. Nem agresszív sügér, de kell a kellő férőhely, hogy békében kijöjjön az akvárium más lakóival is. Ajánlott kövekből búvóhelyeket építeni. A külső szűrő fontos, a tiszta vizet kedveli. Élettani csoportja szerint nem *mbuna* sügér. Más malawi sügérekkel (pl.: *Nimbochromisok*, *mbunák*) társíthatóak, mi több, megtűrik maguk mellett minden további nélkül a nagyobb testű csíkféléket, algázókat, hátonúszó és egyéb más harcsákat, sőt, bizonyos társításokban keményvíz-igényük végett még kalászhallakkal is társítják őket. Növényzetet ültetni felesleges, maximum Anubiasokkal próbálkozzunk, pár tövel a háttérben! Etetésüket célszerű, ahogy azt már említettem, spirulinával, planktonnal és speciális malawi-tavi sügértáp-keverékkel megoldani!

Sajnos, mint sok más *Aulonocara*-császársügér a megritkult, veszélyben lévő fajok közé tartozik, ezért is lennének sokkal jobbak az akváriumban tenyésztett halak a vadonból befogottakkal szemben, amiket csak esetleges vérfrissítésre szabadna használni. Törekedjünk megvédeni e csodás ökoszisztémákat, hisz a kelet-afrikai nagytavak élővilága egyedülálló a földkerekségen, a Viktória-tóval történt katasztrófa épp elég (a nílusi sügér betelepítése végett az őshonos Viktória-tavi sügérek, tilápiák és az elképesztően színpompás *Haplochromisok* súlyos veszélybe kerültek, többjük már közel a kipusztulás szélén áll)!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Arany-kék császársügér;

syn: -.

Eng: Nkhomo-Benga Peacock, Yellow Peacock Cichlid.

Egyéb köznevei: New yellow regal, Nkhomo-benga peacock, Yellow peacock, Keltakeisariahven, Baenschs Malawibuntbarsch, Yellow Regal-Buntbarsch, Chisawasawa.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcshőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1985](#), [Aulonocara baenschi](#), [Mayer](#), [Napfény császársügér](#), [Akvárium halak](#), [akvarisztika](#), [Cichlidae](#), [Afrikai sügérek](#)

JELLEMZŐK:

[Malawi-tó](#), [békés viselkedés](#), [mindenevő](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [középső szint](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [, nagyméretű 10-20 cm](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [Afrika](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [növényt nem igényel](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [Kelet-Afrika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [lúgos \(8pH-nál több\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [közepesen aktív mozgású](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2011-11-30 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2017-08-30 13:10:23

Katalógus ID: 4365

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/aulonocara-baenschi.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva