

## Aulonocara maylandi - Aranyhomlokú császársügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Trewavas, 1984
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	15 cm
C°:	25-27
pH°:	7-8
Nk°:	10-25
HELYIGÉNY:	250-300 liter
VISELKEDÉS:	aránylag társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső-felső
ÉLETTARTAM:	10-11 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



**Aulonocara maylandi**  
*Aranyhomlokú császársügér*  
 (Trewavas, 1984)

### TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Aulonocara maylandi – Aranyhomlokú császársügér elterjedési területe (Map)

Kelet-Afrika; Malawi-tó

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A szokásos császársügér-alakú faj, magas homlok jellemzi. Sötétszürke-feketés csíkú oldala, homloka arany színű. A nőstény ezüstszürke.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nem nevezhető kényes fajnak, de a rendszeres cserélt vízre és az erős szűrésre azért oda kell figyelni.

Tágas medencét igényel, hogy legyen elég kiúszótere. 1 hímes háremben is lehet tartani, illetve nem túl sok hím-sok nőstény arányban, nagyobb medencében. Könnyen összeívhat más császársügérekkel, ezért ha több fajt/variánst kívánunk tartani, akkor inkább csak hímekeket telepítsünk, pláne, ha díszmedencének szánjuk. Tenyésztés esetén úgyse egyben tartjuk őket. Kövekből néhány búvóhelyet építsünk, de hagyjunk úszóteret! Anubiasokat ültethetünk.

Etethető jó minőségű sügérgranulátumokkal, nem érzékeny, nem jellemző rá a bélgyulladás. Hogy vitalitása és szépsége megmaradjon, fagyasztott tápokkal, sügérmixekkel is célszerű rendszeresen etetni.

Anyai szájköltő, durván 3 hetet forgat, de 2 hét leteltével bátran elvehetőek a kicsik "hánytatásos" módszerrel. Sórakkal indíthatjuk őket. Napi többszöri etetés, tágas hely, rendszeres vízcsere mellett jó ütemben nőhetnek!

Az egyik legmutatósabb császársügér, ahhoz képest, hogy nem tündököl a szivárvány minden színében. Ehhez képest még nem túl gyakori idehaza.

## **EGYÉB ELNEVEZÉSEK:**

**syn:** *Aulonocara maylandi maylandi*.

**Eng:** Sulfurhead Aulonocara.

**Egyéb köznevei:** Rikkikeisariahven, Goldkopf-Kaiserbuntbarsch, Schwefelkopf-Kaiserbuntbarsch, Chisawasawa.

## **KATEGÓRIÁK:**

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

## **KULCSSZAVAK:**

[Afrikai bölcsőszájúhalak](#), [Trewavas, 1984](#), [Aranyhomlokú császársügér](#), [Akváriumi halak](#), [Aulonocara maylandi](#), [akvarisztika](#), [Cichlidae](#)

## **JELLEMZŐK:**

[kissé agresszív viselkedés](#), [mindenevő](#), [Malawi-tó](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [középső szint](#), [felső szint](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [gyér növényzetigényű](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [Afrika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Kelet-Afrika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [közepesen aktív mozgású](#).

## **FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:**

**Írta:** Liziczai Márk

**Katalógusba került:** 2012-11-18 09:01:17

**Legutolsó frissítés:** 2017-08-08 14:30:37

**Katalógus ID:** 4500

**Oldal linkje:** [https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju\\_halak/afrikai-fajok/aulonocara-maylandi.html](https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/aulonocara-maylandi.html)

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva