

Australoheros facetus - Csíkos disznósügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Jenyns, 1842
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	18 cm
C°:	25,0-30,0
pH°:	6,5-7,0
Nk°:	5,0-12
HELYIGÉNY:	260 liter
VISELKEDÉS:	civakodó természetű
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső- és alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt




Australoheros facetus

Csíkos disznósügér

(Jenyns, 1842)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Brazília déli, Argentína és Uruguay északi részének álló és lassan folydogáló vizeiben. Különösen a nagy folyók oldalágaiban, édes- és félsósvizekben egyaránt, találhatók nagy számban.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Oldalt mérsékelten lapított, a hát enyhén ívelt, a homlok meredeken emelkedő, s az idősebb állatoké a szem fölött egy kissé benyomott. A farokúszó legyezőszerűen elkerekedő, a mellúszók meglehetősen nagyok. 30 cm-nél hosszabbra is nőhet, akváriumban azonban általában kisebb marad, s amikor eléri a 8 cm hosszúságot, már ivarérett. A hangulattól és környezettől függően erősen változó. Általában szürkéssárga alapon többé-kevésbé jól megkülönböztethető keresztsávok láthatók; az úszók vagy

átlátszók, vagy barnásvörösesek. Ívás idején a színek jóval határozottabbakká válnak, úgyhogy az állatok ilyenkor kifejezetten szépek is lehetnek. Az ivarok nehezen különböztethetők meg, néha csak a más alakú genitális szemölcsük alapján. A hím szemének szivárványhártyája vörös.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Egy időben ismert és kedvelt Cichlida volt, manapság kevesen gondozzák. "Értelmes"-nek tartják, de nagyon túr és marakodó. Minthogy igénytelen és ellenállóképes, könnyen tartható szabadtéri medencékben, különösen kedvező és meleg nyarakon még tenyésztethető is bennük. Hőmérsékleti igénye: 22— 24 C°, tenyésztéskor 24— 27, de minimálisan 12 C°.

Nagy akváriumban jól gondozható más fajokkal, kisebb medencében marakodóvá és veszekedőssé válhat. Az ikrázó pár erősen védi területét.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Chromis facetus*, *Cichlasoma facetum*, *Herichthys facetum*, *Nandopsis facetum*.

Eng: Chameleon cichlid, Chanchito.

Egyéb köznevei: Chanchito, Kalterikirjoahven, Cará, Castanheta, Castaneta, Palometa, Peine, Vieja, Chanchito.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1842](#), [Cichlidae](#), [Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [Australoheros facetus](#), [Csíkos disznósügér](#), [Jenyns](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Bolívia](#), [átlátszó vízi](#), [Amazónia](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Argentína](#), [közepesen áramló vízi](#), [barna vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [Dél-amerika](#), [közepesen aktív mozgású](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [mindenevő](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [középső szint](#), [gyér növényzetigényű](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [alsó szint](#), [lassú mozgású](#), [Déli kúp](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [nagyméretű 10-20 cm](#), [Paraguay](#), [Amerika](#), [összeférhetetlen viselkedés](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-10-05 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-11-11 10:36:52

Katalógus ID: 4181

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/australoheros-facetus.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva