Barbodes binotatus - Foltos díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Valenciennes, 1842
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	12-20 cm
C°:	24-26
pH°:	6-6,5
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	240 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó-középső
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Barbodes binotatus
Foltos díszmárna
(Valenciennes, 1842)

TOVÁBBI KÉPEK:









TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Barbodes binotatus – Foltos díszmárna elterjedési területe (Map)

A maláji szigetvilág kisebb-nagyobb tavaiban és folyóiban, egészen a Fülöp-szigetekig, Indonéziában mindenhol nagyon gyakori.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A test karcsú és megnyúlt, a végállású szájon 4 szál bajusz van. D 12, A 8. Hosszúsága hazájában 15 cm, akváriumban 10-12 cm. Ezüstös csillogású, oldalát néhány fekete pont és folt tarkítja, amelyek izgalmi állapotban vörösek lesznek. A nőstény hasfala domború, a hím karcsúbb.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Vegyes akváriumba is ajánlható, ahol nincsenek olyan fajok, melyekre úszócsipkedésével vagy méretével veszélyt jelenthetne. Rajhal, 6-8 példányt legalább gondozzunk, és a megfelelő kiúszótérre is figyeljünk oda. A háttérben növényesíthetünk dúsan, de a finomabb levelű növényeket megcsipkedheti. Aktív úszó, ezzel a lassabb és nyugodtabb halakat (vitorláshal, gurámik) zavarhatja. Akváriumban 12 cm-nél ritkán nő nagyobbra, de a vadonból regisztráltak már 20 cm-s egyedeket is.

Érdemes külső szűrést alkalmazni, hogy tiszta vizet biztosíthassunk nekik, és a vízcserékre is figyeljünk. Társítani hasonló kaliberű márnafélékkel célszerű.

Ázsiában közönséges márnafajnak számít, széles körben elterjedt és nagyon sok él belőle szerencsére.

Sokféle táplálékot elfogad, száraz tápokat kaphat alapeledelnek, de ezt mindenképpen ki kell egészíteni élő és fagyasztott tápokkal, amivel különösen ívás előtt kell "tuningolni" a halakat. Némi növényi táplálékra is szüksége van, amit például forrázott zöldségekkel biztosíthatunk számára.

Tenyésztése a márnáknál szokásos, szabadon ívó és ikrafogyasztó halak, ezért ívatórácsot használjunk, a medencét jávai mohával is kibélelhetjük. Akár nemenként 5-6 egyedet is kirakhatunk, így nagy mennyiségű ikra érhető el. Az ívás gyakran már a kihelyezés utáni hajnalon beindul. Ha leívtak, vegyük ki a szülőket, mert potenciális veszélyt jelentenek ikráikra, és persze addig sem piszkítják a vizet. Az ivadékok ikrázástól számított 3-4 napon belül etethetőek, indítóeleségnek infusoria-méretű táplálékra van szükség, de hamar elfogadják az artémia naupliákat is! Tágas helyre és rendszeres vízcserére lesz szükségünk. A szétnövésre ügyeljünk!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: Capoeta binotatus, Puntius binotatus, Systomus binotatus, Systomus maculatus, Barbus oresigenes, Barbus blitonensis, Barbus kusanensis, Barbus polyspilos, Systomus goniosoma, Barbus goniosoma, Barbus maculatus hagenii, Puntius sibukensis, Barbus palavanensis, Barbus quinquemaculatus, Barbus ivis, Puntius sealei

Eng: *Spotted barb*

Egyéb: Nga-nyanma, Parmička zlatolesklá, Paritäpläbarbi, Fleckenbarbe, Bilak, Klemar, Wader cakul, Kulprich, Bunter, Putih, Tebal sisek, Pyatnistyi puntius, Pait

KATEGÓRIÁK:

Pontyfélék, Akváriumi halak

KULCSSZAVAK:

1842, Akváriumi halak, Cyprinidae, akvarisztika, Pontyfélék, Barbodes binotatus, Foltos díszmárna, Valenciennes

JELLEMZŐK:

félsavas (6-6.5 pH), átlagos élethossza 3-6 év, sárga vízi, hőigényes (25-30 °C), átlagos növényzetigényű, nagyon aktív mozgású, alsó szint, nagyméretű 10-20 cm, békés rajhal, igenlágyvízi (0-5°Nk), Borneó, lágyvízi (5-10 Nk°), barna vízi, Ázsia, közepes hőigényű 20-25°C, Dél-Ázsia, Vietnám, közepesen keményvízi 10-15°Nk, Indonézia, közepesen áramló vízi, Szumátra, mindenevő, Thaiföld, nagy (több 200 liternél), középső szint.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15
Legutolsó frissítés: 2014-06-29 08:07:42
Katalógus ID: 3967
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/barbodes-binotatus.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva