

Barbodes kuchingensis - Hamiscsíkos díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Herre, 1940
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	10-12 cm
C°:	22-27
pH°:	6-6,5
Nk°:	4-15
HELYIGÉNY:	180 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső
ÉLETTARTAM:	4-6 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Barbodes kuchingensis
Hamiscsíkos díszmárna
 (Herre, 1940)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Barbodes kuchingensis – Hamiscsíkos díszmárna elterjedési területe (Map)

Indonézia, Borneó szigete, a Kapuas-medence, Kuching város környéke, Sarawak területei az élőhelye, a Kapuas-folyórendszer és a Danau Sentarum tórendszer vizeiben elterjedt.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Formájában és testméretében a többi díszmárnához hasonlít, alapszíne narancsos, akárcsak úszói és kopolyúfedője. Nevét az oldalán látható érdekes pontsorokról kapta, melyek optikailag sávokká állnak össze, legjellegzetesebb az oldalonali pontsor, mely a fej felől indulva 3 ponttal később a has felső részére esik le, majd 8 pöttyel később visszatér az oldalonhoz (miközben egy függőleges csík a felénél metszi, és így egy kereszt forma alakul ki), hogy a farokúszó tövéénél érjen véget. Két igazibb, függőleges

csíkot láthatunk a kopoltyú mögött és a hátúszó tövétől kiindulva, és egy függőleges pontsort a faroknyél közepén. Szemén nem halad át a jellegzetes díszmárna csík. A felnőtt hímek kopoltyúfedője erős narancsszínű, úszói füstös árnyalatúak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Élőhelyén tiszta vizű medencékben és alacsonyabb dombok erdei vízfolyásaiban él, rendszerint homokos vagy kavicsos mederben. A folyóba hulló levelek sárgásra színezhetik a vizet.

Elég kiúszótér esetén gondozhatunk ilyen halakat, de rajban tartsuk őket. 6 egyedet célszerű legalább vásárolni. A háttérben növényesítsünk, több helyen ültethetünk vízinövényeket, melyek búvóhelynek megfelelnek, de hagyjuk meg a kiúszás lehetőségét is a halaknak. Kövekkel, ágakkal remekül dekorálhatunk.

Kitűnő faj egy délkelet-ázsiai biotóp medencébe, de vegyes társas akváriumokban is gondozható. Békés hal, csapat hiányában félénkké válik. Társíthatjuk különböző dániókkal, razbórákkal, díszcsíkokkal, közepesebb gurámifajokkal, míg társas medencében rengeteg közepesebb termetű hallal megfér. Egy, a délkelet-ázsiai (kitüntetett figyelemmel Borneóra) vizeket bemutató nyilvános medence remek halai lehetnek.

Vízigényeit tekintve nem túl kemény csapvízben is gondozható, viszont a lágy és enyhén savas víz a legtökéletesebb hozzá. Égertobozzal, Tebang-levéllel remekül kezelhetjük vizét, hálás lesz érte.

Etetését tekintve legjobb élő és fagyasztott tápokon tartani, viszont a szárazeledeleket is elfogadja, ha hozzájuk szokott. Kevés növényi táplálékra is szüksége van, mert a leggyengébb levelűeket megcsipkedheti.

Sajnos akváriumi tenyésztése nem jellemző, akárcsak tartása sem, erről biztos források nem igazán állnak rendelkezésre. A legtöbb rokon márnához hasonlóan szabadon ívó, ikrarács használata javasolt, mert ikrafaló. Célszerű lágy, semleges közeli (enyhén savas), esetleg égertobozzal kezelt vízbe kitenni őket ívni. Általános szabály, hogy ikrázás előtt jó formába kell hozni a szülőket élő eledelkkel. A szaporodás után távolítsuk el őket, a kicsiket mikroszkópikus eledellel indíthatjuk elúszásuk után, majd frissen kelt artémiával nevelhetők.

Sajnos csak nagyon ritkán lehet őket beszerezni. Eléggé hasonlítanak a farkszalagos díszmárnához, különösen annak egy speciális változatához, de az jóval gyakoribb náluk. A valódi everett-márna is néha megtévesztően hasonlíthat rá.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Kuching díszmárna.

syn.: Puntius kuchingensis

Eng.: False spanner barb

Egyéb: Bangas, Parmička saravacká

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1940](#), [Pontyfélék](#), [Cyprinidae](#), [Akváriumi halak](#), [Barbodes kuchingensis](#), [akvarisztika](#), [Hamiscsíkos díszmárna](#), [Herre](#)

JELLEMZŐK:

[gyors vízáramlású](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#), [békés rajhal](#), [középső szint](#), [Borneó](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Ázsia](#), [átlátszó vízi](#), [Dél-Ázsia](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [sárga vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-29 08:11:36

Katalógus ID: 3980

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/barbodes-kuchingensis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva