


## Barbodes lateristriga - Farkszalagos díszmárna

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| ELSŐ LEÍRÓJA: | Valenciennes, 1842 |
| CSALÁD:       | Cyprinidae         |
| MÉRET:        | 15 cm              |
| C°:           | 25-28              |
| pH°:          | 6-7                |
| Nk°:          | 4-15               |
| HELYIGÉNY:    | 280 liter          |
| VISELKEDÉS:   | békés              |
| TÁPLÁLÉK:     | mindenevő          |
| TARTÓZKODIK?  | középső            |
| ÉLETTARTAM:   | 5-8 év             |
| TERM.VÉD.:    | gyakori            |



**Barbodes lateristriga**  
*Farkszalagos díszmárna*  
 (Valenciennes, 1842)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Barbodes lateristriga – Farkszalagos díszmárna elterjedési területe (Map)

Délkelet-Ázsia, Thaiföld, Malájzia, Szumátra és Jáva folyóiban és patakjaiban él.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A fiatal halak testét két függőleges sáv keresztezi. Faroknyelén széles, vízszintes fekete vonal fut hátrafelé és a farokúszó néhány központi sugarán folytatódik. Mintázata ivaréskor elhalványul és a test felhős, rózsaszín fényt kap.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Elégé nagyra nő tágas akváriumban is. Viselkedése példányonként változó: vannak rendkívül békés

egyedek, de előfordulnak kissé veszekedősek is. Ezért ajánlatos vele körülbelül azonos nagyságú halakkal tartani (pl. cápamárna, megfelelő méretű harcsák stb.). Szereti a tágas, kristálytiszta vizű, közepesen jól benövényesített akváriumot, ahol megfelelő kiúszó tér is rendelkezésre áll. Elég magas az oxigénigénye, ezért a megfelelő szellőztetésről is gondoskodnunk kell.

Eredeti élőhelyén kissé savas kémhatású (6-6,5°pH), nem túl kemény, meleg, de oxigéndús vízben élnek. Ennek ellenére szinte minden vízfajtahoz elég jól alkalmazkodik, csak a °pH értékre kell vigyáznunk, hogy 7,5 fölé ne menjen.

Etetése nem okozhat gondot, mindenféle száraz- és élő eleséget jó étvággal fogyaszt. Egy kevés zöld táplálékot is igényel, különben megcsipkedheti a növényzetet.

Tenyésztése nem túl nehéz, csak megfelelő méretű tenyészedencét kell használnunk. Ez legalább 90 cm hosszú legyen és az aljára helyezünk el mogyoró nagyságú kavicsokat vagy ikrarácsot, mert halaink erősen ikrafalók. Olyan helyre helyezük el, ahol a kora reggeli napfény eléri az akváriumot. Töltsük fel enyhén savas vagy semleges, 6°Nk körüli lágy, 28°C-os vízzel 15 cm magasságig, majd erősítsünk több helyre is finom levelű ívató növényt. Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről és szivacsűrő beállításával a víz szűréséről is. Az így előkészített akváriumba az esti órákban helyezük át az előzőleg nemenként szétválasztva tartott, egészséges, kitűnően kondicionált (élő- és növényi eleségen tartott) tenészpárunkat.

Az ívás rendszerint másnap reggel megtörténik, heves kergetőzés közben. A peték száma akár ezres mennyiségben is mérhető lehet! A szülőket erős ikrafaló hajlamuk miatt az ívás végeztével azonnal távolítsuk el. A lárvák kb. 2 nap alatt kelnek ki, az üvegen és más tárgyakon függeszkedve fejlődnek, míg el nem jön az elúszás ideje. Frissen kelt *Artemia* naupliuszaival, poreleséggel, infusoriával indíthatóak. Elég gyorsan fejlődnek, nekünk meg fájhat a fejünk, hogy elég helyet találjunk számukra!

Remekül mutatnak, ahogyan csapatban úszkálnak egy nagy díszakváriumban. Egy külső szűrővel ellátott medence, ahol hasonló nagytetű halakkal élnek, minden igényüket kielégíti. Kifejlett halakhoz ne próbáljunk más halak kisebb egyedeivel telepítést megkísérelni (pl. lazacok), mert legtöbbször haleleség lesz belőlük, ugyanis a náluk sokkal kisebb példányokat általában levadásszák! Nagyon aktív és gyors mozgású halak, nehéz kifogni őket, még egy üres akváriumból is!

## **EGYÉB ELNEVEZÉSEK:**

**syn:** *Barbodes lateristriga*, *Barbus lateristriga*, *Systemus lateristriga*.

**Eng:** Spanner Barb, T-Barb.

**Egyéb köznevei:** Parmička černopásá, Parmička černopruhá, Parmička pruhocasa, Parmička pruhovaná, T-bandsbarbe, Ristibarbi, Schwarzbandfleckbarbe, Dokun, Korsbarb.

## **KATEGÓRIÁK:**

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Valenciennes, 1842](#), [Cyprinidae](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Pontyfélék](#), [Barbodes lateristriga](#), [Farkshalagos díszmárna](#)

## JELLEMZŐK:

[nagy \(több 200 liternél\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [sárga vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [nagyon aktív mozgású](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [gyors vízáramlású](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [békés rajhal](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [barna vízi](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Ázsia](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [Dél-Ázsia](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Indonézia](#), [gyér növényzetigényű](#), [közepesen áramló vízi](#), [Szumátra](#), [mindenevő](#), [Thaiföld](#), [középső szint](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2009-06-05 09:01:15

**Legutolsó frissítés:** 2014-06-15 11:59:34

**Katalógus ID:** 3981

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/barbodes-lateristriga.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva