

Bedotia geayi - Vörösfarkú kalászhál

ELSŐ LEÍRÓJA:	Pellegrin, 1907
CSALÁD:	Bedotiidae
MÉRET:	9-12 cm
C°:	20-25
pH°:	7-8
Nk°:	10-20
HELYIGÉNY:	120 liter
VISELKEDÉS:	békés, rajhal
TÁPLÁLÉK:	mikroragadozó
TARTÓZKODIK?	középső-felső
ÉLETTARTAM:	4-6 év
TERM.VÉD.:	veszélyeztetett



Bedotia geayi
Vörösfarkú kalászhál
(Pellegrin, 1907)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Bedotia geayi elterjedési területe (Distribution map)

Madagaszkár szigetén őshonos, kizárólag a Mananjary folyásvidékéről ismerjük. Főleg kisebb patakok, folyók tiszta vizeiben található meg, erdős területeken.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Megnyúlt testű, karcsú hal. Viszonylag kicsi, hegyes fejjel rendelkezik. Teste ezüstös, illetőleg aranybarna alapszínű mutat. Halunk teste középső tájékán, hosszanti irányban elnyúló fekete sávot visel, s gyakran az alhasi régió is láthatunk ilyen mintázatot.

Rendkívül könnyű összetéveszteni a *Bedotia madagascariensis*-szel! A fő különbség, hogy a vörösfarkú kalászhál esetében a farkúszón csupán egy fekete folt jelzi a testközépi csík kiterjedését, míg a *B. madagascariensis* esetében ez tovafut a középső úszósugarak területén. Farkúszójuk mintázata egyébiránt hasonló, e faj esetében is a fekete foltot egy halvány színű terület követi, majd némi fekete és a farkúszó végén piros szín mutatkozik meg. Általában nagyobb kiterjedésű a fekete-piros színek jelenléte a *Bedotia geayi* faj farkúszóján, mint hasonló küllemű rokonánál. A vörösfarkú kalászhál esetében a második hátúszó és a farok alatti úszó kevésbé erőteljesen pigmentált, inkább csupán a külső szegélye mutat pirosas színt. Fontos faji bélyeg, hogy a vörösfarkú kalászhál alsó állkapcsán piros foltot visel!

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A vörösfarkú kalászhál kezdők számára is ajánlható, könnyen tartható faj. Csapatban gondozzuk, legalább 6-8 példányát helyezzük el. Tartásukra egy 120 liter körüli medence már elégséges, de minél nagyobb helyet biztosítunk nekik, annál jobb. Akváriumukat jól kell szűrni, ugyanis élőhelyük folyó vizeiben nem szaporodik fel nagy koncentrációban a bomlástermék. Ez ellen rendszeres, részleges vízcserékkel is tehetünk. Viszonylag oxigénigényes faj, ezt ne feledjük sem tartásuk, sem szállításuk során!

Szívós és nem kényes halak, s a legtöbb akvárium nyújtotta feltételek meg is felelnek számukra, de az extremitásokkal szemben nem olyan ellenállóak, mint a madagaskári kalászhál, ez már csak szűkebb elterjedési területükből is fakad. Inkább hűvösebb vízben tartjuk őket, 23-25 °C például teljesen ideális. Semleges kémhatású, kemény-középkemény vizet igényelnek, így például a legtöbb hazai vezetékes ivóvízben gond nélkül tarthatjuk példányait. Viselkedését tekintve teljesen békés halak, nem bántják társaikat (persze ne a legapróbb nano halak kerüljenek melléjük). Társas akváriumában a legkülönbözőbb fajokkal is képes együtt élni, legyenek azok eleve szülő, nyugodtabb sügérfélék vagy épp dániók, pontylazacok. A növényzetet nem bántja, de mivel szívesen úszik nyílt vízterületeken, ezért túl sűrűre ne szabjuk a vegetációt. Hagyjunk elég szabad úszóteret halaink számára!

Táplálására a száraz eledel is megfelelnek, mivel szívesen elfogadja őket, de ezt egészítsük ki rendszeresen fagyasztott és élő gerinctelenekkel, mint például szúnyoglárva, artémia, cyclops, tubifex vagy más kisebb férgecskék. Természetes élőhelyén is hasonló lárvákkal, rákocskákkal táplálkozik, mikroragadozó. Tenyésztésük előtt kondicionáljuk őket jó fajta tápokkal, lehetőleg élő eledelokkal.

Az ivarok e fajnál is aránylag jól megkülönböztethetőek a hímek intenzívebb színezete valamint a nőstények teltebb testalkata alapján. A *Bedotia madagascariensis*-nél bevált tenyésztési fogások e fajnál is alkalmazhatóak. Egy kb. 50-60 liter térfogatú akváriumba helyezzük ki 5-8 példányát, mely csapatban a nőstények száma haladja meg a hímekét. Hűvösebb, közepkemény csapvízzel töltjük fel a medencét. Mivel az ívás elhúzódik (napokon keresztül), szükség lesz halaink etetésére és a medence filtrálására, szellőztetésére! Finom levelű növények közé rakják le ikráikat, ezért telepíthetünk az ívató medencébe

jávai mohát, túskehínárt, de mesterséges ikráztató fonatokat is. A már lerakott ikrákat minden nap távolítsuk el, mielőtt a szülők felfalnák őket. A kishalak körülbelül egy hetes fejlődés után kelnek ki, frissen kelt artémiával indíthatóak. A szétnövésre ügyelnünk kell, már csak az ikrák lerakásának sorrendjéből fakadóan is. Felnevelésük alapvetően nem bonyolult feladat.

A természetes populációi sajnos már veszélyeztetettként vannak számon tartva a Vörös Listán. Populációs egyedszáma folyamatosan csökken, ez főleg az erdőirtásnak, a természetes környezet átalakításának és az emberi behatásoknak köszönhető. A madagaszkári kalászhallal ellentétben e faj élőhelyén nem honosodott meg biotópidegen ragadozó, és az emberi felhasználás és befogás is kevésbé számottevő.

Akváriumokban gyakran ugyanezen néven fordul elő a *Bedotia madagascariensis* is, ezzel meglehetősen nagy keveredést okozva, hiszen amúgy is hasonló küllemű a két faj. Mivel hibridizálni is képesek, a korábbi évtizedek pontatlan meghatározása miatt könnyen elképzelhető, hogy az akváriumi állományok már nem tiszta vérvonalúak, hanem hibrid halak is előfordulnak, így szinte lehetetlenné téve pontos beazonosításukat.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -

Eng: Red-Tail Silverside

Egyéb köznevei: Rotschwanz-ährenfisch, Rotgeschwänzter ährenfisch, Bedotiya, Revontulikala, Madagaskar-regnbuefisk

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Kalászhalak](#)

KULCSSZAVAK:

[Bedotia geayi](#), [Vörösfarkú kalászhall](#), [1907](#), [Bedotiidae](#), [Pellegrin](#), [Kalászhalak](#)

JELLEMZŐK:

[közepes méretű 5-10 cm](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [Madagaszkár](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [átlátszó vízi](#), [ragadozó](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesen áramló vízi](#), [békés rajhal](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Afrika](#), [középső szint](#), [Kelet-Afrika](#), [felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- Horn Péter, Zsilinszky Sándor: **Akvarisztika**
- <http://www.iucnredlist.org/details/2719/0>
- <http://www.fishbase.se/summary/Bedotia-geayi.html>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2017-08-08 16:25:57

Legutolsó frissítés: 2018-01-29 16:01:16

Katalógus ID: 7814

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/kalaszhalak/bedotia-geayi.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva