

Belontia signata - Ceyloni tüskésszárnyú hal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Günther, 1861
CSALÁD:	Osphronemidae
MÉRET:	12 cm
C°:	24-28
pH°:	6-7,5
Nk°:	5-15
HELYIGÉNY:	150 liter
VISELKEDÉS:	agresszív
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	középső és alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem fenyegetett



Belontia signata
Ceyloni tüskésszárnyú hal
(Günther, 1861)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Belontia signata – Ceyloni tüskésszárnyúhal elterjedési területe (Map)



Kizárólag Srí Lanka (korábban Ceylon) szigetén él; lassan folyó, illetve álló vizek lakója. Srí Lanka déli vidékein a leggyakoribb.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Meglehetősen zömök és magas hátú, oldalt erősen lapított. A hím hátúszója és fark alatti úszója, továbbá a farkúszójának középső sugarai fonalszerűen meghosszabbodtak, a has úszó első sugara szintén nagyon hosszú. A vörös aranyszínű hal csúcsban végződő hátúszójának hátulso részén egy sötét folt van. A farkúszó megnyúlt sugarainak a vége elágazik.

Testük általában rótvörös-barnás, úszóik valamivel erősebb pirosas színűek (főleg a farkúszó). Könnyen megkülönböztethető rokon fajától, a *Belontia hasselti*-től, mivel annak teste, de kiváltképp farkúszója ezüstös gyöngyházszerű mintázatot visel. Fehér hátúszójának tövén fekete folt látható. A nőstény kisebb, színtelenebb, nyurga úszósugarai alig vannak.

Három színváltozatát is ismerjük. Ezek egyike nem rendelkezik folttal a mellúszó tövében - egyúttal ez a variáns a leginkább vörösés színezetű. A *Belontia signata jonklaasi* alfajként számon tartott variánsnál már megtaláljuk a türkizes foltot a mellúszó tövében, illetve nem túl erős színű sávmintát a hasoldalon. A harmadik változat nem igazán mutat vörösés színeket, viszont farkúszójának megnyúlt sugarai kékes árnyalatúak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Robusztus felépítésű és viszonylag könnyen tartható labirintkopolytúsz faj. Aránylag agresszív viselkedésű, gyakran fajon belül is. Mindenképpen tágas férőhelyre van szükség, ahol bőségesen megférnek egymás mellett az állatok és búvóhelyet is találnak. A kifejlett hímek támadékonyak lehetnek más hímekkel, fiatal állatokkal vagy akár még a be nem ikrásodott nőstényekkel szemben is. Apróbb fajokkal ne társítsuk, mert tápláléknak nézhetik őket. Egy nagyobbfajta akváriumban kerülhetnek melléjük erős felépítésű gurámik, vagy robusztusabb márnafajok, harcsák. Természetes élőhelyén olyan fajokkal fordul elő egy helyen, mint például a bíborfejű díszmárna (*Pethia nigrofasciata*) vagy a *Rasboroides vaterifloris*, *Devario pathirana*. Medencéjét takarni kell, mert ugrálós!

Amellett, hogy gyakran agresszív tulajdonságú, valójában félénk és bújós halak is egyúttal, igazi viselkedésüket csak a faj számára optimális medencében figyelhetjük meg. Mivel főleg állóvizekben és lassú folyásokban honos, ezért ezt az akváriumban is tartsuk szem előtt. Sűrű növényzetet ültessünk, és legyen bőségesen úszónövény is (pl.: *Ceratopteris*). Tompított világítást alkalmazzunk. A vizet színezhetsük is égertoboz, tőzegkivonat segítségével, és falevelekkel is dekorálhatjuk a medence aljzatát. Halaink szívesen töltik idejük a lehullott levelek, vízinövények között, vagy éppen ágak és gyökerek biztonságot nyújtó árnyékában. Semleges – enyhén savas kémhatás mellett, lágyabb, esetleg közép kemény vízben tarthatjuk őket, 25-26 C hosszú távon is megfelelő hőmérséklet ehhez. A rendszeres vízcseréről ne feledkezzünk meg.

Ragadozó halak, táplálásukra leginkább különböző férgek (tubifex, grindál, televényféreg, kisebb földigiliszták), lárvák (pl. szúnyoglárva), rákocskák és kisebb rovarok (mint például a röpképtelen muslicák) felelnek meg, a természetben is jobbra ilyen eredetű táplálék adja étrendje döntő részét. Emellett kisebb halakat is zsákmányol néha. Szoktatás után mohón fogyasztja a száraz eleségeket is, granulátumokkal, pelletekkel is tartható.

Az ivarok megkülönböztetése meglehetősen nehéz, gyakran csak a nőtények ikrateltsége ad támpontot. Gondos szülők, a kishalak védelmezésében és nevelésében mindkét ivar részt vesz! A hím építi meg a habfészket, melyet úszónövényekkel megtámogat. A pázás a habfészkek alatt következik be, a hím körbetekeredik a nőtény körül, és az ikrákat egyből megtermékenyíti, amint a nőtény kiereszti azokat. Tenyésztésükhöz nagy akvárium szükségeltetik, minimum 100 literes. Kizárólag az ikrázó pár legyen az akváriumban, mert íváskor nagy területet foglalnak el a halak és keményen védelmezik azt. A hím az ikrákat gyűjti össze és helyezi el egyesével a habfészket, majd gondozza őket. A nőtény eközben az általuk elfoglalt területet védelmezi a betolakodóktól, így kellőképp tágas és biztonságos környezetet biztosítva kicsinyeinek. Az ikrák gyorsan kikelnek, és pár napon belül a kishalak táplálkoznak. Infuzóriával, papucsállatkával indíthatjuk őket. A szülők még a kikelt kishalakat is őrzik, de amint azok önállóan táplálkoznak, esetleg már az artémiát is elfogadják, eltávolíthatjuk őket. Fiatal korukban dekoratívabbak, színeik idős korukra valamelyest kifakulnak. Viszonylag ritkán találkozni velük a hazai akvaristák medencéiben.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Polyacanthus signatus*, *Macropodus signatus*, *Macropodus signata*.

Eng: Ceylonese combtail.

Egyéb köznevei: Ceylon-Makropode, Combtail, Kampapyrstö, Ceylon-Stachelflosser, Beloncja cejlonska, Thalkossa, Ceylonmakropod, Tseiloni belontia.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Labirintkopoltyús halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1861](#), [Labirintkopoltyús halak](#), [Belontia signata](#), [Belontiidae](#), [Ceyloni tüskésszárnyúhal](#), [akvarisztika](#), [Akváriumi halak](#), [Günther](#)

JELLEMZŐK:

[átlagos élethossza 3-6 év](#), [India](#), [normálméretű akvárium \(100-200 literig\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [lassan mozgó vízi](#), [Sri-Lanka](#), [lassú mozgású](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [sárga vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [átlátszó vízi](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [állóvízi](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [Ázsia](#), [bújós](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [barna vízi](#), [Dél-Ázsia](#), [alsó szint](#), [ragadozó](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [hosszú életű 6 év fölött](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- Horst Linke: **Labyrinthfische**
- <http://www.seriouslyfish.com/species/belontia-signata/>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-05-18 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2018-08-28 14:01:41

Katalógus ID: 4239

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/labirintkopoltyus-halak/belontia-signata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva