

Betta simplex - Krabi harcoshal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Kottelat, 1994
CSALÁD:	Osphronemidae
MÉRET:	6-7 cm
C°:	25-28
pH°:	7-8
Nk°:	9-16
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mikroragadozó
TARTÓZKODIK?	alsó és középső szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	súlyosan veszélyeztetett



Betta simplex

Krabi harcoshal

(Kottelat, 1994)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Betta simplex – Krabi harcoshal elterjedési területe (Distribution map)

Ázsiában, kizárólag Thaiföld Krabi-tartományában található meg. Lelőhelye mindösszesen egy, Krabi várostól nem messze fekvő karsztforrásból eredő patakra és néhány környékbeli tóra korlátozódik. Itt dús növényzetű szakaszokon fordul elő. A víz enyhén lúgos és közép kemény!

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Viszonylag kisebb testű, átlagos felépítésű harcoshalfaj. Alapszíne sárgásbarna, de ennek árnyalatai változhatnak, hátuk néha kicsit sötétebb. Fiatalabb korban három hosszanti sávot fedezhetünk fel testén,

melyből a középső áthúzódik a szemén. A farktövön egy halványabb, szürkés folt található. Idősödve a halakon kevésbé látszanak a csíkok, egyöntetűbb lesz színezetük. Farok alatti úszójuk külső szegélye fekete, majd egy türkizkék sáv következik. A fekete sávot az úszó legkülső szegélyén még egy vékony, fehér csík is díszíti. Ez a fehérrel szegett fekete-kék karima áterjed a kerek formájú farkúszóra is, ahol az úszónak kb. a felső harmadáig terjed, majd elfogy, legfeljebb csak a fehér szegély fut tovább. A hátúszó külső szegélye fehéres-kékes. Jellegzetes még kopolyúfedőjének feltűnő türkizzöld színezete is.

Több rokon harcoshalfajjal is könnyen összetéveszthető. A kifejezett állatok rendkívül hasonlítanak a kékszegélyes harcoshalra (*Betta taeniata*), a legbiztosabb megkülönböztetési mód a fehér úszószegély. Emellett zöld kopolyúfoltjának alakja kicsit eltér a *B. taeniata*-étól, melynél két kicsúcsosodás is látható. Emellett a *B. taeniata*-ról a csíkok teljesen hiányoznak.

A jávai harcoshal (*Betta picta*) szintén számos, megjelenésüket illető tulajdonságban osztozik a krabi harcoshallal. A *Betta picta* esetében a test csíkjai számottevőbbek, a fej alapszínezete elkülönül a testétől (világosabb annál), ilyen különbség a *Betta simplex*-nél nem jelenik meg markánsan. A *Betta picta* kékes úszószegélyét nem övezi szembeötlően elkülönülő fekete sáv is (sokkal inkább egy színátmenetes mintának látszik), s az úszó alapszíne is jóval sötétebb rótbarna. A *B. simplex* farkúszóján a karima kevésbé hangsúlyos. A legfőbb megkülönböztetési lehetőség, hogy a jávai harcoshal kopolyúfedője nem zöldül be, de ez fiatal korban még nem észlelhető, csak idősebb állatokon.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A krabi harcoshal magyar elnevezését élőhelyéről kapta, ugyanis Thaiföldön belül is kizárólag Krabi tartományban, Krabi városához közel fordul elő. Élőhelyét egy karsztforrás valamint az onnan eredő vizek és néhány környező tó jelenti, kb. 10 km² a becsült előfordulási helye. Szűk élőhelye önmagában is komolyan fenyegeti a faj fennmaradását, de számos más tényező ront a helyzeten. Ezek közé tartozik az élőhelyek megszűnése is, egyre több területet alakítanak át mezőgazdasági területekké, és sorra nő a környezet- és vízszennyezés mértéke az ázsiai vizekben. Ha ez nem lenne elég, sok halat kifognak a vizekből különböző célokra: a horgászok például előszeretettel használják csalihalnak. A ritka akvarisztikai célú befogások nem olyan mértékűek, hogy önmagukban fenyegetnék a faj populációt, mindazonáltal a fenti tényezőket figyelembe véve nem csoda, hogy az ICUN Vörös Listája kihalás közeli falként tartja számon. Fontos lenne állományait akváiumi szaporítással megerősíteni.

Természetes élőhelye vízkémiai szempontból is szinte egyedülálló a vadbetták körében. Karsztvízről lévén szó, az oldott kalciumvegyületek mennyisége viszonylag magas, a víz közép kemény és enyhén lúgos! A vadbetták többsége kimondottan lágy, savanyú vizet igényel, e faj számára ez azonban nem felel meg! Kimondottan alkalmas faj azok számára, akik nem tudják rendszeresen biztosítani a lágy vizet, ugyanis hazánkban a vezetékes ivóvíz kémhatását és keménységét tekintve a legtöbb helyen pont ideális a *Betta simplex* számára. Vadonbéli felmérések alapján a pH 7 és 8 között a legoptimálisabb, a víz keménysége pedig a 10-15 nk-s tartományban (persze a keménység esetében néhány fok eltérés még nem okoz problémát). A víz vezetőképessége is jóval nagyobb sok más vad harcoshalfaj élőhelyére jellemzőhöz képest, itt általában 500-550 µS/cm közötti. A víz tiszta, gyönyörű türkiz színű (részben az oldott Ca-vegyületek végett), sárgás színt csak nagy esőzések után ölt, ha a tavak, patakok környékéről sok minden bemosódik a vízbe. 27 °C körüli hőmérséklet teljesen ideális halaink számára.

A 'Picta-csoport' tagja. Viselkedését tekintve békés, inkább visszahúzódó természetű. A vadonban főleg dús vegetációjú helyeken találhatjuk meg, így akváriumának berendezésekor is bátran növényesítsünk. A legajánlatosabbak a *Cryptocoryne*-fajok, de okvetlenül használjunk úszónövényzetet is (*Pistia sp.*, *Riccia sp.*, *Lemna sp.*; stb). Sötétebb aljzat és néhány bujkáló alkalmatosság (pl.: fél kókuszdióhéj) tovább növeli biztonságérzetüket. Az akvárium legyen nyugodt, stresszmentes helyre állítva, ne legyen nagy az áramlás. Néhány falevelet is dobhatunk az akváriumába, azonban e faj ezt külön nem igényli, sőt, ha élethűen szeretnénk tartani őket, akkor nem is előnyös a nagy mennyiségű falevél, és az ő vízszínező és savanyító hatásuk. Gondozásukhoz leginkább egy egyfajos akvárium alkalmas, 60 literben már egy pár vagy hárman minden gond nélkül tartható, de kicsit nagyobb medencében akár a csoportos tartás is lehetséges. A hímek is jellemzően nyugodtak egymással, legfeljebb kisebb erőfitogtatásokra számíthatunk. Ha társítani szeretnénk őket, akkor remek lehetőségként kínálkozik a *Trigonostigma espei*, ugyanis Ázsiában egyazon biotópban megtalálhatóak!

Etetésüket tekintve legjobb élő és fagyasztott táplálékot biztosítani számukra. Szívesen fogyasztanak artémiát, Daphniát, szúnyoglárvákat, grindált. Hízásra hajlamosak, ezért módjával etessünk. Ügyeljünk arra is, ha egyszerre sok vörös szúnyoglárvát vagy tubifexet fogyasztanak, az megterhelheti emésztőrendszerüket. A vadonban főleg rovarokkal, rákocskákkal és vízben élő lárvákkal, nagyobb zooplanktonnal táplálkoznak. Mesterséges körülmények között rászoktathatók száraz eleségekre is, de egészségük megőrzése érdekében mindenképp kapjanak élő tápot (kiváltképp szaporítás előtt).

Tenyésztésük nem bizonyul bonyolultnak. Ha a tartási körülmények megfelelőek és a halak jól tápláltak, valószínűleg a párzásra is sor fog kerülni. Tenyésztéshez érdemes párban kitenni őket, de társaság mellett is szaporodnak. Az akvárium fedője legyen jól záródó, mert egyrészt remek ugrók, másrészt az utódok labirintszervének optimális fejlődéséhez szükséges, hogy az akvárium fölötti levegőtér hőmérséklete megegyezzen a vízával. Sok tenyésztő nem használ aljzatot ezekben az akváriumokban a könnyebb tisztán tartás érdekében. Okvetlenül legyen sűrű a növényzet. Apai szájköltők, az ivadék gondozás zöme a hímre hárul. A párzás után (melynek során a hím körbeöleli a nőtényt, kipréselve ikráit) a már megtermékenyített ikrákat az apaállat a szájába gyűjti, és kb. két héten át kelteti, forgatja őket. A kikelés pár nap alatt lezajlik, majd egészen az önálló táplálkozás megkezdéséig, az elúszásig a hím szájában maradnak a porontyok. A két hét elteltével a kishalak nekilátnak táplálékot keresni: erre a célra a frissen kelt sórák naupliák megfelelnek. Legalább napi kétszeri etetés és rendszeres vízcsere mellett jó tempóban nőnek. Az utódokat nem szükséges a szülők akváriumából elkülöníteni. A forgatási idő alatt óvjuk a hímeket bármiféle stressztől, mert ennek hatására lenyelheti vagy kiköpheti az ikrákat.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -

Eng: Krabi mouth brooder betta

Egyéb köznevei: Krabi-Kampffisch, Mustasaumataistelijsa

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Labirintkopoltyús halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [Betta simplex](#), [Kottelat](#), [Krabi harcoshal](#), [Labirintkopoltyús halak](#), [Osphronemidae](#), [1994](#)

JELLEMZŐK:

[Ázsia](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [Dél-Ázsia](#), [alsó szint](#), [Thaiföld](#), [békés viselkedés](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [sárga vízi](#), [lágynyízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlátszó vízi](#), [Indokína](#), [lassan mozgó vízi](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [bújós](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [lassú mozgású](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [ragadozó](#), [állóvízi](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- Horst Linke: **Labyrinthfische**
- <http://www.seriouslyfish.com/species/betta-simplex/>
- <http://www.iucnredlist.org/details/2777/0>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2018-02-03 09:57:33

Legutolsó frissítés: 2019-09-28 12:01:30

Katalógus ID: 9110

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/labirintkopoltyus-halak/betta-simplex.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva