

Brachygobius sabanus - Közöséges darázsgéb

ELSŐ LEÍRÓJA:	Inger, 1958
CSALÁD:	Gobiidae
MÉRET:	2,5 cm
C°:	24-28
pH°:	6,5-8
Nk°:	8-20
HELYIGÉNY:	50 liter
VISELKEDÉS:	békés, félénk
TÁPLÁLÉK:	mikroragadozó
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	2-3 év
TERM.VÉD.:	adathiányos



Brachygobius sabanus

Közöséges darázsgéb

(Inger, 1958)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Délkelet-ázsiai elterjedésű faj, legfőbb élőhelyei Indonézia és Malajzia területén fekszenek (pl.: Borneó Kalimantan államában), de megtalálható Thaiföldön is. Szingapúrba - vélhetően - betelepítették.

A folyók felsőbb folyásvidékétől kezdve mocsarakon át a torkolatok félsós vizéig sok helyen előfordulhat. Gyakran kerül elő lágy és kissé savas kémhatású, melegebb esőerdei vizekből.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Az egyik leggyakoribb, klasszikus küllemű darázsgébfaj. Rövid, tömzsi testű, erős, robusztus fejű. Kétfelé osztott hátúszóval rendelkezik, míg hasúszói a rokonságához hűen összenőttek, és majdhogynem a fej alá tolódtak. Színezetét a jól ismert kontrasztos sárga-fekete minta jellemzi, amiről nevüket is kapták. Az alapszín citromsárgás, a Doria-darázsgébhez képest egy fokkal halványabb. A fej fekete, mely ráterjed a kopolyúfedőre is. Az első fekete sáv nagyon széles, a kopolyúfedő hátsó táján már áthalad, egészen az elülső hátúszó végéig. A második fekete sáv a második hátúszó középső tájékán veszi kezdetét, és a hátúszó mögött ér véget, míg a harmadik a faroktőben helyezkedik el.

A községes darázsgéb testének színezete tehát teljes egészében megegyezik a Doria-darázsgébével, esetenként halvány fekete foltok előfordulhatnak a sárga területeken. Az úszókon megjelenik a fekete szín, de az akvaristák által is jól használható határozóbélyeget ennek a kiterjedése jelenti.

A községes darázsgéb (*B. sabanus*) esetében az elülső hátúszó utolsó 1-2 sugara ugyanis mindig áttetsző, nem lesz teljesen fekete. A mellúszón a fekete szín kiterjedése kevesebb, mint az úszó fele. Ezzel szemben a Doria-darázsgéb (*B. doriae*) hátúszójának valamennyi sugara fekete színű, legfeljebb egy halvány külső karima fordul elő, valamint a mellúszónak kb. a kétharmada fekete színű – sokkal inkább sötét tónusúak az úszói. A darázsgébek megkülönböztetése egyáltalán nem egyszerű feladat, a kereskedelemben általában nem ügyelnek erre. Sőt, néhány leírt fajról rendkívül kevés információval rendelkezünk, valamint feltételezhetjük még leíratlan fajok létét is.

Egy további hasonló fajról kell még említést tennünk, a borneói darázsgéből (*Brachygobius xanthomelas*), mely egész biztonságosan megkülönböztethető. A borneói darázsgéb karcsúbb, nyúlánkabb felépítésű, alapszínezete sokkal halványabb, több benne az ezüstös szín. A megszokott három fekete sáv jóval vékonyabb, közöttük foltok és sávtörések is megtalálhatóak. A fej sem egyöntetűen fekete, és az úszókon is kevesebb a fekete szín. A legbiztosabb megkülönböztetési pont azonban, hogy az elülső hátúszó első néhány sugarának alapja sosem fekete, a felső területük besötétedhet, illetve a mögöttük lévő néhány sugár, de a hátúszó elülső bázisa ablakszerűen áttetsző.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A darázsgébek csoportjáról sajnálatos módon általános körben elterjedt az a nézet az akvarisztikában, miszerint brakkvízi halak. Ez sok esetben félígazság, vagy akár egyáltalán nem állja meg a helyét. Alig egy-két olyan darázsgéb-fajt ismerünk, melyeket felsős vízben illik gondozni, a fajok többsége ezzel szemben jól tartható édesvízben, sőt, számos képviselőjük kizárólag édesvízi. Akváriumokban a két leggyakoribb fajuk a Doria-darázsgéb (*Brachygobius doriae*) és a községes darázsgéb (*Brachygobius sabanus*) melyek megkülönböztetéséről a külső jegyek leírásánál olvashatunk bőségesen. Neveiket gyakran összekeverik, a kereskedelemben általában nem kerülnek meghatározásra a pontos fajok. Sőt, érdemes tudnunk, hogy a nagyon gyakran használt *Brachygobius xanthozonus* név valójában egy olyan fajhoz tartozik, mely akváriumokba szinte sosem kerül, és alig ismerjük.

A községes darázsgéb a rokonság tán leggyakoribb faja, az akvárium halak is általában ehhez a fajhoz tartoznak. Euríhalin fajok, bár némi megkötéssel: bár sósabb torkolatvidékeken is előfordulnak, jobbra édesvizek lakói, mindenesetre a sókoncentráció megemelkedését viszonylag jól bírják. A természetben előfordulnak olyan feketevízes patakokban is, melyeknek vize lágy és enyhén savas, illetve viszonylag meleg. A vadonból begyűjtött példányok is javarészt édesvízi folyókból származnak, de mindig járunk

utána, hogy akár a tenyésztőnél, akár az importőrnél milyen közegben voltak elszállásolva az állatok, s igyekezzünk igényeiknek megfelelően tartani őket. Azonban szinte minden esetben teljesen megfelelő tartásukra egy átlagos „recept”, melyet az alábbiakban mi is követünk.

A közöséges darázsgébek számára egy 50 literes akvárium bőségesen elegendő, de akár még kisebb medencébe is kerülhetnek (pl.: 40 liter). Leggyakrabban a Doria-darázsgébbel hasonlítják össze, viszont mivel nála kisebb termetű, ezért egy kicsit kisebb medence is megteszi. Érdekes kisebb csoportban beszerezniük őket, 6-8 példányt bátran tartsunk, helyigényük nem nagy. Nem kedvelik a jelentős áramlást, ennek megfelelően válasszuk meg a medence szűrését. Egy a faj számára alkalmas méretű akváriumban a levegővel hajtott szivacs-szűrő is elégséges szolgálatot tesz. A víz közép kemény-kemény értéken megfelel, 10-20 nk között javasolt általános tartáshoz. Ehhez egy semleges körül, 7-7,5-ös pH érték társuljon, hőmérséklet tekintetében 25-26 °C alkalmas. Kéthetenként tartsunk részleges vízcserét: ne felejtjük el, hogy minél kisebb az akvárium, annál törékenyebb a biológiai egyensúlya.

Társításuk hasonló méretű és békés halakkal lehetséges, például a nano akváriumokba ajánlott fajok megfelelő választásnak bizonyulnak. Nagyobb termetű, vehemens, aktív fajok elnyomják a darázsgébekeket, nem jutnak táplálékhoz, és egész nap bujkálni kényszerülnek. Ettől apatikussá válnak, és előbb-utóbb elpusztulnak. Érdekes kisebb testű razbórákkal, törpekalászhallakkal, párduccsíkokkal együtt tartanunk. Akváriumát dúsan növényesítsük, és sok tereptárgyat használjunk. Az aljzat legyen finom homok, amin köveket, sziklákat helyezünk el, akár kisebb kőrakást is építhetünk. Ágak, cserepek, PVC-csövek is kerülhetnek a medencébe, a darázsgébeke igazán otthonosan érzi magukat, ha sok búvóhely áll rendelkezésükre. Hasúszóik rögzülést elősegítő, tapadókorongszerű képletté módosultak, amivel a sziklák között képesek rögzülni.

Száraz eledelre a legritkább esetben szoknak rá, már az is jó eredménynek számít, ha a fagyasztott táplálékot elfogadják. A legjobban élő eledelre tarthatóak, közülük viszont jóformán bármit elfogadnak, ami méretüknek megfelel. Kaphatnak vízibolhát, ciklopszot, artémiát, grindálférget, vágott tubifexet, kisebb szúnyoglárvát. A jó minőségű táplálás az alapja annak, hogy sikeresen tenyészthető példányokat neveljünk.

A sikeres szaporodásnak több feltétele is van. Egyrészt érdemes 8-10 egyedet beszerezniük, a mesterségesen összeválogatott párok nem mutatnak túl nagy hajlandóságot általában az ívásra – sokkal jobb eredményeket érhetünk el, ha hagyjuk, hogy halaink maguk válasszanak párt. A csapatból kiváló párokat már nagyobb sikerrel tudjuk szaporítani. Az ivarok megkülönböztetése nem egyszerű, de kifejlett nőstények kicsit kerekesebb alkatúak, a hímek pedig intenzívebb színűek. Ennél a fajnál sose várjunk narancsos – vöröses elszíneződést, mint az a Doria-darázsgébekeket jellemzi. A darázsgébeke többsége előszeretettel ikrázik barlangokba és csövekbe, ám a közöséges darázsgébnél már nagyon sokan figyelték meg, hogy inkább a félig, vagy teljesen nyílt felületeket választja, például nagyobb, laposabb kövek felszínét.

A hím gondosan letakarítja az ikrázásra kiszemelt helyszínt, előkészíti azt az ikrák fogadására. A lerakott ikrák erősen tapadnak a felszínre, számuk akár a százat is meghaladhatja. Érdekes, hogy erős, opálos fehér színűek – könnyen hihetnénk, hogy megpenészedtek, holott szó sincs erről, ennél a fajnál ez az ikrák jellemző kinézete. A hím őrzi az ikrákat és nagyon alaposan gondoskodik róluk: folyamatosan legyezgeti őket, mozgatja körülöttük a vizet, így az oxigén utánpótlását is ellátja. Amíg a hím az ikrákat őrzi, érdemes az akváriumból a többi halat eltávolítanunk, vagy a hímeket az ikrákkal együtt áthelyezniük

egy másik akváriumba, amit ugyanolyan vízzel töltünk fel, mint ahol az ívás történt. (Az ikrákat lehetőleg víz alatt helyezzük át, például egy kisebb műanyag edény segítségével.)

A kelési idő nagyjából egy hét szokott lenni (hőmérséklet és körülmények függvényében 1-2 nappal eltérhet felfelé és lefelé is). A kikelő kishalak eleinte szabadon úszó formát öltenek, s csak később válnak jellemzően talajlakóvá. Vízközt úszva vadásznak apró élő eleségre, apró planktonikus élőlényeket, eleinte némi papucsállatkát is kapjanak, majd az artémia naupliák kiváló nevelő eleségnek számítanak. Ezt kiegészíthetjük walter- és banánféreggel, rotatóriával is.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -

Eng: Sabanus Bumblebee Goby

Egyéb köznevei: -

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Egyéb édesvízi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1958](#), [Gobiidae](#), [Egyéb édesvízi halak](#), [Inger](#), [Akváriumi halak](#), [Brachygobius sabanus](#), [Közönséges darázsgéb](#)

JELLEMZŐK:

[Indokína](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [állóvízi](#), [Nagy-Szunda-szk](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [barna vízi](#), [bújós](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [Ázsia](#), [kisméretű akvárium \(50 literig\)](#), [Dél-Ázsia](#), [Indonézia](#), [Thaiföld](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [sárga vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [lassú mozgású](#), [rövid életű 1-3 év](#), [alsó szint](#), [sűrű növényzetigényű](#), [Borneó](#), [békés viselkedés](#), [nagyméretű 10-20 cm](#), [fekete vízi](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [ragadozó](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- Frank Schäfer: **Brackwasserfische – Alles über Arten, Pflege, Zucht**
- Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba: **Akvarisztika**
- <https://www.seriouslyfish.com/species/brachygobius-sabanus/>
- <https://www.aquariumglaser.de/en/fish-archives/brachygobius-sabanus-thailand-2/>
- <https://www.iucnredlist.org/species/180841/1668775>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2019-02-04 00:00:10

Legutolsó frissítés: 2019-03-05 08:57:47

Katalógus ID: 9711

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/egyeb-edesvizi-halak/brachygobius-sabanus-kozonseges-darazsgeb.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva