

Carnegiella marthae - Törpe baltahasú lazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Myers, 1927
CSALÁD:	Gasteropelecidae
MÉRET:	4 cm
C°:	22,0-28,0
pH°:	5.5-6.5
Nk°:	4-10
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső szint
ÉLETTARTAM:	2-5 év
TERM.VÉD.:	



Carnegiella marthae
Törpe baltahasú lazac
(Myers, 1927)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Carnegiella marthae – Törpe baltahasú lazac elterjedési területe (Map)



Az Amazonas és Orinoco vidékének csendesen folydogáló, részben növényzettel benőtt vizeiben.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

E hal alakja jellemző a baltahasúlazacokéra; haloldala rendkívül mély, hátoldala egyenes. Az oldalvonal fölött világos krémsárga, alatta ezüstös-szürke. Hasoldalának alsó élét és a szemet alulról sötét vonal szegélyezi. Az egész testet apró sötét pontok fedik. Jól fejlett mellúszói segítségével képes kiugrani a víz fölé.

A nemek megkülönböztetése nem könnyű, csak ívás közeledtével lehetséges, amikor a nősténynél megfigyelhetők az ikrák.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kissé gyenge teherbírású és egy kicsit kényes faj. Kedveli a felszíni növényzetet és a nem túlságosan világos helyet. 22-28 C°-on tartandó. Mivel tipikus rajhalak, legalább 6 példányt szerezzünk be belőlük, de ha rendelkezésünkre áll egy nagyobb akvárium, ne habozzunk sokkal több halat is vásárolni, mert a tömeg megnyugtatólag hat rájuk.

Akváriuma tágas és jól fedett legyen, mert ez a hal kissé ijedős természetű, és ha megijed, képes kiugrani a vízből és a levegőben siklani szárnyyszerű mellúszói segítségével. Társas akváriumban jól megfér a hasonló vízigényű és kisméretű pontylazac-, törpesügér és kisebb harcsafajokkal.

Felső állású szája mutatja, hogy táplálékát leginkább a víz felszínéről gyűjti. Ez állhat kisebb rovarokból - pl. muslica, szúnyog, levéltetvek stb. - kisebb méretű szúnyoglárvákból, de a jó minőségű száraz tápot sem veti meg.

Változatos etetés mellett a szaporodásra is rábírhatjuk, bár tenyésztése nem túl könnyű feladat. Szükséges egy körülbelül 60 literes akvárium, melynek vizét alaposan átszűrtük tőzegen, hogy kb. 5,5-6pH° és sötét színű legyen, és nagyon lágy, 4 Nk°-úra állítottuk be. Fontos, hogy az így előkészített medencét nyugodt, árnyékos helyre telepítsük. A víz felszínére telepítsünk úszónövényeket, mert halaink majd ezeknek a gyökereire fognak leikrázni. Az ide áthelyezett halak hosszas udvarlást követően elszórják nem túl ragadós kisméretű ikráikat. Hajlamosak ikrarablásra, ezért ívás után haladéktalanul ki kell fognunk őket. A lárvák nagyjából 24-30 óra múlva kelnek ki, és ezt követően 4-5 nap múlva úsznak el. Ekkor megkezdhetjük felnevelésüket papucsállatkával és egyéb kisméretű élőelesttel. Néhány nap múlva már elég nagyok lesznek *Artemia* naupliuszainak elfogyasztásához is. Nagyjából 3 hét múlva kezd alakjuk hasonlítani a felnőtt példányokéhoz.

Az utóbbi időben egyre jobban beszerezhető halról van szó, kissé hasonlít a közismert *C. strigatára*, de hozzá képest nem olyan kontrasztos csíkozottságú. Bár nem a legegyszerűbb halakhoz tartozik, igazából nem olyan vészes tartása, egy nyugodtabb társas akvárium is megfelelhet!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Carnegiella marthae marthae*.

Eng: Black-winged hatchetfish, Blackwing hatchetfish, Blackwinged hatchetfish.

Egyéb köznevei: Sortvinget øksefisk, Kaäpiötapparakala, Kääpiötappatakala, Schwarzschwingen-Beilbauchfisch, Pstrazenica mala, Dvärgbilfisk.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Törpe baltahasú lazac](#), [Akváriumi halak](#), [Pontylazacok](#), [akvarisztika](#), [Myers, 1927](#), [Carnegiella marthae](#), [Gasteropelecidae](#)

JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [Dél-amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Orinoco](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Guyanák](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [mindenevő](#), [békés rajhal](#), [igenlágvízi \(0-5°Nk\)](#), [felső szint](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Amerika](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [állóvízi](#), [átlátszó vízi](#), [Amazónia](#), [közepes méretű akvárium 50-100 literig](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-08-19 21:10:08

Katalógus ID: 4019

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/carnegiella-marthae.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva