

Carnegiella strigata - Csíkos baltahasú lazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Günther, 1864
CSALÁD:	Gastero- pelecidae
MÉRET:	4,5 cm
C°:	24,0-28,0
pH°:	5.0-8.0
Nk°:	5,0-19
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső- és felső szint
ÉLETTARTAM:	2-5 év
TERM.VÉD.:	



Carnegiella strigata
Csíkos baltahasú lazac
 (Günther, 1864)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:

TOVÁBBI KÉPEK:



Carnegiella strigata – Csíkos baltahasú lazac elterjedési területe (Map)



Guayana, továbbá az Amazonas középső és alsó folyása, a tengerpartok közepében is. Többnyire kis erdei patakokban (creek) és folyók árterületén található, főleg vízínövények közelében.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Teste nagyon mély, hátoldala egyenes. A színe általában ezüstös rózsaszín, de ez a példány zöldes alapszínű. A szemtől a faroknyélig sötét vonal húzódik, ez alatt számos sötét, töredezett vonal keresztezi a test alsó részét. Egy további sötét vonal felkanyarodik a test elülső részére. A mellúszó igen jól fejlett, míg a halúszó alig észrevehető.

A *Carnegiella strigata vesca* hasonló kinézetű.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Mivel tipikus rajhalak, legalább 6 példányt szerezzünk be belőlük, de ha rendelkezésünkre áll egy nagyobb akvárium, ne habozzunk sokkal több halat is vásárolni, mert a tömeg megnyugtatólag hat rájuk.

Akváriuma tágas és jól fedett legyen, mert ez a hal kissé ijedős természetű, és ha megijed, képes kiugrani a vízből és a levegőben siklani szárnyyszerű mellúszói segítségével. Társas akváriumban jól megfér a hasonló vízigényű és kisméretű pontylazac-, törpesüger és harcsafajokkal. Mutató hal, és noha felszíni állat, gyakran növények között áll a víz közepes zónájában.

Felső állású szája mutatja, hogy táplálékát leginkább a víz felszínéről gyűjti. Ez állhat kisebb rovarokból - pl. muslica, szúnyog, levéltetvek stb. - kisebb méretű szúnyoglárvákból, de a jó minőségű száraz tápot sem veti meg. Néha a talajról is szedeget eleséget, amihez ferde testtartással jut.

Változatos etetés mellett a szaporodásra is rábírhatjuk, bár tenyésztése nem túl könnyű feladat. Szükséges egy körülbelül 60 literes akvárium, melynek vizét alaposan átszűrtük tőzegen, hogy kb. 5,5-6pH° és sötét színű legyen, és nagyon lágy, 4 Nk°-úra állítottuk be. Fontos, hogy az így előkészített medencét nyugodt, árnyékos helyre telepítsük. A víz felszínére telepítsünk úszónövényeket, mert halaink majd ezeknek a gyökereire fognak leikrázni. Az ide áthelyezett halak hosszas udvarlást követően elszórják nem túl ragadós kisméretű ikráikat. Hajlamosak ikrarablásra, ezért ívás után haladéktalanul ki kell fognunk őket. A lárvák nagyjából 24-30 óra múlva kelnek ki, és ezt követően 4-5 nap múlva úsznak el. Ekkor megkezdhetjük felnevelésüket papucsállatkával és egyéb kisméretű élőeleséggel. Néhány nap múlva már elég nagyok lesznek *Artemia* naupliuszainak elfogyasztásához is. Nagyjából 3 hét múlva kezd alakjuk hasonlítani a felnőtt példányokéhoz.

Minden bizonnyal a leggyakrabban ehhez a baltahasú halhoz lehet hozzájutni, tartása nem nehéz, de kezdetben vonakodhat elfogyasztani a száraz eleséget. Mindenképpen rajban gondozzuk!

Több alfaja és variánsa létezik (C. s. vesca; lutinó színváltozat;stb.)!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Carnegiella strigata fasciata*, *Carnegiella strigata marowini*, *Carnegiella strigata strigata*, *Carnegiella strigata surinamensis*, *Carnegiella strigata vesca*, *Carnegiella vesca*, *Gasteropelecus fasciatus*, *Gasteropelecus strigatus*.

Eng: Marbled hatchetfish.

Egyéb köznevei: Poson rach, Yaya gro tjò, Yaya rach, Marmoreret, øksefisk, Stribet, øksefisk, Agosibi siba, Juovatapparakala, Marmoritapparakala, Hachette marbrée, Polomosimbo, Gabel-Bellbauchfisch, Marmorierter, Beilbauchfisch, Kalimasaya, Pstrazenica marmurkowa, Borboleta, Mramornaya karnegiella, Pechito, Pechito jaspeado, Strigata, Marmorerad, Bilbuk.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Gastero- pelecidae](#), [Günther](#), [Akvariumi halak](#), [akvarisztika](#), [Pontylazacok](#), [1864](#), [Carnegiella strigata](#), [Csíkos baltahasú lazac](#)

JELLEMZŐK:

[mindenevő](#), [Orinoco](#), [fállúgos \(7.5-8 pH\)](#), [középső szint](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [felső szint](#), [Guyanák](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [békés rajhal](#), [Amerika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [fekete vízi](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [átlátszó vízi](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Amazónia](#), [közepesen áramló vízi](#), [barna vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [Dél-amerika](#), [közepesen aktív mozgású](#), [sárga vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-08-19 21:11:02

Katalógus ID: 4020

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/carnegiella-strigata-strigata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva