

Chela cachius - Kékszárnyas márnácška

ELSŐ LEÍRÓJA:	Hamilton, 1822
CSALÁD:	Danioninae
MÉRET:	6 cm
C°:	22-26
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	5-10
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	békés, rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	leginkább felső szint
ÉLETTARTAM:	~3 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Chela cachius

Kékszárnyas márnácška
(Hamilton, 1822)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Elő-India (Pakisztán, India, Banglades és Mianmar),
Bengália. A legkülönbélebb álló és áramló vizekben,
rizsföldeken is.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hasvonal szögletes. A hátúszó messze hátul kezdődik, a mellúszók jól fejlettek. A különben elsatnyult hasúszók első sugara nagymértékben meghosszabbodott. Az oldalvonal teljes, a kopolyúfedők felső szélétől meredeken lefelé, majd a test alsó élétől kis távolságban, azzal párhuzamosan halad. A hát profilja egészen a hátúszó kezdetéig tetőszerűen emelkedik. A száj felső állású, bajuszszálak nincsenek. A pikkelyek kicsinyek.

Üvegesen átlátszó, de a tónus egy kissé ezüstösbe játszik, a hát környéke olajszínű, a has fehér. A test két oldalán zöldes-ezüstös színű hosszanti csík húzódik a test közepétől egészen a farkúszó kezdetéig. Az úszók sárgásak, a szivárványhártya fényes aranyszínű. A hím karcsúbb a nősténynél.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Békés és eleven, igénytelen rajhal, amely szívesen tartózkodik ugyan a felszín közelében, medencéjét fedni kell, mert kiugorhat. Testük alakjának megfelelően táplálékukat, amely akváriumban szabadon úszó élő- és a felszínen maradó száraz-eleségből állhat, főként a felszínen fogyasztják. Ajánlatos járulékosan muslicák és egyéb rovarok kiszórásával etetni, a *Chela* és rokonfajok tartásával kapcsolatos régebbi kudarcok valószínűleg a helytelen táplálásra vezethetők vissza. A pehelyeségeket is elfogadják ezenkívül, de csak azzal etetve hosszútávon vesztenek erejükből, gyengék lesznek, így akár el is pusztulhatnak (pl. betegségekben).

A hőmérséklet 23— 25 °C, tenyésztéskor 26 °C lehet. A víz összetételével szemben nem érzékeny. Ha társas akváriumban tartjuk, lehetőleg csak olyan halakkal legyen együtt, amelyek hozzá hasonlóan mozgékonyak, így például más razbórák, dániók, kisebb díszmárnák, csíkhalkak. A kétheti részleges vízcserékre ügyeljünk.

Egy sikeres tenyésztési recept szerint a tenyésztő 70 liter űrtartalmú medencét használt, a fenékre nagyobb kavicsokat és műanyagból készült algautáztatokat tett. A hőmérséklet 25— 26 °C, a keménység 3 NK°, a pH-érték 6,7 volt. A halak alkonyatkor, gyenge mesterséges világításban ívtak. A hím a nőstényt megpróbálta a felszínről lefelé nyomni. Ezután következett az ivartermékek leadása egy rövid ölelés során, amelyből a nőstény heves forgó mozdulattal szabadította ki magát. A gyorsan a fenékre süllyedő, üvegesen átlátszó ikrák száma alkalmanként 20— 30 volt. Az ikrák nem ragadósak és elég kicsinyek, még kisebbek, mint a *Brachydanio rerio* ikrái. A párzások igen sűrűn követték egymást, úgyhogy az ívás 30 perc elteltével többnyire be is fejeződött. A szülők ebben az időben az ikrákkal alig törődtek. A színezet ívás közben nagyon élénk volt; úszóikat — a hasúszókat is — kimerevítve tartották.

Az ivadékok a víz hőmérsékletétől függően 20— 24 óra múlva bújnak ki. Számuk elérheti a több százat is. A halacskák igyekeznek tapadófonállal a vízfelszínhez rögzíteni magukat, ami csak hosszas, hiábavaló próbálkozás után sikerül. Gyakran az oldalfalakon vagy növények levelein lógnak. Eleinte átlátszók, de néhány óra múlva sötétebbekké válnak. A kibúvás után három nappal elkezdene szabadon úszkálni. A papucsállatkákkal való etetés nem bizonyult megfelelőnek, mert ezek a fenékhez, az ivadékok viszont a felszínhez közel tartózkodnak. Ezért porfinomságú száraz-elességgel való etetés javasolható, amelyet szívesen fogyasztanak. Egy jó hét elteltével apró *nauplius*zokat is elfogadnak már. A halandóság az első időben igen nagy, amit nyilvánvalóan a megfelelő táplálék hiánya okoz.

Tudósok bebizonyították, hogy a *Chela*-fajok rendszertanilag meglehetősen közel állnak a nagyobb testű dániókhoz, azaz a *Devario*-khoz. Sajnos ez az érdekes halacská még ritkán látott vendég akváriumainkban.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Cachius atpar*, *Chela anastoma*, *Chela atpar*, *Cyprinus atpar*, *Cyprinus cachius*, *Laubuca atpar*,

Leuciscus anastoma, Leuciscus atpar, Leuciscus cachius, Oxygaster atpar, Paradanio elegans, Perilampus atpar, Perilampus cachius, Perilampus macropodus, Perilampus psilopteromus.

Eng: Neon hatchet fish, Silver hatchet chela.

Egyéb köznevei: Chep chela, Kýlnatka pákistánská, Hatchetfish, Neonkölibarbi, Blauer Flügelbärbling, Barle, Borle.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Pontyfélék](#), [1822](#), [Hamilton](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Chela cachius](#), [Danioninae](#), [Kékszárnyas márnácska](#)

JELLEMZŐK:

[mindenevő](#), [felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [India](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Nyugat-Ázsia](#), [Ázsia](#), [Pakisztán](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [Dél-Ázsia](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [sárga vízi](#), [átlátszó vízi](#), [nagyon aktív mozgású](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [gyors vízáramlású](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [békés rajhal](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepesen aktív mozgású](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2011-08-13 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2014-06-17 13:43:04

Katalógus ID: 4348

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/chela-cachius.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva