

Chindongo socolofi - Pompás malawisügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Johnson, 1974
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	10-11 cm
C°:	25-27
pH°:	7-8
Nk°:	10-20
HELYIGÉNY:	250 liter
VISELKEDÉS:	közepesen társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes
ÉLETTARTAM:	~8 év
TERM.VÉD.:	



Chindongo socolofi
Pompás malawisügér
(Johnson, 1974)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Chindongo socolofi – Pompás malawisügér elterjedési területe (Map)



Kelet-Afrika; Malawi-tó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hosszúkas, karcsú, szélesebb fejű sügér. Kiskorától kezdve egész teste irizálóan kék színű, úszói fehérrel szegettek. Létezik albínó változata is.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Már hazánkban is régóta ismert malawi-tavi sügér faj, amit az újabb színes fajok kezdtek kiszorítani, ezért már valamivel ritkábban látni. Egy nagy akváriumban szép vörös császársügérekkel és citromsárga

yellow-sügérekkel igazán jól mutat. Könnyen tartható, nem igényes faj. A medence mérete végett elkél egy erős szűrő, de ez bőven kielégíti igényeit a fajnak. Erősebb levelű növényekkel (Anubias sp., Cryptocoryne aponogetifolia, stb.) dekorálhatjuk sziklás vidékét. A kövekből remek barlangok alakíthatóak ki számára. Az aljzat apró szemű sóderkavics legyen. Mozgékony faj, szívesen úszik fel s alá, így nem válik unalmassá otthoni medencénk velük. A hímek egymás között agresszívek lehetnek, így hacsak nem nagyon nagy a medence, inkább egyhímes háremben tartsuk. Túlságosan gyámoltalan fajokat ne tegyünk melléjük, mert azokat kicsit kikezdheti, viszont ha vannak búvóhelyek és társhalaik hasonló temperamentumúak, nem lesz gond. Harcsafélék természetesen mehetnek az aljzatra, ha másért nem is, a maradékok eltakarítása végett jó szolgálatot tesznek. Etetésére általános sügértápok, granulátumok széles skálája megfelelő, kedvelik a kisebb, vékony haldarabkákat, szúnyoglárvát. Bélrendszerük nem érzékeny túlságosan, habár Mbuna sügérek.

Szaporá állatok, megfelelő táplálkozás és körülmények mellett rendszeresen lerakják ikráikat, melyeket a nőstény szájába vesz és elúszásukig forgat. Ilyenkor biztosítsunk nekik nyugalmat, érdemes lehet a nőstényt különválasztani akár, vagy egy bizonyos idő után (legalább 2 hét) kiköptethetjük a kicsiket. Az elúszó kissügérek sórak naupliusokkal indíthatóak, tágas medence és rendszeres vízcsere, valamint lehetőleg napi kétszeri etetés mellett gyorsan fejlődnek.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Socolofi, Powder Blue Cichlid, Pindani.

Egyéb köznevei: Pindani, Sinihohtomalawinahven, Mbuna, Socolofűv Cichlid, Pyszczak niebieski, Eisblauer Maulbrüter, Псевдотрофейс Соколова.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Pompás malawisügér](#), [Cichlidae](#), [Afrikai sügérek](#), [Johnson, 1974](#), [Akváriumi halak](#), [Chindongo socolofi](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[átlátszó vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [gyér növényzetigényű](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Afrika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Kelet-Afrika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [alsó szint](#), [mindenevő](#), [békés viselkedés](#), [középső szint](#), [Malawi-tó](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [felső szint](#), [átlagos növényzetigényű](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [nagy méretű 10-20 cm](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-09-23 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2017-03-06 19:05:00

Katalógus ID: 4459

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/chindongo-socolofi.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva