

Cichlasoma bimaculatum - Kétfoltú tarkasüger

ELSŐ LEÍRÓJA:	Linnaeus, 1758
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	14-18 cm
C°:	15,0-24,0
pH°:	6,5-7,0
Nk°:	3,0-10
HELYIGÉNY:	250 liter
VISELKEDÉS:	viszonylag békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső- és alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Cichlasoma bimaculatum

Kétfoltú tarkasüger

(Linnaeus, 1758)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Dél-Amerika északi része, az *Amazonas*, a *Rio Grande* vidéke (az *Orinoco* folyó vízgyűjtője, a Venezuelai *Caroni* folyó; Guyana, az *Essequibo* folyótól a *Sinnamary* folyóig; az *Amazonas* vízgyűjtője a *Branco* folyó felső medencéje), valamint Trinidad, de a *Magdalene* folyóban már nincs. A faj iszapos talajú álló- és folydogáló vizekben tartózkodik, az átlátszóan tiszta vizet kerüli.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Egy kissé magasabb testalkatú, mint a többi faj, s főleg homlokvonala meredek ívben emelkedik hátúszója kezdetéig. Farkúszója lekerekített, mell- és hasúszói igen nagyok. 30 cm hosszúra is megnő a természetben. Barnás vagy kékes alapszínű, sötét csík- és foltrajzolatok díszítik. A hím hátúszója és fark alatti úszója csúcsban végződik.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Viszonylag békés faj. Inkább nyugodt, de más nagyobb bölcsőszájú halakkal tartva sem túl agresszív, ám területvédő. Párban érdemes tartani. Akváriumukba tegyünk sok elsüllyedt faágat, gyökeret és köveket, hogy elegendő rejtekhely álljon rendelkezésére. Néhány növényt is felhasználhatunk díszítésként. Mindenevő. Adjunk neki sokféle élő, fagyasztott és száraz élelmet. A kellően nagy akvárium beszerzése után társítható más sügérekkel, kis helyen nem szerencsés többféle halat összetársítani.

Tenyésztésre meglehetősen egyszerű. Az ikrázás és a megtermékenyítés általában egy kövön történik. Mindkét szülő igen intenzíven törődik utódaival. Még a kikelés után is nagyon hosszú ideig vigyáznak rájuk. Az ivadék első táplálékául *Artemia* frissen kelt naupliuszai szolgálhatnak. Gyorsan nőnek.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Acara gronovii*, *Sparus filamentosus*.

Eng: Black acara, Brown acara, Port acara, Port cichlid, Twospot cichlid.

Egyéb köznevei: Pastanaga, Krobja, Cincela, Blastak (male)/rodnab (female), Agudédé, Common patwa, Cuckoo wrasse, Täpläkirjoahven, Cichlidé a deux taches, Kuckucks-Lippfisch, Streifen-Lippfisch, Streifenbuntbarsch, Zweifleckbuntbarsch, Kilidochilou, Tordo fischietto, Moyouleposiwa, Acará, Acará-cascudo, Tvafläckscichlid, Ördek baligi.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1758](#), [Linnaeus](#), [Amerikai sügérek](#), [Cichlidae](#), [Cichlasoma bimaculatum](#), [Kétfoltú tarkasügér](#)

JELLEMZŐK:

[Kelet-Dél-Amerika](#), [alsó szint](#), [Amazónia](#), [Peru](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [barna vízi](#), [Ecuad.-Kol.](#), [Amerika](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Dél-amerika](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [hidegvízi élőhelyek \(5-20°C\)](#), [sárga vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [Orinoco](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Guyanák](#), [mindenevő](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [középső szint](#), [fekete vízi](#), [lassú mozgású](#), [gyér növényzetigényű](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [Andok orsz.](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [állóvízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-10-03 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-02-01 17:04:51

Katalógus ID: 4182

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/cichlasoma-bimaculatum.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva