

Corydoras adolfoi - Adolfo páncélosharcsája


ELSŐ LEÍRÓJA:	Burgess, 1982
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	5-6 cm
C°:	23-27
pH°:	5-7
Nk°:	0-10
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapatos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	nem fenyegetett



Corydoras adolfoi
Adolfo páncélosharcsája
(Burgess, 1982)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Corydoras adolfoi – Adolf páncélosharcsája elterjedési területe (Map)



Brazília. A Rio Negro-ba ömlő egy mellékfolyóban él, São Gabriel da Cachoeira közelében (Nóuba Ouba patak).

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A kisebb-közepesebb termetű páncélosharcsák közé tartozik, a 9-es leszármazási vonal tagja (punctatus-csoportként is szokták említeni). Jellemzője a viszonylag lekerekített, rövid arccor. Teste ezüstösen fehér (idősödve picit szürkülhet, de alapvetően megtartja fehér színét). Egy fekete szemsávot visel, valamint

hátán egy vékony fekete sáv húzódik végig. Nagyon jellegzetes a sárga tarkófolt, ennél a fajnál élénk narancssárga. A hátúszó átlátszó, és fontos határozó bélyeg, hogy a mellúszótövis nem fogazott.

Több hasonló fajt is ismerünk, melyekkel könnyen összetéveszthetjük.

A *Corydoras duplicareus* zömökebb termetű, a fekete háti sáv az esetében általában vastagabb (de ez nem általános érvényű, biztos határozó pont). A biztos megkülönböztetésre az szolgál, hogy a *C. duplicareus* esetében a mellúszó tüskéje fogazott. (Ez felül- vagy alulnézetből, kontrasztosan világítva tehető láthatóvá).

A *Corydoras burgessi* is egy szintén hasonló küllemű faj, de a könnyebb megkülönböztetést szolgálja, hogy nála nem húzódik végig fekete sáv az egész háton, hanem a hátúszó alatt, egyfajta foltként marad meg. A hátúszó egy része fekete, és a tarkófolton esetében inkább az arany, mintsem a narancsos szín dominál.

A *Corydoras imitator* nevét az Adolfo páncélosharcsája iránt mutatott hasonlóságáról kapta: a fehér alapon fekete minta rendkívül hasonló, de a tarkófolt jóval halványabb és a megnyúlt, hosszabb orr, nyúlankabb test jó meghatározási pont (leszármazási vonalát tekintve ő az előbbiekhöz képest külön csoportba (ln8sc4) tartozik).

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A *Corydoras adolfoi* a legszebb páncélosharcsák közé tartozik, köszönhetően gyönyörű kontrasztos mintájának. Mindenképpen csapatban tartsuk, legalább 6-8 példányt helyezünk el belőlük, hiszen mint minden rokona, ő is csoportos hal. Kifejletten 5-6 cm közötti testnagyságot érhet el, ezért egy kb. 80 literes akvárium már kielégíti helyigényüket.

Az akváriumba finom homoktalajt kell helyezni, mert a durvább aljzat (a nagyobb szemű sóder, gyöngykavics is) erősen koptatja harcsáink bajszszálait, melyek fontos érzékszervek, ez akár végzetes is lehet számukra. Másrészt nem tudják kiélni természetes talajturkáló viselkedésüket. A növényeket nem bántja, csak a legapróbbakat túrja ki. Érdekes az akvárium hátsó régiójában egy sűrűbb növényzetű területet kialakítani, ahová visszavonulhatnak halaink pihenni. Napja döntő részét a talajon kutatva tölti. Ha nagyon finom szemcséjű talajból rendelkezésünkre áll sötét színű, az impozánsan ki tudja emelni halaink színezetét. Legoptimálisabb számára a 25-26 °C körüli hőmérséklet. Amazóniából, esőerdei területről származik, ahol a víz lágy és savanyú. Ezt vegyük figyelembe tartásakor, ne kerüljön kemény vízbe! A kémhatás a természetben gyakran alig 5 pH fölötti, akváriumban 5,5-6,5 körül nagyon ideális számára, de a semleges 7-es pH fölé ne menjünk. A rendszeres vízcserékre ügyeljünk, hogy egészségük megmaradjon.

Békés halak, gyakorlatilag bármilyen más fajjal társíthatóak, melyek nem tesznek bennük kárt. A legjobban azonban egy dél-amerikai biotóp akváriumba illenek, pompás látványt nyújtanak vörös neonhalak, vörösfejú pontylazacok, törpesügérek társaságában. Egy Rio Negro biotóp berendezéséhez is kiváló választás a faj. Társas akváriumba is kerülhet, például kisebb razbórák, dániók, más békés fajok mellé. Feketevízes élőhelyét imitálhatjuk, ha faleveleket szórunk a medencébe, ez a vizet is sötétíti, és hasznos anyagokat (úgy, mint csersavak, huminsavak) ad le a vízbe.

A páncélosharcsák legkiválóbb elesége az élő tubifex, de kaphatnak természetesen mind élő, mind fagyasztott formában különböző szúnyoglárvákat, grindált, televényférget, artémiát. A legtöbb szárazeleséget is elfogadják, például az aljzatra hulló lemezes eleségeket, vagy kimondottan a páncélosharcsák igényeihez készült, gyorsan szemcsésedő tablettás tápokot. Arra azonban ügyeljünk, hogy ne csak más halak maradéka jusson nekik, teljes értékű táplálást kívánnak. Tenyésztés előtt kiváltképp fontos a kondicionálás élő eledelokkal.

A kifejlett nőtények kerekesebbek, nagyobbak a hímeknél. A tenyészakváriumba készítsünk elő számukra ideális, kissé savas és lágú vizet. A szaporításra kiválasztott állatok esetén egy beikrásodott nőtényre 2-3 hím jusson. Az ívást hideg vizes vízcserékkel tudjuk kiváltani, akár naponta 60-70%-ot is cserélhetünk, és néhány fokkal hűvösebb vizet töltünk be. Az oxigénellátás legyen kimondottan jó. Az ikrákat jellemzően növények leveleinek fonákára (vagy finom levelű növények közé), illetve az üvegre rakják. Egy-egy ikrarakás során kb. 20-30 ikrát helyeznek el. Az ívás után a szülőket eltávolíthatjuk, vagy az ikrákat gyűjtjük össze és helyezük keltető akváriumba. Ha utóbbi megoldás mellett döntünk, a vizet a tenyészmedencéből vegyük, hogy a vízminőség teljesen megegyezzen. Gombásodást gátló szert (pl.: xanthakridin, vagy égertobozok kiázott leve) tehetünk a vizükhöz, hogy elkerüljük az ikrák penészedését. A kelési idő 3-4 nap, az elúszás után frissen kelt sőrakkal, banánféreggel indítsunk. A *Corydoras adolfoi* nem a legkönnyebben tenyészthető páncélosharcsa! Az ivadékok meglehetősen érzékenyek a vízminőségre: a szűrésünk legyen jó (de ne legyen túl nagy áramlás). A vízcserék során ne változtassunk nagyon a vízminőségen – inkább sűrűbben, kisebb adagokat cseréljünk. Hasznos lehet, ha van egy kevés talaj a harcsák alatt, egyes tapasztalatok szerint a csupasz üvegen tartva hamarabb betegednek meg, kevésbé fejlődnek jól.

Bár nem fenyegetett még a faj, természetes állományai fogyatkozóban vannak a Vörös Lista felmérései alapján.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Adolfo's catfish, Adolfo's cory.

Egyéb köznevei: Adolfo's Panzerwels, Orangepandet Pansermalle, Rusomonninen.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Harcsafélék](#), [Callichthyidae](#), [1982](#), [Adolf páncélosharcsája](#), [Burgess](#), [Akváriumi halak](#), [Corydoras adolfoi](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [fekete vízi](#), [alsó szint](#), [lassan mozgó vízi](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [lassú mozgású](#), [Amazónia](#), [barna vízi](#), [Dél-amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Amerika](#), [békés rajhal](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish**

http://www.scotcat.com/callichthyidae/c_adolfoi.htm

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?species_id=1 <https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/488>

<https://www.iucnredlist.org/species/167665/6364792> <https://www.seriouslyfish.com/species/corydoras-adolfoi/>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-06-05 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2020-04-22 14:10:37

Katalógus ID: 4102

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-adolfoi.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva