

## Corydoras brevirostris - Fejkötős páncélosharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Fraser-Brunner, 1947
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	6 cm
C°:	21-26
pH°:	6-7,5
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	békés, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



**Corydoras brevirostris**  
*Fejkötős páncélosharcsa*  
(Fraser-Brunner, 1947)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Dél-Amerika, Venezuela és Suriname. Az Orinoco vízrendszerében fordul elő.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

9-es leszármazási vonalbeli, tömzsi alkatú páncélosharcsa. E csoportot általánosan jellemzi a lekerekített arccor, e fajra ez különösen igaz, latin neve is rövid orrára utal. Tetszetős megjelenésű, ezüstös alapszínű, mely hátán barnásba fordul. Oldalát sötétszürke – fekete foltok halmaza díszíti, ezek viszonylag szabálytalanul, de nagyjából egyenletesen vannak elosztva rajta. Szemén egy vastag, markáns fekete szemsáv fut keresztül. Vállán fekete vállfolt díszel, melynek színe némiképp ráterjed a hátúszóra is. Tarkóján aranyló foltot visel, s további fontos bélyeg, hogy farkúszója csíkozott (foltok sorából felépülve). Kopoltyúfedője gyakran aranyló.

Nagyon könnyű összetéveszteni a *Corydoras melanistiusszal*, a legbiztosabb bélyeg, hogy a *C. melanistiusszal*

farkúszója teljesen áttetsző, rajta nem találunk foltmintát. Emellett arany tarkófoltja kevésbé markáns, pöttyei kisebbek. A *Corydoras leucomelast* nagyobb foltjai – vonalai, intenzívebben fekete hátúszója és alig meglévő tarkófoltja alapján különböztethetjük meg. További hasonló faj még a *C. surinamensis*, de szintelen hátúszója, oldalán hosszanti csíkokká összeálló pöttyei és erős, vastag csíkozottsága a farkúszón egyből árulkodik kilétéről. Az arany tarkófolt nála a legintenzívebb a fenti fajok közül.

Hozzá hasonló fajok még a *Corydoras agassizii* és *C. ambiacus*, ám ők hosszabb arcukról és a markáns szemsáv hiányáról könnyedén felismerhetőek. Hasonlóképpen igaz ez a *Corydoras delphaxra* is. A *Corydoras ephippifer* orra is jelentősen megnyúlt, farkúszója szintelen, pöttyei kisebbek és kevesebben is vannak.

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A *Corydoras brevirostris* neve kevésbé számít közismertnek a hazai akvarisztikában, szemben például a hozzá nagyon hasonló *Corydoras melanisti*us nevével. A gyakorlatban azonban sokkal többször jelennek meg valódi *C. brevirostris*ok, mint igazi *C. melanisti*usok, utóbbival kevesebbszer találkozni kettejük közül az akváriumokban. Tartásuk egyébként viszont szinte teljesen megegyezik.

A fejkötős páncélosharcsák békés természetűek, a náluk jóval kisebb halakat sem bántják. Kiválóan alkalmasak egy szép Orinoco-biotóp akváriumba különböző pontylazacok, sügérfélék társaságában. Érdeemes legalább 70 liter körüli űrtartalmú akváriumban elhelyezni őket. Csoportos életmódot folytató állatok, ami azt jelenti, hogy 6-8 példányukat tartsuk együtt.

A medence aljára finom homoktalajt töltsünk, melyben kedvükre turkálhatnak harcsáink. Az éles szemcsék, durva kövek felsértik érzékeny bajuszszálaikat, ami akár a pusztulásukig is vezethet. Pár tő növényvel, gyökerekkel dekorálhatunk. Legyen némi árnyas terület, ahová visszahúzódhatnak, és szabad talajfelület is, ahol pedig turkálhatnak. Vegyes akváriumokban is megállják a helyüket, általában nincs velük probléma csapvízben sem, de ha egy keveset lágyítunk és savanyítunk vizükön, meghálálják. Bátran használjunk lehullott faleveleket, égartobozokat is a víz kezelésére és a berendezés gazdagítására. Nem szeretik a túl meleg vizet, 23-25 °C ideális értéknek számít. A rendszeres, részleges vízcseréket ne hanyagoljuk el.

A legtöbb díszhaltápot megeszik: kaphatnak lehulló lemezes eledeleket (egyébként más halak maradékát is eltakarítják), harcsatablettákat. Nagyon szívesen fogyasztanak élő férgecskéket, így például tubifexet, blakcwormot. A sikeres tenyésztés záloga, hogy előtte halainkat jó kondícióba hozzuk élő eleségek felhasználásával.

Szaporításuk a rokon fajokéhoz hasonlóan történik. A nőstények felismerhetőek jó fél centivel hosszabb és teltebb termetükről. Egy nőstényre két hímét számítva, kis csoportban tegyük ki őket a tenyészmedencébe (2 nőstény és 4-5 hím jó arány lehet). Az akváriumba helyezzünk el vízínövényeket (legyen köztük finomabb levelű, pl.: jávai moha is), és töltsük fel 25 °C-os, aránylag lágy vízzel. Ha halainkat jól tartottuk, akkor egy kis hideg vizes vízcsere hatására gyakran bekövetkezik az ikrázás, bár nem mindig könnyű rávenni őket a szaporodásra. Egy ilyen vízcsere során legalább a térfogat felét, vagy kicsivel többet cseréljünk minimum 5 °C-al hűvösebb vízre, és a cserevíz célszerűen legyen meglehetősen lágy, például esővíz. Ha bekövetkezett az ikrázás, távolítsuk el a szülőket, mert megehetik utódaikat. Az

ikr?k b? 3 nap eltelt?vel kelnek ki, ?s m?g j? h?rom nap kell a szikzacsk? felsz?v?d?s?hoz, mire ?n?ll? t?pl?l?kkeres?sbe kezdenek a kis harcs?k. Az ikr?k fejl?d?s? sor?n az oxig?nell?t?s legyen j?, n?mi pen?szed?s g?tl? szert is csepegtethet?nk a v?zbe. Ind?t?oles?s gyan?nt frissen kelt art?mi?t, mikro f?rget, walterf?rget használjunk.

## EGY?B ELNEVEZ?SEK:

**syn:** *Corydoras melanistius brevirostris*, *Corydoras wotroi*

**Eng:** Spotted cory,

**Egy?b k?znevei:** Halestribet Kravepansermalle, Raitapunamonninen

## KATEG?RI?K:

[Akv?riumi halak](#), [Harcsaf?l?k](#)

## KULCSSZAVAK:

[Akv?riumi halak](#), [Harcsaf?l?k](#), [Callichthyidae](#), [Fraser-Brunner](#), [Corydoras brevirostris](#), [Fejk?t?s p?nc?losharcsa](#), [1947](#)

## JELLEMZ?K:

[Amerika](#), [k?zepes m?ret? 5-10 cm](#), [k?zepesen ?raml? v?zi](#), [lassan mozg? v?zi](#), [k?zepesen akt?v mozg?s?](#), [mindenev?](#), [?tlagos n?v?nyzetig?ny?](#), [lass? mozg?s?](#), [barna v?zi](#), [D?l-amerika](#), [s?rga v?zi](#), [Orinoco](#), [Guyan?k](#), [b?k?s rajhal](#), [hossz? élet? 6 ?v f?l?tt](#), [f?lsavas \(6-6.5 pH\)](#), [h?ig?nyes \(25-30 ?C\)](#), [als? szint](#), [igenl?gyv?zi \(0-5?Nk\)](#), [l?gyv?zi \(5-10 Nk?\)](#), [k?zepes h?ig?ny? \(20-25?C\)](#), [k?zepesen kem?nyv?zi \(10-15?Nk\)](#), [k?zepesm?ret? akv?rium \(50-100 literig\)](#).

## FELHASZN?LT IRODALOM, FORR?SOK:

Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish** <https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/478> <https://www.seriouslyfish.com/species/corydoras-brevirostris/> [https://www.planetcatfish.com/common/species.php?species\\_id=310](https://www.planetcatfish.com/common/species.php?species_id=310) [https://www.scotcat.com/callichthyidae/c\\_brevirostris.htm](https://www.scotcat.com/callichthyidae/c_brevirostris.htm)

**?rta:** Liziczai M?rk

**Katal?gusba került:** 2020-05-04 11:36:57

**Legutols? friss?t?s:** 2020-05-04 13:05:56

**Katal?gus ID:** 10276

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-brevirostris.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva