

Corydoras davidsandsi - Feketehátú páncélosharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Black, 1987
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	6 cm
C°:	21-25
pH°:	6-7
Nk°:	0-12
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapatos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Corydoras davidsandsi
Feketehátú páncélosharcsa
(Black, 1987)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Brazíliában él, a Rio Unini endemikus páncélosharcsája. A Rio Unini a Rio Negro - vízrendszeréhez tartozik, középső szakaszának mellékfolyója.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Közepes, de nem túl nagy termetű páncélosharcsa, lekerekített fejprofillal. Alapszíne szürkésfehér, melyben némi sárgás árnyalat halványan megjelenhet. Szemén fejének mindkét oldalán vastag, fekete szemsáv húzódik keresztül, mintegy álarcot formázva neki. Hátát pedig egy szintén vastag fekete sáv díszíti. E sáv a hátúszó kezdetén indul (kismértékben ráterjedve a hátúszóra is), majd ferde vonalban végigfut a háton, egészen le a farkúszó alsó lebenyének bázisáig. Fontos faji bélyeg, hogy a fekete sáv

ráterjed a farkúszóra. Testének oldalán mintát nem találunk. A jól tartott halakon halvány narancsos árnyalatú tarkófolt megjelenhet.

Több rokon fajra is hasonlít, kiemelendő közülük a *Corydoras metae* és a *Corydoras melini*. A *Corydoras metae*-től az alapján tudjuk megkülönböztetni, hogy nála valamivel nyúlánkabb, a fekete csík vastagabb kiterjedésű és ferdebb lefutású. A *C. metae* esetében a farkúszó teljesen szintelen! A *C. melini* csíkja e fajhoz hasonlóan szintén ferde, azonban nem ér fel a hátig, ott egy világos területet találunk (emellett oldalán szürkés foltok, minták előfordulhatnak). A még leíratlan C85-től ugyanúgy különböztetjük meg, mint a *C. melinitől* (hiszen ezek ketten szinte megszólalásig hasonlítanak); míg a C16 számos bélyegben különbözik: farkúszóján csíkokat látunk, orra hosszabb és megnyúltabb (az 1-es leszármazási vonal tagja, míg a *C. davidsandsi* a 9-esbe tartozik), és oldalán foltocskák előfordulhatnak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A feketehátú páncélosharcsa az utóbbi években kezd egyre inkább fel-felbukkanni az akvarisztikában, az újabb páncélosharcsák körébe tartozik. Élőhelye amolyan barnavizes lelőhely, a Rio Negro mellékfolyója, ezért akváriumban is a legmegfelelőbb számára a kissé savas, lágy víz. Igyekezzünk a keménységet 12-15 nk érték alatt tartani – ha csapvizünk keményebb, keverjük azt esővízzel, ozmóvízzel. A kémhatás tekintetében 6-6,5 pH ideális halainknak. Nagyon jó eredményeket érhetünk el, ha vizüket kezeljük tőzeg levéllel, vagy esetleg dobunk bele égartobozokat, Tebang-levelet (vagy más, idehaza is fellelhető faleveleket). Ezek elszínezik a vizet, ami élethűvé varázsolja azt, emellett cser- és huminsav tartalmukkal a kémhatás beállításához is hozzájárulnak.

Medencéjét ne fűtsük túl! A 23-24 °C teljesen optimális a faj tartására. Heti-kétheti rendszerességgel a víz 20-25%-át cseréljük. A medence aljzata finom homoktalaj legyen, hiszen a páncélosharcsák sokat turkálnak benne, s az éles, durva kövek, kavicsok lekoptatják és felsebzik érzékeny bajuszszálaikat. Egyéb berendezések kapcsán nincs különösebb igényük: kövek, gyökerek, vízínövények kerülhetnek akváriumukba. Erős vízmozgást nem igényel. Tartása alapvetően nem bonyolult.

Elfogadja a száraz eledeleket, lemezes díszhaltápokokat és harcsáknak szánt táptablettákat is. Igazán jó kondíciót azonban úgy érhetünk el, ha bőségesen tápláljuk őket természetesebb eleségekkel is: így az élő tubifex, grindál, artémia, blackworm és vörös szúnyoglárva mind kiváló eleség, ezek egy részét fagyasztva is adhatjuk akár. Ideális társhalai pontylazacok, békésebb sügerek, más harcsafélék. Teljesen békés, az apró termetű halakat sem bántja. Mivel csapatos életmódot folytat, rajhal, ezért legalább 6-8 példányt érdemes belőle beszerezni. Kiválóan alkalmas például egy neonhalas akváriumba, de ideális és természetű társhalak mellé még például az izzófényű pontylazacok, rózsaszalacok, fekete tetrák, sávozott törpeszájú halak.

Szaporításuk nem sokban különbözik más páncélosharcsákétól. Érdemes csoportosan ívatni a jó kondícióban lévő, előtte élő eleségekkel bőségesen táplált állatokat. Készítsünk elő számukra egy akváriumot, melyet szivacs-szűrővel szűrünk, vékony homokréteget terítettünk az aljára, és elhelyeztünk benne különböző vízínövényeket. A víz hőmérséklet legyen 25 °C, a pH kb. 6, és lehetőleg minél lágyabb a víz (az esővíz remekül beválik erre a célra). A vízminőség megváltozása (egyidejűleg hűvösebb víz cseréje) indukálhatja az ívást. A gyakorlat azt mutatja, hogy a rokon *Corydoras metae*hoz képest könnyebb szaporodásra bírni. Egyszerre csak kevés ikrát rak, 10-12 db teljesen jó eredménynek számít.

Viszont egy beindult ívási periódus alatt nagyjából hetente – másfél hetente sor kerül egy-egy íváásra. Az ikrákat leggyakrabban finom levelű növények közé rakják. Az ikrákat vegyük el a szülőktől, különben megeszik azokat. Mivel jelentős különbség lesz a kishalak kora között, a szétnövésre ügyelni kell. A kishalak táplálása az ikra lerakásától számítva kb. egy hét múlva kezdhető meg, erre az artémia naupliák megfelelőek. A peteburkok ne kerüljenek az akváriumukba, a porontyok ugyanis nagyon érzékenyek erre, könnyen elzáródik tőle a bélcsatornájuk. Az első egy hónap során a vízminőségre nagyon kényesek: tartsunk néhány naponta vízcserét, de alkalmanként csak keveset cseréljünk egyszerre, hogy ne változzanak hirtelen az értékek. Egy vékony homoktalaj segíthet, hogy ne fertőződjének meg a halak a hasfelületükön. 5-6 hét leteltével már minden komolyabb nehézség nélkül felnevelhetünk egy szép csapatot belőlük.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -

Eng: Sand's cory

Egyéb köznevei: Schwarzücken Panzerwels

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [Corydoras davidsandsi](#), [Harcsafélék](#), [Feketehátú páncélosharcsa](#), [Callichthyidae](#), [Black](#), [1987](#)

JELLEMZŐK:

[Dél-amerika](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Amerika](#), [sárga vízi](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [békés rajhal](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [átlagos növényzetigényű](#), [lassú mozgású](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Amazónia](#), [alsó szint](#), [barna vízi](#), [igenlágyvízi \(0-5°Nk\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Akvárium Magazin XVII. évf. 96. szám: Dávid Zsolt: [Corydoras davidsandsi](#) Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: [Identifying Corydoradinae Catfish](#) <https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/471>
https://www.planetcatfish.com/common/species.php?task=&species_id=291
https://www.scotcat.com/callichthyidae/c_davidsandsi.htm
<https://www.seriouslyfish.com/species/corydoras-davidsandsi/>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2020-04-28 12:50:44

Legutolsó frissítés: 2020-04-28 13:23:12

Katalógus ID: 10216

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-davidsandsi.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva