

Corydoras delphax - Inirida - páncélosharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Nijssen & Isbrücker, 1983
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	6,5-7 cm
C°:	22-26
pH°:	6-7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	békés, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Corydoras delphax
Inirida - páncélosharcsa
(Nijssen & Isbrücker, 1983)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Dél-Amerikában, Kolumbiában terjedt el, a Rio Inirida folyórendszerének endemikus faja, de az Orinoco kolumbiai szakaszán is megtalálták.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Az In8sc4 leszármazási vonal tagja, aránylag robusztus, természetes felépítésű páncélosharcsa közepesen megnyúlt arccal. Alapszíne kissé variábilis: a piszkosfehértől a krémszínen át a sárgásbarna árnyalatig terjed. Ezen barnás-szürkés foltmintát látunk: közepes méretű foltokkal, aránylag sűrűn megszórva mutatkozik teste a hátúszó vonalától hátra. Fontos bélyeg, hogy farkúszója pontok sorából álló csíkokat visel. A hal egy halványsárgás tarkófolttal és egy viszonylag nagy kiterjedésű fekete vállfolttal rendelkezik. Homloka, a szem fölött sötétszürke-fekete, olybá tűnik, mintha szemsáv lenne, de a szemnél

lejjebb nem húzódik, így valódi szemkötő nem alakul ki. A hátúszó első pár sugara fekete, és nagyon jellemző (főleg hímeknél), hogy idősebb korára az elülső hátúszósugár megnyúlik.

Több hasonló fajt is ismerünk, például a nyerges páncélosharcsát (*Corydoras ephippifer*). E faj jól megkülönböztethető az alapján, hogy farkúszója teljesen áttetsző, rajta foltok és csíkok nem jelennek meg. Mintája hasonló, de induló szemsávja és tarkófoltja valamivel intenzívebb színű. Hasonló fajok még a *Corydoras agassizii* és *C. ambiacus*, de hozzájuk képest kisebb foltokkal rendelkeznek, kevésbé kontrasztos színű. A *Corydoras leucomelastól* annak vastag szemsávja egyértelműen megkülönbözteti, akárcsak a *C. melanistiustól*, *C. brevirostristól*. Emellett e fajok lekerekített arcra is jó megkülönböztetési lehetőséget ad, hiszen utóbbi 3 faj az In9 leszármazási vonal tagja.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Az Inirida – páncélosharcsa alkalomszerűen fordul elő a hazai akvarisztikában. Fontos tudnunk róla, hogy a kereskedelemben gyakran tévesztik össze hasonló, rokon fajokkal, így mindig bizonyosodjunk meg róla, milyen halat vásárolunk. Előfordulhat, hogy más fajnéven árulnak *Corydoras delphaxot*, vagy ezen a néven szerepel egy másik faj az üzletek kínálatában. Nevét kolumbiai élőhelyéről, az Inirida folyóról kapta, melyben endemikus.

24-25 °C-os vízben, semleges vagy csak enyhén savas kémhatáson jól tartható halak. Klasszikus esőerdei faj, ezért érdemes vízen némileg lágyítani, igyekezzünk 15 nk alatt tartani a vízkeménységet. Ez kiváltképp fontos, ha vadonfogott állatokkal dolgozunk. Pár égtoboz vagy egy kevés Tebang-levél halvány teaszínűre festi a vizet a kioldódó csersavakkal, melyet e halak élveznek, emellett egy picit savanyítja is vizüket. A kéthetenkénti részleges vízcserét ne feledjük.

A száraz eleségeket általában elfogadják, kaphatnak harcsáknak szánt tablettákat, lemezes díszhaleleségeket is – a többi hal által meghagyott maradékot is eltakarítják. Ettől függetlenül teljes értékű táplálékra van természetesen szükségük. Nagy kedvencük az élő tubifex, ha módunkban áll, adjuk nekik rendszeresen és bőségesen – egyszerre nagy mennyiséget is képesek belőle elfogyasztani. Szüntelenül kutatnak táplálék után és nagyon ügyesen húzzák ki a kis férgecskéket a talajból is. Ezen kívül megkínálhatjuk őket artémiával, vörös szúnyoglárvával, blackwormmal, földigilisztával, televényféreggel is.

Akváriumuk berendezése során ügyeljünk arra, hogy finom homoktalaj kerüljön medencéjükbe. Érzékenyek arra, ha éles szemcséket tartalmaz az aljzat, mert ez felsebzi és elkoptatja bajuszszálaikat, ami a páncélosharcsák többségére nézve könnyen végzetessé válhat. Néhány gyökérrel, kővel és pár tő Echinodorusszal otthonosan rendezhetjük be akváriumukat. Úszónövényzetet is használhatunk tompítandó a világítást.

Csapatos halak, legalább 6-8 állatot helyezünk el akváriumunkban, mely ne legyen kisebb 80 liternél, de a legjobban 100 liter fölött érzik magukat. Békés állatok, könnyedén társíthatóak más dél-amerikai pontylazacokkal, törpesügérekkel, de kerülhetnek melléjük afrikai, ázsiai halak is, melyek hasonló körülményeket kívánnak (pl.: kongólazac, razbórák, dániók, stb.). Mivel elég erős, robusztus termetűek, nagyobbacska sügérekkel is jól együtt tarthatóak. Az ivarok megkülönböztetése általában nem túl nehéz, a nőstények teltebbek és nagyobbak a hímeknél, melyek idővel viszont meghosszabbodott hátúszót

növesztenek.

Szaporítása hasonlóan történik, mint ahogy azt más páncélosharcsáknál ismerjük. Az ívatásra kiválasztott halakat vegyük külön egy szaporító medencébe, melybe 25 °C-os, enyhén savas (6,3-6,6 pH), lágy vizet (nk 10 alatti) töltünk. A medencébe helyezzünk el jávai mohát vagy más vízinövényt is. Használjunk olyan ivararányt, melyben a hímek száma kb. kétszerese a nőstényekének. Elősegíthetjük az ikrarakást, ha hideg vizes vízcseréket alkalmazunk: a víz felét-kétharmadát cseréljük 5-8 °C-al hidegebbre, és ezt akár naponta-kétnaponta ismétéljük egy ideig. A cserevíz célszerűen legyen lágy, akár 3-5 nk. Erre az esővíz vagy a reverz ozmóvíz megfelelő. Az ikrákat a nőstény az akvárium üvegfalára vagy a növények közé ragasztja, de az ívás bekövetkezte után érdemes a szülőket különválasztani, mert megehetik az ikrákat. Az ikrák keltetéséhez legyen intenzív a vízmozgatás, tegyünk pár égertobozt vagy néhány csepp xanthakridint az akvárium vizébe, hogy elébe menjünk a penészedésnek. A kelés kb. 3-4 napot vesz igénybe, és további hasonló időtartam szükséges a kishalak elúszásához, így összességében véve kb. egy hét leteltével kezdhetünk etetni. Indítóeleségnek (peteburoktól mentes) frissen kelt artémiát, illetve banán- és walterférget használjunk. A hibátlan vízminőségre ügyeljünk, mert eleinte érzékenyek lehetnek rá a kishalak. Később áttérhetünk a vágott tubifexel történő táplálásra.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -

Eng: False Blochi Corydoras

Egyéb köznevei: Inirida - Panzerwels, Inirida - pansermalle

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Harcsafélék](#), [Nijssen & Isbrücker](#), [Callichthyidae](#), [Corydoras delphax](#), [Inirida - páncélosharcsa](#), [1983](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [átlagos növényzetigényű](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [lassú mozgású](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [barna vízi](#), [Dél-amerika](#), [alsó szint](#), [sárga vízi](#), [igenlágynyvízi \(0-5°Nk\)](#), [Amerika](#), [békés rajhal](#), [lágynyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Andok orsz.](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Ecuad.-Kol.](#)

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish** <https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/472>

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?species_id=474

http://www.scotcat.com/callichthyidae/c_delphax.htm <https://www.seriouslyfish.com/species/corydoras-delphax/>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2020-05-04 22:53:30

Legutolsó frissítés: 2020-05-05 09:52:11

Katalógus ID: 10282

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-delphax.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva