

Corydoras granti - Grant - páncélosharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Tencatt, Lima & Britto, 2019
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	5-5,5 cm
C°:	22-27
pH°:	6-7
Nk°:	2-14
HELYIGÉNY:	75 liter
VISELKEDÉS:	békés, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Corydoras granti
Grant - páncélosharcsa
 (Tencatt, Lima & Britto, 2019)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Aránylag széles elterjedési területtel rendelkezik Dél-Amerikában, előfordul Brazíliában, Peruban, Ecuadorban és Kolumbiában is. Peruban legfőbb állományai a Rio Yavariban és a Matamata-tóban élnek, Ecuadorban például a Rio Napoban elterjedt. Ezen kívül többek között a Rio Purus, Rio Caquetá, Rio Tacana is az elterjedési területéhez tartozik, mint több más folyás az Amazonas vízrendszerében.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Kisebb termetű, klasszikus, tömzsi megjelenésű páncélosharcsa. Feje aránylag lekerekített. Kifejletten

5-5,5 cm-nél ritkán nő nagyobbra. Úszói teljesen áttetszőek. Teste fiatalon egészen ezüstfehér, később némileg szürkül. Háta barnás színű. Jellegzetes faji sajátossága a fekete sáv, mely mintegy boltív, halad a hal szájától a hátán végigívelve egészen a farkúszó kezdetéig. A farkúszóra csak elenyésző mértékben terjed rá.

Hozzá nagyon hasonló faj a *Corydoras arcuatus*, olyannyira, hogy évtizedeken át összekeverték őket. Az igazi *C. arcuatusok* azonban majd' kétszer ekkorára nőnek meg (egy kifejlett nőstény akár 10 cm-es is lehet), erős csontozatú, páncéllemezei jól látszódnak. Mintázata nagyon hasonló, de gyakori, hogy a hátúszó felső csücske vagy elülső néhány sugara feketés színű. A legbiztosabb megkülönböztető pont azonban az, hogy a *Corydoras arcuatus* sokkal meredekebb homlokú, előrébb ugró orrú faj. A *Corydoras granti* a 9-es leszármazási vonalba tartozik (ln9), míg a valódi *Corydoras arcuatus* a 8-as vonal 4-es alkládjába (ln8sc4).

Hasonlít még rá a *Corydoras urucu*, de nála az oldalon is találunk néhány kisebb fekete mintát, és nem olyan egybefüggő a háti sáv, kisebb törések, hullámvonalak akadnak benne.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A *Corydoras granti* egy nagyon békés, kedves kis páncélosharcsa-faj, mely remekül társítható más halakkal. Leginkább kisebb-közepesebb termetű pontylazacok, törpesügérek, esetleg dániók és razbórák mellé való (persze utóbbiak esetében nem tudunk biotóp akváriumot készíteni). Tartása nem különösebben bonyolult, kezdőknek is ajánlható. Aktív, mozgékony páncélosharcsák, kellemes látványt nyújt egy folyamatosan kutató-mozgolódó csapatuk, melyek naphosszat táplálék után kutatnak.

Kifejletten az 5 cm-t ritkán haladja meg méretük, ezért tartásukra egy kb. 75-80 literes akvárium már teljesen megfelelő. A medence aljára töltünk finom homokot, mert érzékeny bajuszszálaik nagyon hamar lekopnak, ha nagyobb szemcséjű, esetleg éles szélű kavicsokból álló talajon tartjuk őket. A gyöngykavics sem alkalmas a páncélosharcsák hosszú távú gondozásához. A hőmérsékletre nem kényesek, 23 és 27 °C közötti tartományban hosszú távon is bármilyen érték megfelel számukra. Vizüket érdemes kicsit lágyítani. Kémhatás tekintetében az enyhén savas – semleges közeli tartományt lőjük be. Ne feledkezzünk meg a rendszeres részleges vízcserekről és a megfelelő szűrésről. Néha felmerülő közhiedelemmel ellentétben nincs szükségük állandó, intenzív vízmozgásra, de ha esetleg az akvárium egyik sarkában nagyobb áramlást hozunk létre, megfigyelhetjük a harcsákat, amint néha ott kergetőznek.

Csapatos halak, 6-8 példányt legalább szükséges belőlük együtt elhelyezni. Bátran ültessünk dúsabb növényzetet is, ugyanis szívesen pihennek meg nagyobb levelek árnyékában, vagy akár magukon a leveleken is néha. A berendezés tekintetében egyébiránt nem támasztanak különösebb igényeket.

Kedvenc eleségük az élő tubifex, de szívesen fogyasztják a vörös szúnyoglárvát, cyclopsot, artémiát, blackwormot is. Legtöbbször vadonfogott példányok kerülnek forgalomba, esetükben kiváltképp célszerű, ha élő eleséggel tudjuk őket táplálni. Ettől függetlenül azonban elfogyasztják a száraz eleségeket is, a talajra süllyedő lemezes és granulált tápokot, gyorsan szemcsésedő (páncélosharcsáknak készült) táptablettákat is, de ha igazán életerős, vitális halakat akarunk nevelni, akkor a tubifex a legmegfelelőbb eleség. Még a kavicszemcsék közé befurakodó férgeket is nagy ügyességgel tudják kihúzatni.

Az ivarok megkülönböztetése nem könnyű, de a nőstények valamivel nagyobbra nőnek. Az egyik legnehezebben szaporítható páncélosharcsaként tartják számon, csak keveseknek sikerült eddig ívársra bírni és ivadékokat felnevelni tőle, hazánkban is alig néhány tenyésztő mondhatja el magáról, hogy sikerült leívatni őket. Nemzetközi szinten is szegényes az irodalom a *Corydoras granti* szaporításáról, inkább alkalomszerű a sikeressége. Ezekből azt tudhatjuk, hogy viszonylag kevés (kb. 30-40 db), és kis méretű ikrát raknak a nőstények, melyeket üvegre, levelekre ragasztanak. Sajnos az ikrák termékenysége az esetek többségében alacsony. Az ivadékok elúszási ideje rövid, és meglehetősen kicsik, így apró indító elesésre van szükségük. A sikeres tenyésztéshez fontosnak tűnik a nagyon lágy víz, és természetesen a rendszeres hideg vizes vízcserék ennél a fajnál is közrejátszanak az ívás kiváltásában.

A faj neve jóformán ismeretlen még az akvarisztikában, hiszen 2019-ben került leírásra, holott hosszú évtizedek óta tartjuk a fajt akváriumokban, és a közepesen gyakori páncélosharcsák közé tartozik. Az elnevezésbeli tévedés egy közel 80 éves félreazonosítás problémája, ugyanis egészen a 2019-es revízióig ezeket a halakat ismertük *Corydoras arcuatus* néven, és a valódi arcuatusokat a kereskedelem *Corydoras* sp. 'Super Arcuatus' névvel látta el. A tévedést végül Steven Grant tárta fel, s a leíró ichthyológusok tiszteletük jeléül őutána nevezték el a fajt, melyet a C-számok szerint C-20 kóddal vettek jegyzékbe.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Skunk Cory, Arched Cory, .

Egyéb köznevei: Grants Buepansermalle.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#), [Callichthyidae](#), [2019](#), [Corydoras granti](#), [Grant - páncélosharcsa](#), [Tencatt](#), [Lima & Britto](#)

JELLEMZŐK:

[Amerika](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [átlagos növényzetigényű](#), [lassú mozgású](#), [sűrű növényzetigényű](#), [Amazónia](#), [barna vízi](#), [Dél-amerika](#), [békés rajhal](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [fekete vízi](#), [Andok orsz.](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [Peru](#), [Ecuad.-Kol.](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [alsó szint](#), [igenlágynyvízi \(0-5°Nk\)](#), [lágynyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Akvárium Magazin XXII. évf. 116. szám: Liziczai Márk: Álnéven élő halunk - a Corydoras arcuatus Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish** Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish, Supplement 1**

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?species_id=12 <https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/2157>

https://www.scotcat.com/callichthyidae/c_granti.htm <https://www.scotcat.com/articles/article105.htm>

<https://www.seriouslyfish.com/species/corydoras-arcuatus/>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2020-04-01 18:32:34

Legutolsó frissítés: 2020-04-16 13:08:18

Katalógus ID: 10007

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-granti.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva