

Corydoras leucomelas - Feketeúszójú páncélosharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Eigenmann & Allen, 1942
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	5-5,5 cm
C°:	23-26
pH°:	5,5-7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapatos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	nem fenyegetett




Corydoras leucomelas
Feketeúszójú páncélosharcsa
(Eigenmann & Allen, 1942)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Corydoras leucomelas – Feketeúszójú páncélosharcsa elterjedési területe
(Map)



Dél-Amerika nyugati részén általánosan elterjedt, megtaláljuk Peruban, Kolumbiában és Ecuadorban is. Többek között a Rio Ucayali, Rio Napo, Rio Orteguasa, Rio Panayacu, Rio Yasuni és Rio Pacaya vízrendszerében fordul elő. Elsősorban fekete- és barnavizes élőhelyek lakója. A természetben kifejezetten gyakori.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A 9-es leszármazási vonal tagjaként e fajról is elmondható, hogy tömzsi, viszonylag rövid testű, és lekerekített fejformájú. Alapszíne az ezüstöstől a piszkosfehérig terjed, melyen közepes méretű fekete foltok vannak aránylag szabálytalan elrendezésben elszórva. Helyenként e foltok kisebb csíkoskák, vonalakká állnak össze – összességében véve mind formájuk, mind elhelyezkedésük eléggé variábilis. A faj egy vastag és erős színezetű szemsávval rendelkezik. Hátúszójának – ahogyan neve is mutatja – aránylag nagy területe koromfekete, ez lehúzódik a hátra is, de vállfoltja nem túl nagy kiterjedésű. Homlokán előfordulhat némi halványbarnás terület. Fontos, hogy farkúszóján foltok sorozatából álló csíkok vannak jelen, a farok alatti úszón csak egy kevés mintát látunk.

A leginkább a *Corydoras melanistiusszal* és *Corydoras brevirostrisszal* téveszthetjük össze. A *C. melanistius* sokkal kisebb és egyenletesebben elszórt pöttyökkel rendelkezik, emellett farkúszója áttetsző, minta nélküli. A *C. brevirostris*nál már van némi csíkozottság a farkúszón, foltja valamelyest kevesebb, mintázata leginkább a *C. leucomelas* és *C. melanistius* közötti. Gyakran nagyobb vállfolttal, és aránylóan csillogó kopolyfedővel rendelkezik, a homlok területén is intenzívebb az arany szín megjelenése. További hasonló faj még a *C. surinamensis*, de szintelen hátúszója, oldalán hosszanti csíkokká összeálló pöttyei és erős, vastag csíkozottsága a farkúszón egyből árulkodik kilétéről. Az arany tarkófolt nála a legintenzívebb a fenti fajok közül.

További hasonló fajok még a *Corydoras agassizii* és *C. ambiacus*, ám ők hosszabb arcrukról és a markáns szemsáv hiányáról könnyedén felismerhetők. Hasonlóképpen igaz ez a *Corydoras delphaxra* is. A *Corydoras ephippifer* orra is jelentősen megnyúlt, farkúszója szintelen, pöttyei kisebbek és kevesebben is vannak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A feketeúszójú páncélosharcsa gyakran alulértékelt faj, holott csoportban nagyon szépen mutat és tartása is könnyűnek számít. Akváriumban született állatokat kimondottan könnyű gondozni, csapvízben és társas akváriumban is megállják helyüket, kezdőknek is bátran ajánlhatóak. Érdekes tudnunk erről a fajról, hogy a vadonbéli állományait tekintve az egyik legközönségesebb páncélosharcsa, lelőhelyén ezrével fogják őket. Ez is hozzájárul kicsit ahhoz, hogy nem számít túl izgalmas fajnak, a Planetcatfish adatai szerint 2003-ban kolumbiai gyűjtők mindösszesen 7 USA dollárt kaptak 1.000 példányonként! Olcsóságának köszönhetően sokszor ma is vadonfogott állatok kerülnek kereskedelembe. Azt is érdemes viszont szem előtt tartanunk, hogy széles elterjedési területén több más, hasonló küllemű páncélosharcsa is előfordul, és az exportállományok ritkán válogatják át ezeket az ezrével gyűjtött, olcsó harcsákat, így sokszor „pöttyös corydoras” név alatt több faj keveréke jut Európába. A *C. leucomelasszal* együtt elő szokott fordulni a szállítmányokban *Corydoras ambiacus*, *C. agassizii*, *C. gomezi*, néha *C. schwartzi* is, de más hasonló fajok, például *C. delphax* is. Ugyanakkor az is előfordul a kereskedelemben, hogy (szándékos vagy véletlen) félreazonosítás miatt ritkább, értékeesebb faj neve alatt *C. leucomelasok* kerülnek forgalomba.

A faj tartását bátran ajánlom kezdő akvaristáknak is, 65 liternél nagyobb akváriumba nyugodtan kerülhet a faj. Arra ügyeljünk, hogy legalább 6-8 állatot szerezzünk be, hiszen csapatos halak. Társas akváriumokban is kiválóan megállják a helyüket, de természetesen számukra is a legideálisabb egy pontylazacokkal, törpesügérekkel, vitorláshalakkal összeállított társítást. Néha előfordul, hogy diszkoszhalak mellé is beteszik őket, ez azonban nem túl jó ötlet, hiszen e faj nem kedveli a túl magas

hőmérsékletet, lévén élőhelyeinek jó része Andok hegylábaiban található.

Akváriumának berendezését igazítsuk a társhalak igényeihez, ugyanúgy jól érzi magát egy ágakkal-gyökerekkel dekorált akváriumban, mint egy növényesebb összeállításban. Egy dolog azonban nagyon fontos: az aljzat finom homoktalaj legyen, mert a durvább sóder, őrlemények és kövek hamar lekoptatják érzékeny bajuszszálait, ami általában hosszabb-rövidebb időn belül akár a harcsák pusztulásához is vezet. A dekorációt kiegészíthetjük falevelekkel, égetobozokkal – ezek sötétítik és savanyítják a vizet, ami hűen utánozza élőhelyét.

A feketeúszójú páncélosharcsa feketevizes és barnavizes folyók lakója. E vizekben sok az oldott csersav, huminsav, ettől a víz pH-ja alacsony és színe a feketétől a teaszínig terjed. A pH-t akár 5,5-5,8 környékére is levihetjük. Esőerdei faj lévén a lágy vizet szereti leginkább. Hőmérséklet tekintetében a 24-25 °C a legideálisabb számukra, a nagyon meleg vízben rosszul érzik magukat, betegségekre fogékonyabbak, élettartamuk megrövidül. Akváriumokban tenyésztett példányai viszont csapvízben is jól érzik magukat. Jellemző, hogy néha felúszik levegőt nyelni a víz felszínére, béllégző lévén képes bélfalán megkötni a levegő oxigéntartalmát és egyfajta kiegészítő légzésként használni ezt.

Szívesen elfogyaszt bárminemű akváiumi haltápot, legyen az más halak által meghagyott lemezes, granulált eleség, vagy kimondottan páncélosharcsáknak gyártott, gyorsan szemcsésedő tablettás díszhaltápot. Hálásak azonban a kiegészítő élő eledelekért, melyek egyébiránt egészségükhöz is hozzájárulnak: kapjon rendszeresen tubifexet, grindált, televényférgyet, artémiát és/vagy vörös szúnyoglárvát is.

Tenyésztése hasonlóképpen zajlik más páncélosharcsákéhoz. Az ívásra érett halakat csapatban tegyük ki, nőtényenként 2, akár 3 hímre is számítva. A szaporító medencébe kerüljön 24-25 °C-os, enyhén savas és lágy víz, valamint egy jó adag jávai moha. A halak ikráikat vagy a vízinövények közé, vagy egyszerűen csak az üvegfalra helyezik el. Az ikrázást általában eredményesen tudjuk kiváltani, ha egy nagyobb volumenű (60-65 %-os) hideg vizes vízcserét hajtunk végre. Ekkor lehetőleg esővízzel vagy valamelyest lágyított vízzel pótoljunk. Az ikrák lerakása után távolítsuk el azokat a szülők mellől, vagy merjük ki a tenyészállatokat. Az ikrák oxigénellátása legyen erős, érdemes egy kevés Xanthakridint vagy pár darab égetobozt dobni a vizükbe, gátolva ezzel a penészgombák terjedését. 3-4 nap alatt kelnek ki a lárvák, s további 3 napon belül jellemzően megkezdik önálló táplálkozásukat. Ekkor peteburoktól mentes, frissen kikelt sőrak naupliákkal indíthatjuk őket, de mikró férgyet is kaphatnak. Később a nevelésükhöz használjunk vágott tubifexet, grindálférgyet.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Syn: *Corydoras caquetae*.

Eng: False spotted catfish, Blackfin cory

Egyéb köznevei: Schwarzflossen Panzerwels, Sortfinnet Pansermalle, Caracha, Shirui.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Corydoras leucomelas](#), [akvarisztika](#), [Eigenmann](#), [Feketeúszójú páncélosharcsa](#), [1942](#), [Harcsafélék](#), [Callichthyidae](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[Amerika](#), [békés rajhal](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [fekete vízi](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Andok orsz.](#), [alsó szint](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Peru](#), [igenlágynyí \(0-5°Nk\)](#), [mindenevő](#), [Ecuad.-Kol.](#), [lágynyí \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [lassú mozgású](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [barna vízi](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [Dél-amerika](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish** <https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/455>

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?species_id=485

<https://www.seriouslyfish.com/species/corydoras-leucomelas/>

https://www.scotcat.com/callichthyidae/c_leucomelas.htm

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-06-03 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2020-05-04 10:06:42

Katalógus ID: 4121

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-leucomelas.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva