

Corydoras melanistius - Feketecsíkos páncélosharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Regan, 1912
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	5-5,5 cm
C°:	22,0-26,0
pH°:	6-7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	békés, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Corydoras melanistius
Feketecsíkos páncélosharcsa
(Regan, 1912)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Corydoras melanistius – Feketecsíkos páncélosharcsa elterjedési területe
(Map)

Dél-Amerikában honos, fő elterjedési területe Guyana, az Essequibo folyó vizeiben fordul elő. Emellett vannak adatok Francia-Guyanából és Venezuelából is.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hagyományosan elfogadott, évtizedek óta használt magyar neve nem írja le teljesen pontosan harcsánk megjelenését, ugyanis csíkok helyett inkább a finom foltminta jellemzi. Testének alapszíne szürkésbarnás árnyalatú, ebből feje és háta, ami inkább barnás, oldala, hasi régiója pedig inkább ezüstös színű.

Oldalát sok, kicsi, sötétszürke pötty díszíti, a hal testét egyenletesen beborítva. Egy vastag, fekete szemkötővel és egy szintén fekete színű vállfolttal rendelkezik, melynek fekete színe a hátúszóra is ráterjed. Tarkóján találunk egy halványsárgás foltot, kopoltyúfedője is gyakorta aranyló színben csillog. A faj azonosításához nagyon fontos bélyeg, hogy farkúszója teljesen áttetsző, mindenféle mintától mentes.

A leginkább a *Corydoras brevirostrisra* hasonlít, mely szinte teljesen egyező küllemű, farka viszont pettyek sorozatából álló mintákat visel, ez egyértelműen megkülönbözteti. A foltok méretében, elosztásában van még árnyalatnyi különbség, és kicsivel talán még tarkófoltja is élénkebb színű. A *Corydoras leucomelast* nagyobb foltjai – vonalai, intenzívebben fekete hátúszója és alig meglévő tarkófoltja alapján különböztethetjük meg. További hasonló faj még a *C. surinamensis*, de szintelen hátúszója, oldalán hosszanti csíkokká összeálló pöttyei és erős, vastag csíkozottsága a farkúszón egyből árulkodik kilétéről. Az arany tarkófolt nála a legintenzívebb a fenti fajok közül.

További hasonló fajok még a *Corydoras agassizii* és *C. ambiacus*, ám ők hosszabb arcokról és a markáns szemsáv hiányáról könnyedén felismerhetők. Hasonlóképpen igaz ez a *Corydoras delphaxra* is. A *Corydoras ephippifer* orra is jelentősen megnyúlt, farkúszója szintelen, pöttyei kisebbek és kevesebben is vannak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A *Corydoras melanistius* neve jól ismert az akvaristák előtt, régóta használatos a hazai akvarisztikában is. Mindazonáltal közel sem olyan gyakori ez a páncélosarcsa, mint amennyire neve mutatná. Nagyon gyakran összetévesztik a nála markánsabb megjelenésű *Corydoras brevirostrisszal*, s utóbbi fajt árulják *C. melanistius* néven. Emellett a különböző, kisebb fekete foltos páncélosarcsák neveit a kereskedelem sajnos nagyon gyakran következtelenül használja (így a *C. punctatus*, *C. melanistius*, *C. leucomelas* név alatt gyakran más fajok is előfordulhatnak).

Tartása egyebekben nem bonyolult, alapvetően hasonló más páncélosarcsákhoz. Biztosítsunk számukra egy legalább 60-65 literes medencét, melyben legalább 6-8 példányukat helyezzük el, ugyanis csoportos életmódot folytatnak. Más halakkal teljes mértékben békések, akár nano fajok is kerülhetnek mellé. A lényeg, hogy olyan halakkal ne társítsuk, melyek kárt tesznek benne. Akár egy guyanai pontylazacos társításban, akár egy vegyes társas akváriumban megállja a helyét.

Etetése problémamentes, elfogadja a lemezes tápokot, harcsatablettákat és természetesen a fagyasztott eleséget, így például a szúnyoglárvát is. Kedvence az élő tubifex, ha szaporodásra kész, erős halakat szeretnénk nevelni, gyakran adjunk nekik kedvencükből.

A víz hőmérséklete legyen 24-25 °C, kémhatása 6-7 között megfelelő, semleges csapvízben is jól tartható. Ha tudunk, keverjünk vizéhez némi lágy vizet – e célra az esővíz, ozmóvíz, desztillált víz megfelel. Esőerdei hal lévén lágy vizekből származik. Némi tőzeglével vagy égertobozzal teaszínűre festhetjük tartóvizüket, utánozva ezzel a természetes körülményeket. Ne hanyagoljuk el a rendszeres, részleges vízcserét.

Aljzat gyanánt finom homokot válasszunk, mert az éles szemcsék felsebzik és lekoptatják érzékeny

bajuszszálaikat. Némi szegélynövényzet elhelyezésével, egy-két tereptárggyal biztonságos búvó- és visszavonuló helyeket adhatunk harcsáinknak, de egyébként napközben is folyamatosan a talajon kutatnak élelem után.

Szaporításuk nagyon hasonló más páncélosharcsákhoz. A hímek fél-egy centivel kisebbek a nőstényeknél, melyek viszont ikrával teltek. Csapatban tegyük ki őket, ahol a hímek száma meghaladja a nőstényekét. A szaporító akváriumba tegyünk 1-2 marék jávai mohát, és töltsük fel úgy kb. 26 °C-os vízzel. Lehetőleg a szaporítót víz legyen lágy, 10 nk alatti. Hideg vizes vízcserékkel elősegíthetjük az ikrarakás beindulását, de néha nehézkes rábírnunk halainkat a szaporodásra, ilyenkor legyünk türelemmel. A gazdag élő esés, jó vízminőség és az esős évszak imitálása előbb-utóbb meghozza gyümölcsét. Az ikrákat az üvegre, kövekre vagy a növények közé rakják le. Ívás után a szülőket és az ikrákat külön kell választani, mert a kifejlett állatok az ikrák jó részét elfogyasztják. A 3-4 napos kelési időt követően még kb. 3 további nap kell az elúszásig, ezt követően frissen kelt sórákkal, banán- és walterféreggel indíthatjuk a kishalakat.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Syn: *Corydoras wotroi*.

Eng: Bluespotted corydoras, Black-spotted corydoras, Blacksail corydoras, Blackspotted corydoras, Dotted corydoras, Guiana corydoras, Spotted catfish

Egyéb köznevei: Kravepansermalle, Punamonningen, Schwarzbinden-Panzerwels, Kirysek czarnopasy a. czarnopregi, Caracha,.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[1912](#), [Harcsafélék](#), [Callichthyidae](#), [Corydoras melanistius](#), [Feketecsíkos páncélosharcsa](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Regan](#)

JELLEMZŐK:

[lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [mindenevő](#), [átlagos növényzetigényű](#), [lassú mozgású](#), [barna vízi](#), [felsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Dél-amerika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [sárga vízi](#), [alsó szint](#), [Amerika](#), [Guyanák](#), [igenlágyvízi \(0-5°Nk\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [békés rajhal](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Horn Péter, Zsilinszky Sándor: **Akvarisztika** Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish** <https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/453>

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?task=&species_id=311

<https://www.seriouslyfish.com/species/corydoras-melanistius/>

https://www.scotcat.com/callichthyidae/c_melanistius.htm

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-06-04 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2020-05-04 11:23:29

Katalógus ID: 4122

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-melanistius.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva