

Corydoras punctatus - Feketepettyes páncélosharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Bloch, 1794
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	4,5-5 cm
C°:	23-27
pH°:	6-7,5
Nk°:	2-15
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-7 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Corydoras punctatus
Feketepettyes páncélosharcsa
 (Bloch, 1794)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Dél-Amerika: Suriname, Brokopondo régiója. A Suriname folyó folyásvidékén, főleg a Marshal Creekből ismert.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A 9-es leszármazási vonal (In9) névadó faja, legalábbis a morfológiai megkülönböztetés alapján 'Punctatus-csoportnak' szokás nevezni ezt az igen fajgazdag társaságot. Sőt, korábban úgy hitték, az egész Corydoras nemzetség típusfaja (később bebizonyosodott, hogy ez a *Corydoras geoffroy*).

Alapszínezete szürkésfehér, melyen szinte egyenletesen elosztva látunk fekete – sötétszürke pöttyöket. Aránylag sűrűn pöttyözött faj, különösen a fej és a hát régiójában. A hasonszőrű rokonaitól eltérően nincs

fekete sáv az oldalán, bár egy csíkba gyakran állnak össze fekete pöttyök, melyek körül kicsit több a fehér szegély. A hátúszó felső részében egy markáns, sötét fekete foltot visel. A farkúszó foltok sorozataként többszörösen csíkozott, de e csíkok aránylag vékonyak, nem túl markánsak. Az anális úszón és a zsírúszón is lehet ilyen minta.

Számos más páncélosarcsára erősen emlékeztet. Mindközül a leghasonlóbb a *Corydoras cruziensis*, megkülönböztetésük nem egyszerű. E fajnál is az egész test pöttyözött, de valamelyest egyenletesebben, egy kicsivel ritkásabban. Oldalcsík ugyancsak nincs, de a hátúszófolt jelen van. A farkúszóján vastagabb csíkokat találunk. További rendkívül hasonló faj a *Corydoras paragua*, melyet leginkább az alapján tudunk elkülöníteni, hogy a hátúszójának alján van a fekete folt.

Hasonlít még a gyászfoltos páncélosarcsára (*C. julii*), de nála a foltok mindig összeállnak egy csíkká az oldalon, még, ha vékony is. Ugyanez igaz a *C. trilineatusra*, illetve nála hullámvonalszerű a díszítettség, nem foltokból áll. A *Corydoras copei* esetében a *C. punctatus*hoz hasonlóan nincs egybefüggő oldalsáv, de a minta inkább a trilineatust idézi, több rajta a fehér terület. A *C. leopardus* is valamelyest hasonlít rá, de az egybefüggő oldalsó sáv és a megnyúlt arcorr alapján egyértelműen megkülönböztethető, s ezen bélyegek igazak a fenti faj legközelebbi rokonaira is (*C. gomezi*, *C. isbrueckeri*).

A leíratlan fajok között is van néhány, mely hasonló, a legkiemelkedőbb a CW037, mely jóformán megkülönböztethetetlen ránézés alapján. Foltozottsága valamelyest gyengébb. Élőhelye alapján viszont egyértelműen határozható: Brazíliában, a Rio Uruara-ban fordul elő. Valamelyest hasonlóak még a C120, CW050 és CW060. A C120 leginkább a *C. julii*ra emlékeztetve foltos mintájú, a legfőbb különbség, hogy kerekesebb formájú fekete folt helyett szabálytalan alakban mintázott a hátúszója. A CW050 inkább a *C. trilineatusra* hasonlít jobban, de nála hiányzik a hátúszó fekete foltja. A CW060 viszont ismét inkább *C. julii*-szerű, de valamivel sűrűbben foltozott, az oldalcsíkja erős és kontrasztos, farkúszója sűrűn csíkozott.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A feketepettyes páncélosarcsa tartása nem különbözik érdemben más páncélosarcsákétól. Könnyen tartható, nem kényes, betegségekre sem igazán fogékony faj. Mivel csoportos, szociális magatartású, ezért legalább 6-8 állatot vásároljunk belőle és helyezzünk el együtt egy akváriumban. Hasonlóan más páncélosarcsákhoz, könnyen társítható, vegyes társas akváriumokba is kerülhet, mindazonáltal a pontylazacok, törpesügérek, vitorláshalak, kisebb és békés fogaspontyok a legkiválóbb társhalai.

A kedvenc eledele az élő csővájó féreg (tubifex), ha eredményesen szeretnénk szaporítani, akkor fontos lehet, hogy néha megkínáljuk vele, szaporítás előtt pedig nagyobb mennyiségben adjuk. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor szúnyoglárvával, blackwormmal, artémiával, grindállal helyettesíthető. Megegyezően a gyorsan szemcsésedő táptablettákat és az aljzatra lesüllyedő lemezes és granulált díszhaltápot is. Jó szolgálatot tesz azáltal, hogy a pontylazacok és más vízközi halak által meghagyott tápmaradékot is összegyűjti, de mindenképpen teljes értékű étrendet igényel, ne csak maradékon tartsuk!

Az aljzat finom homok legyen, mert a durvább kavicsra, éles sóderen lekopik a bajusza. A sötét talaj remekül kiemeli színeit. Szereti, ha a háttér és szegélyek mentén van némi növényzet, mely közvélemény szerint visszavonulhat pihenni, de legyenek nyílt területek is. Ágakkal, gyökerekkel és falevelekkel élethűen

dekorálhatunk. A természetben homokos-iszapos aljú patakokban fordul elő, aránylag sekély és napsütötte vizekben, ezért jelentősebb árnyékolást nem igényel. Az esős évszakban elárasztott erdei vagy pusztasági területekre is kiúszik. Egy átlagos trópusi akvárium vízértékei (kb. semleges pH, lágyabb-középkemény, szükség esetén csapvíz; kb. 24-25 °C) ideálisnak minősülnek tartásához. Kb. 60 literes űrtartalmú akváriummal megelégszik, mivel nem nő túl nagyra.

A hímek felismerhetőek karcsúbb, vékonyabb, illetve valamivel kisebb testméretükről, ezen kívül pedig mellúszójuk erősebb, hosszabb. A szaporításuk hasonlóan zajlik más páncélosarcsákhoz: csoportosan ívassuk, ahol több a hím, mint a nőstény. Érdeemes kicsit lágyabb (6-10 nk) vízzel próbálkozni, az ívás beindulását pedig az esős évszak modellezésével érhetjük el – naponta cseréljük le a medence vizének legalább felét jóval (6-8 °C-al) hűvösebb vízre. Természetesen szaporítás előtt bőségesen etessük őket. Ikrákat üvegfelületre vagy vízínövények közé teszük le. Ha ez megtörtént, a szülők eltávolíthatóak, az ikrák kb. 3 nap múlva kelnek ki és pár nappal később az ivadékok megkezdik önálló táplálkozásukat. Ekkor frissen kelt artémia naupliákkal indíthatjuk őket, de peteburok ne kerüljön az ivadékok közé, mert azt elfogyasztva bélelzáródást kaphatnak. Később vágott tubifexel kielégítő tempóban nevelhetőek.

A *Corydoras punctatus* névvel viszonylag gyakran találkozhatunk hazánkban is – akár irodalomban, akár a halkínálatot szemlélve. Valójában azonban a nem alaposan beazonosított halak esetében sokszor teljesen más, pöttyös fajokra használják e nevet tévesen. Igazi *C. punctatus* csak kevesek tartanak, s mivel Surinameból ritkábban érkeznek vadonfogott szállítmányok is, valójában egy egészen ritka fajnak tekinthető a hazai akvarisztikában, annak ellenére, hogy neve régóta közismert és használt.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Cataphractus punctatus*

Eng: *Spotted corydoras*.

Egyéb köznevei: Gepunkteter Panzerwels, Hovedbåndspansermalle

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Feketepettyes páncélosarcsa](#), [Corydoras punctatus](#), [Callichthyidae](#), [Harcsafélék](#), [Bloch, 1794](#), [akvarisztika](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[Guyanak](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [igenlágyvízi \(0-5°Nk\)](#), [alsó szint](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [békés rajhal](#), [sárga vízi](#), [Dél-amerika](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [lassú mozgású](#), [átlagos növényzetigényű](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [mindenevő](#), [közepesen aktív mozgású](#), [lassan mozgó vízi](#),

[közepesen áramló vízi](#), [átlátszó vízi](#), [Amerika](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish** <https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/1159>

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?species_id=69

http://www.scotcat.com/callichthyidae/c_punctatus.htm

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-06-05 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2020-04-16 16:45:58

Katalógus ID: 4130

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-punctatus-punctatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva