

Corydoras reticulatus - Hálós páncélosharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Fraser-Brunner, 1938
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	6-6,5 cm
C°:	22-26
pH°:	6-7,5
Nk°:	0-16
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	békés, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Corydoras reticulatus
Hálós páncélosharcsa
(Fraser-Brunner, 1938)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Dél-Amerikában, azon belül Brazíliában és Peruban fordul elő. Viszonylag széles elterjedésű, Brazíliában az Amazonasban is megtalálható (Monte Alegre környékén). Peruban ismert többek között a Rio Ampiyacu, Rio Nanay, Rio Blanco folyókból is.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

6-6,5 cm-re megnövő, robosztus alkatú, gömbölyded fejformájú páncélosharcsa. Alapszíne ezüstös-szürkés, de vannak területi variánsai, melyek inkább barnásba hajlanak, vagy kismértékben zölden csillognak. A fejtető és a hát jellemzően barnább árnyalatú. Testét nevéhez híven hálózatosan díszítik

fekete vonalak, dekoratív külsőt adva ezzel a halaknak. A hálóminta szinte egyedenként változik. A hasoldali úszók jóformán színtelenek vagy csak alig van rajtuk kevés minta, a farkúszó viszont feketén csíkos. Nagyon jellegzetes, hogy hátúszóján viszonylag nagy kiterjedésű, fekete foltot visel.

Egy nagyon hasonló fajt ismerünk, a *Corydoras sodalis*. Nála a test és hálóminta halványabb, kevésbé kontrasztos, de a legfőbb különbség, hogy a *C. sodalis* hátúszójáról teljesen hiányzik a fekete folt. Ez alapján megkülönböztetésük egyértelmű.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A hálós páncélosharcsa tartása nem nehéz, sok más páncélosharcsához hasonló. Akár kezdőknek is ajánlható faj, nem is túl ritka a kereskedelemben. Viszonylag szívós kis halak, az azonban fontos, hogy tartsuk őket csoportosan, ami minimum 6 példányt jelent. A vadonban is nagy csapatokban kutatnak a folyók és patakok alján élelem után. Könnyedén társíthatóak, teljesen békések, a náluk kisebb halakat nem bántják – így tehát csak arra kell ügyelni, hogy a társhalak ne zaklassák a páncélosharcsákat. Kiválóan megfelel pontylazacok, törpesügérek, vitorláshalak mellé.

Táplálása könnyű, a legtöbb akváriumi díszhal-eleséget elfogadja: így megeszi a többiek által meghagyott, talajra süllyedt lemezes és granulált tápok, de a kimondottan harcsáknak készült eleségtablettákat is. Arra ügyeljünk, hogy utóbbiból könnyen szemcsésedő típust válasszunk, ne a vértesharcsáknak való, keményebb fajtát. Mindazonáltal érdemes őket rendszeresen élő és/vagy fagyasztott eleséggel is kínálni, így például élő tubifexel, mely az egyik kedvencük. Úgyesen húzzák ki a kavicszemcsék közül a kis férgecskéket. Kiegészítésként szúnyoglárvát, sórakot, televényférget vagy grindált is kaphatnak.

Fontos, hogy az akvárium aljába finom homokot, puha aljzatot töltsünk, mert a durva és éles szélű szemcsék, kavicsok lekoptatják érzékeny bajuszszálait. Átlagos növényesítés megfelel neki, ha van pár tő, melynek közelébe visszavonulhat pihenni, jól érzi magát. Ágakkal, kövekkel szintúgy dekorálhatunk. Faleveleket is szórhatunk az akváriumba – például tölgyleveleket, melyek kicsit megszínezik a vizet, nyugtatják a halakat és búvóhelyet is adnak. Ha a rendszeres részleges vízcseréket betartjuk, akkor számottevő problémát nem jelent tartásuk. 24-25 °C-on, akár csapvízben is (közepkemény, semleges kémhatású) tarthatjuk, de némi lágyítás nem árt természetesen nekik sem, hiszen amazóniai, esőerdei állatok.

A sikeres tenyésztés alapfeltétele, hogy jól tartott és ivarérett állataink legyenek, ennek eléréséhez különösen jól jön egy élő tubifexel végzett hízókúra. Az íváshoz válasszunk egy kis csapatot, melyben több hím van, mint nőtény. A halakat tegyük külön egy nekik előkészített szaporító akváriumba, melybe teszünk jávai mohát, esetleg 1-2 tő nagyobb levelű növényt. Szivacs szűrőt alkalmazzunk. A vízértékek legyenek a tartás során leírtakhoz hasonlóak, kb. 25 °C, 6,5-7 pH, de érdemes kicsit lágyabb vagy akár esővizet használni. Az ívást beindítani a klasszikus hideg vizes vízcserével általában sikerül, mely az esős évszakot modellezi. Ilyenkor érdemes lehet még lágyabb vizet a medencébe tölteni, ha alapesetben nem tudtuk őket lágy vízbe kitenni. A halak ikráikat jellemzően az üvegre, vagy növények leveli közé rakják, ahonnan azok könnyen begyűjthetőek. A nevelő akváriumba ugyanolyan minőségű víz kerüljön, mint ahol a szülők vannak, de egy kevés égertobozt, esetleg penészedést gátló vegyszert tehetünk bele, és intenzíven mozgassuk a vizet az ikrák körül (pl.: egy porlasztókővel). A kikelés 3-4 napot vesz igénybe, akárcsak az elúszás. Ha ez bekövetkezett, papucsállatkával, rotatóriával indíthatjuk a kishalakat, de már érdemes lehet

próbálkozni frissen kelt artémia naupliákkal is. Később esetleg kaphatnak banán- vagy walterférget is, majd ahogy nőnek, fokozatosan áttérhetünk a vágott tubifexre. Rendszeresen cseréljük vizüket, nehogy leromoljon a vízminőség, az ivadékok ugyanis hajlamosak megbetegedni rossz minőségű, esetleg infuzóriás vízben. A hasoldal gombásodásának elkerülésére egy vékony homokréteget célszerű használni – ezt még a nevelő medence összeállításakor helyezzük be.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn.: -

Eng: *Reticulated corydoras, Network catfish, Network corydoras.*

Egyéb köznevei: *Netpansermalle, Verkkomonninen, Netz-Panzerwels, Nätpansermal.*

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélő](#)

KULCSSZAVAK:

[akvarisztika](#), [Fraser-Brunner](#), [Hálós pánfélőharcsa](#), [1938](#), [Harcsafélő](#), [Callichthyidae](#), [Akváriumi halak](#), [Corydoras reticulatus](#)

JELLEMZŐK:

[Dél-amerika](#), [Amerika](#), [sárga vízi](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [békés rajhal](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [fekete vízi](#), [alsó szint](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Andok orsz.](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [mindenevő](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [lassú mozgású](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [Amazónia](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [barna vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish**
https://www.planetcatfish.com/common/species.php?task=&species_id=257
http://www.scotcat.com/callichthyidae/c_reticulatus.htm <https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/512>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-06-04 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2020-04-24 14:01:02

Katalógus ID: 4133

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-reticulatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva