

Corydoras sodalis - Barát páncélosharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Nijssen & Isbrücker, 1986
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	6 cm
C°:	22-26
pH°:	6-7,5
Nk°:	0-16
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapatos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Corydoras sodalis
Barát páncélosharcsa
(Nijssen & Isbrücker, 1986)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Dél-Amerikában, azon belül is Brazíliában és Peruban fordul elő, bár területi formaváltozatát megtalálták már Bolíviában (Rio Beni) is. Peruban Loreto tartományban, a Rio Yavariban, míg Brazíliában a Rio Solimoes felső folyásvidékén fordul elő.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Tömzsi alkatú, robosztus felépítésű páncélosharcsa, lekerekített fejformával. Leszármazástani viszonyait tekintve a 8-as vonalba, azon belül is a 3-as al-kládba (ln8sc3) sorolják a taxonómusok. Békés viselkedése mellett külseje is indokolhatja magyar nevét: a névadót vélhetően a szerzetesek, barátok öltözékére

emlékeztette a hal jobbára szürke-barna árnyalatokban játszó teste.

Alapszíne egyfajta piszkosfehér, halványszürke, a fej és a hát néha barnás. Ezen sötétszürke színű hálózatos mintát látunk, mely a fejre is ráterjed, és a törzs nagy részét is kitölti. Az oldalvonal mentén egy feketés csík esetleg megjelenhet hosszanti irányban, alatta pedig néhány függőleges irányultságú vonal, de ez nem szükségszerű. A farkúszó sötéten csíkozott, a hátúszón esetleg egy kevés pötty előfordul, a hasoldali úszók viszont jobbára színtelenek.

Egy nagyon hasonló fajt ismerünk, a hálózatos páncélosharcsát (*Corydoras reticulatus*), de esetében a színek némileg markánsabbak. A legfontosabb különbség azonban, hogy a *C. reticulatus* egy nagy, koromfekete foltot visel hátúszóján, míg ez a *Corydoras sodalis*ról teljesen hiányzik.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Könnyedén tartható, szívós páncélosharcsa faj, ennél fogva kezdőknek is ajánljuk tartását. Rendkívül békés, barátságos faj – ahogy azt magyar neve is sugallja – így még társítása sem jelenthet akadályt. Ha nem kerül mellé olyan faj, mely kárt tehet benne, akkor jól érzi magát hasonló igényű fajok társaságában. A nála jóval kisebb halakat sem bántja, akár még nano fajok is lehetnek társhaljai. Gondozásához legalább 65-70 literes medencét válasszunk. Kiválóan illeszkedik egy amazóniai biotópba különböző pontylazacok, sügerek (akár például vitorlášal) mellé. Ha alkalmunk adódik rá, vásároljunk belőle legalább 6-8 állatot, mert csapatos életmódot folytat!

Akváriumának alját finom homokkal töltsük fel, ugyanis az éles szemcsék, durvább kövek csúnyán lekoptatják, akár felsértik bajuszszálait, mely végzetes fertőzésekhez is vezethet. Emellett a bajuszszálak nagyon fontos érzékszervek a harcsák számára: a szaglás, tapintás és ízérzékelés folyamatában is szerepet játszanak. Gyöngykavics sem alkalmas hosszú távú gondozásukhoz. Egyébiránt viszont a berendezésre nem kényesek – kedvükre dekoráljunk gyökerekkel, uszadékokkal, sziklával. Pár tő növényt érdemes a szegélyek mentén legalább elültetni. Élethű dekorációt jelent pár marék falevél az akváriumban: sötétítik, és kissé savanyítják is a vizet, mert cser- és huminsavak oldódnak ki belőlük, továbbá rejtekhelyet is nyújtanak az aljazaton kotorászó harcsáknak.

A vízártékekre nem kényesek, akár csapvízben is sikeresen tarthatóak. 24-25 °C elegendő nekik, semleges kémhatás javasolt. Ha csapvizünk kemény, keverjük hozzá RO-vizet vagy esővizet. Ha nem feledkezünk meg a részleges vízcseréről (kéthetente kb. 20-25%), akkor sokáig gyönyörködhetünk egészséges halainkban.

Mindenféle eleséget elfogadnak, összeszedik a többi hal által meghagyott lemezes tápokot is. A téves közkeletű nézettel ellentétben nem csupán maradék-eltakarító személyzetet jelentenek a páncélosharcsák, teljes értékű táplálást kívánnak. Legalább nekik készülő harcsatablettákkal etessük őket, de legjobb, ha rendszeresen megkínáljuk halainkat élő tubifexel, ennek hiányában grindállal, artémiával, blackwormmal. A bőséges, lehetőleg élő eleség fontos állataink jó kondícióba hozásához, mielőtt tenyészteni próbáljuk őket.

A nőtények nagyobbak, teltebbek a hímeknél. Íváshoz nőtényenként két hím is számoljunk. A szaporító akváriumba töltsünk kb. 25 °C-os, semleges kémhatású, 8-10 nk-s vizet. Helyezzünk be némi

jávai mohát vagy más vízinövényt, és hintsünk kevés homokot is a medence aljára (főleg, ha itt tervezzük nevelni a kishalakat, akik talaj nélkül esetleg gombás fertőzést kaphatnak hasukon). Az ívás beindítására cseréljük 60-70%-ot kb. 18 °C-os vízzel, mely lehetőleg még lágyabb is legyen, mint amiben vannak. Ha nem sikerült kiváltani az ívást, próbálkozzunk még a további napokban is. A hőmérséklet és/vagy a vízminőség hirtelen megváltozása az esős évszakot imitálja, ami ikrarakásra serkenti halainkat. Ha megtörtént az ívás, az ikrákat a nőstény rendszerint az üvegre, vagy a növények levelei közé tapasztja. Ezeket innen begyűjthetjük, vagy a szülőket eltávolíthatjuk – ezt azért szükséges megtenni, mert megeszik ikráikat. A kishalak 3-4 nap alatt kelnek ki, és további kb. 3 nap kell az elúszáshoz. Indítóeleségnek papucsállatkát, rotatóriát, frissen kelt artémiát használhatunk, idővel pedig a vágott tubifexre térjünk át. A vízminőségre figyeljünk, sűrű, kis térfogatarányú vízcsereikkel tartsuk fent, mert a leromló vízre az ivadékok érzékenyek.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn.: -

Eng: *False Network Cory.*

Egyéb köznevei: Sodalis-Panzerwels

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Nijsen](#), [Barát páncélosharcsa](#), [Corydoras sodalis](#), [1986](#), [Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#), [akvarisztika](#), [Callichthyidae](#)

JELLEMZŐK:

[Amerika](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [Dél-amerika](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [sárga vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [békés rajhal](#), [lassan mozgó vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [fekete vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [mindenevő](#), [Andok orsz.](#), [alsó szint](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [lassú mozgású](#), [Peru](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Bolívia](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [Amazónia](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [barna vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish** <https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/503>

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?task=&species_id=120

http://www.scotcat.com/callichthyidae/c_sodalis.htm

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-06-03 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2020-04-24 16:18:36

Katalógus ID: 4138

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-sodalis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva