


Corydoras undulatus - La Plata - páncélosharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Regan, 1912
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	5-5,5 cm
C°:	18-25
pH°:	6-7,5
Nk°:	2-18
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	békés, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Corydoras undulatus
La Plata - páncélosharcsa
(Regan, 1912)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



corydoras_undulatus-map

Argentínában, Buenos Aires tartomány területén fordul elő, a La Plata régió vizeiben (Paraná vízrendszer).

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Az ötös leszármazási vonal (ln5) tagja, az ún. 'Elegans-csoportba' tartozik. Az ide sorolt harcsák közös tulajdonsága a viszonylag kis méret, robosztus alkat, szürkés tónusú színek rácsmintával variálva, illetve az ivari kétalakúság (bizonyos mértékű) megjelenése.

A *Corydoras undulatus* valamelyest robosztusabb megjelenésűnek számít rokonai között, de méretével nem lóg ki a sorból. Tömzsi alkatú, lekerekített fejű faj. Alapszíne piszkosfehér, melyen jellemzően

fekete hálózatos mintát találunk. Az egyik legintenzívebben mintázott faj a rokonságon belül – bár a *C. napoensis*-nél például ez feltűnőbb a nagyobb fehéres foltok miatti kontraszt alapján, összességében a *C. undulatus* teste mutatja általában a legtöbb fekete színt. Oldalukon egy markánsabb fehér csíkot figyelhetünk meg az oldalon mentén. Az 'Elegans-csoport' fajaira általában legalább 2 ilyen világos csík jellemző, e fajnál a felső csík már csupán foltosra alakult, láncszerűen, kis fekete megszakításokkal követik egymást a fehér területek. A fej és a hát jellemzően sötét tónusú, helyenként a rácsvonalak között aranylós foltok előfordulhatnak. Az úszók jellemzően nem színezettek, hímeknél egy kevés minta a hátúszón előfordulhat. A nőstények kevésbé díszesek, sokkalta szürkésebb árnyalatúak, mint a hímek.

Több rokon faj is nagymértékben hasonlít rá:

A *Corydoras napoensis*-ek hasonlóan kontrasztosabb, erősebb színezetűek, de mint az fent említésre került, náluk nagyobb kiterjedésűek a világos foltok. Oldalukon a fekete sávok kivehetőek (gyakran négy is, de három biztosan), a köztük lévő fehér területek egybefüggőek. A jellegzetes aranylós tarkóterületről és a legtöbb példányon (főleg hímeken) megmutatkozó fekete hátúszófoltról felismerhetőek. Hozzájuk nagyon hasonló a *Corydoras bilineatus*, de esetükben kevésbé kontrasztos a rácsminta, inkább a szürke különböző (sötétebb-halványabb) árnyalatai jellemzőek, egyes példányoknál a feji rész egészen egybeolvadóan sötétszürkés. A középső, oldalon menti sáv a farkúszó előtt néha akár folttá szélesedik, de mindenképpen ez a csík a hangsúlyos. Hímek hátúszóján lehet fekete folt itt is, de az aranylós tarkófolt hiányzik.

A *Corydoras elegans* esetében a test felső része végig labirintusszerűen mintázott, mely a vértlemezek mentén az oldalon alá is húzódhat kisebb csíkok formájában. Nála két csíkot láthatunk, egy vastagabb a háton fut, egy pedig az oldalon mentén. Hím példányok hátúszóján jól látható, feketés színű három vízszintes irányultságú csík figyelhető meg. Meglehetősen halványan, de arany terület észrevehető a fejtetőn. A nőstényeinek nagyobb kiterjedésű szürke terület (egy vastag sáv formájában) található az oldalvonal felett, de alatta csík nem jellemző, rácsminta rajtuk alig látszik.

A *Corydoras nanus* nyúlánkabb, karcsúbb megjelenésű, alapszíne is sokszor halványabb. Nála legtöbbször jól látszódik 3 sötét csík az oldalon: a háti és az oldalon menti vastag, erős színezetű, s a harmadik a hasoldalon vékony, halvány. A hátúszó bázisán (a gerinc tájékán) egy fekete csíkot találunk, de az úszó csak halványan mintázott, barnás árnyalattal.

Több leíratlan fajt is ismerünk, melyek nagyon hasonlóak, ezek a következők: C88, C123, C126, C132, CW018, CW044. Mindközül a C88-at a legfontosabb kiemelni, mely leginkább emlékeztet a *Corydoras undulatus*-ra. Fő különbség, hogy nála a felső fehér folt sor összeolvad csíkká, sőt, jól láthatóan hosszabb is, mint az alatta húzódó. Úszói sötétebbek, a test elején nagyobb az összefüggő, nem felszakadozó szürkés terület. A C132 is hasonlít hozzá, de míg a *C. undulatus* sötétebb tónusú, úgy ezek a halak inkább a szürke különböző árnyalataiban játszanak. Az viszont közös, hogy egy világosabb csíkjuk és fölöttük láncszerű mintájuk van, bár utóbbi inkább hullámvonalra emlékeztet, mint szabályos láncmintára.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Déli elterjedésű páncélosharcsa, ezért néhány pontban eltér a tartása a legtöbb *Corydoras*-nál megszokottól. Élőhelye a La Plata vidéke, mely bolygónk egyik legnagyobb torkolatvidéke: a Paranái és az

Uruguay folyamok összefolyásából alakul ki. A vízhőmérséklet télen helyenként akár 10-12 °C-ig is lecsökkenhet (ritkán akár ez alá is), éppen ezért a La Plata – páncélosharcsák jól alkalmazkodtak a hűvös időhöz, sőt, a meleget nem is kedvelik. Ez a nyári kánikulában okozhat némi kellemetlenséget, ilyenkor igyekezzünk vizüket hűteni. Hosszú távú tartásukhoz bőven elég a kb. 22 °C, télen ez alá is mehetünk nyugodtan, egyfajta pihenőidőszak gyanánt (18-20 °C-ra). A hőmérséklet maximuma lehetőleg ne haladja meg a 25-26 °C-t.

A vízminőségre nem különösebben érzékeny, csapvízben is teljesen jól tartható. Ne legyen túl savas a vize, semleges pH ideális számára. Lágytól közép keményig bármilyen vízkeménységet elvisel, ha esetleg túl kemény a vizünk, kicsit lágyítsunk rajta. Etetése is problémamentes, elfogadja az összes akváriumias eleséget, így a harcsatablettákat, talajra lesüllyedt lemezes és granulált eledelket. Mindazonáltal abban hasonlít rokonaihoz, hogy él-hal az élő tubifexért, mely a legkiválóbb eleség páncélosharcsáinknak. Hiányát pótolhatjuk szűnyoglárvával, artémiával, grindállal, televényféreggel.

Az akvárium aljára finom szemcséjű, puha homokot töltünk, hogy ne sérüljenek meg bajuszszálai, melyekkel naphosszat a talajt túrja, élelem után kutatva. Lelőhelyén legtöbbször dús növényzetű helyeken találták meg, ezért érdemes lehet akváriumát sűrűn benövényesíteni. A szegélyek mentén mindenképpen legyen biztonságos menedéket nyújtó növényzet, középtájékra pár nagyobb tövet is elhelyezhetünk. Úszónövényeket használhatunk árnyékolásra. Túl nagy sodrást nem igényel.

Legalább 6-8 példányt vásároljunk belőlük, mert csoportos életmódot folytatnak. Jól társíthatóak, békés halak. Kiváló társaságot jelentenek számukra pontylazacok, elevenszülő fogaspontyok, békésebb sügerek – arra ügyeljünk, hogy olyan hal ne kerüljön mellé, mely kárt tehet benne. Hőmérséklet-igényére mindenképpen fordítsunk figyelmet, ez utóbbi miatt a legtöbb általános társas akváriumba nem megfelelő, de hűvös vizet kedvelő halakkal (például nem csipkelődős fajok a magashegyi fogaspontyok közül, vagy argentinai elterjedésű pontylazacok) szép társítást tudunk összerakni. Fűtetlen szobai akváriumban tartható.

Szaporodása hasonló más páncélosharcsákhoz, érdemes egy 2-3 hónapos, hidegebb téli nyugalmi periódus után ívatni. Ekkor kicsit melegítsük meg vizüket (fokozatosan), etessük őket bőségesen, majd ezt követően jöhet a hideg vizes vízcsere (bátran használjunk 14-15 °C-os vizet, de ekkor hagyjuk visszamelegedni). Ezzel az esős évszak beköszöntét próbáljuk modellezni. Egy nőstényre több hímét számítva tegyük ki őket, és az ikráztató medencébe legyen valamilyen finom levelű vízinnövény, például jávai moha vagy guadeloupai tüskeshínár. A tenyészvíz legyen semleges kémhatású, viszonylag lágy. A szülők ívás után eltávolíthatóak, a kishalak az ikrák lerakásától számítva kb. 6 nap múlva kezdenek el táplálkozni (a fejlődés sebessége függ a hőmérséklettől is). Indító eleségnek frissen kelt sórákot, walter- és banánférget ajánlok, esetleg portápot is kaphatnak. Később vágott tubifexre térhetünk át.

Sajnos az In5 csoport páncélosharcsái között ritkábbnak számít akváriumokban, idehaza nem igazán terjedt el, holott mutatós páncélosharcsáról van szó. Széleskörű terjedését nehezíti a hűvös víz iránti igénye.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Wavy Cory.

Egyéb köznevei: Gewellter Panzerwels, Bølgelinjet pansermalle, Aaltomonningen, Vågpanarmal.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[1912](#), [Harcsafélék](#), [Corydoras undulatus](#), [Callichthyidae](#), [La Plata - páncélosharcsa](#), [Akváriumi halak](#), [Regan](#)

JELLEMZŐK:

[békés rajhal](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Déli kúp](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [mindenevő](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [lassú mozgású](#), [alsó szint](#), [sűrű növényzetigényű](#), [igenlágymű](#), [Amerika](#), [Argentína](#), [lágymű \(5-10 Nk°\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [Dél-amerika](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [átlátszó vízi](#), [sárga vízi](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [közepesen áramló vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish**

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?task=&species_id=509

http://www.scotcat.com/callichthyidae/c_undulatus.htm [https://www.l-](https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/528)

[welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/528](https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/528)

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2020-04-15 15:23:00

Legutolsó frissítés: 2020-04-18 12:23:11

Katalógus ID: 10090

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-undulatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva