

Corynopoma riisei - Tárcsás lazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Gill, 1858
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	6 cm
C°:	23-26
pH°:	6-7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső leginkább
ÉLETTARTAM:	4 év
TERM.VÉD.:	



Corynopoma riisei

Tárcsás lazac

(Gill, 1858)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Corynopoma riisei – Tárcsás lazac elterjedési területe (Map)



Dél-Amerika; Venezuela, Trinidad

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Ezüstös hal, de teste közepén egy sárgás-aranyfényű csík húzódik, bár ez nem mindig feltűnő. Különleges, megnyúlt úszóformációval rendelkezik.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Különleges, kevésbé elterjedt kis lazacféléről van szó. Sűrű növényzetű, 80-100 literes medencében egy 6-8 fős csapatot gondozunk, mellettük bátran tarthatók más lazacok, páncélosharcsák, törpesügérek,

vagy más kontinensről békés halak (bengál díszcsík, törpe szivárványhal, mézгурámi, stb.). A vizük legyen tiszta, bomlástermékmentes. Etetésükre tökéletesen megfelelnek a száraz lemezes eleségek, de hogyha jó kondícióban szeretnénk tartani állatainkat, akkor fontos, hogy élő és fagyasztott eleségekkel is kiegészítsük táplálékukat.

A szaporodás folyamán a hím előrelendíti tárcsa alakú kopolyúfedőjét (a nőtényé tüske végződésű, könnyen megkülönböztethetőek), és feketére változik szegélye. A nőtény miközben ezt megpróbálja megenni, vagy megpiszkálni (valószínűleg tápláléknak nézi), a hím kihasználja az alkalmat, hogy a nőtény tojócsövében hajtsa végre a termékenyítést! A nőtény így több íváson keresztül termékeny lesz, hiszen képes a hím egyed ivarsejtjeit tárolni, tehát későbbi ívásokhoz nincs szükség egy darabig hím jelenlétére. A nőtényt egyedül helyezzük tehát ki, szépen leteszi petéit, majd akár vissza is tehetjük a közös medencébe, akár külön tartva várhatunk a következő ikrarakásra is. 4-5 nappal a lerakás után már vadásznak a kicsik, banán- és walterféreg, sórák lehet az indítóeleségük, könnyen nevelhetőek és gyorsan nőnek. Azért a rendszeres vízcserekről mind a tartás, mind a nevelés fázisaiban ne feledkezzünk meg!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Corynopoma veedonii*, *Nematopoma searlesii*, *Stevardia albipinnis*, *Stevardia aliata*.

Eng: Swordtail Characin, Sword-tailed sardine, Swordfin characin.

Egyéb köznevei: Riises dragefinnefisk, Pikkuleijakala, Pikkuleijatetra, Zwergdrachenflosser, Gruczolowiec niebieskopregi, Sardinita cachete de espada, Liten Drakfena.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Pontylazacok](#), [akvarisztika](#), [1858](#), [Gill](#), [Corynopoma riisei](#), [Tárcsás lazac](#), [Characidae](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[középső szint](#), [Amerika](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [barna vízi](#), [átlátszó vízi](#), [Dél-amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Orinoco](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Guyanák](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [békés rajhal](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [fekete vízi](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-09-07 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-08-04 15:48:16

Katalógus ID: 4445

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/corynopoma-riisei.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva