


Cryptocoryne beckettii - Beckett vízikelyhe

ELSŐ LEÍRÓJA:	Thuill. ex Trim.
CSALÁD:	Araceae
MAGASSÁGA:	10-15 cm
C°:	23-28
pH°:	5,5-7,5
Nk°:	0-20
HELYIGÉNY:	40 liter
TALAJTÍPUS:	sóder, kvarchomok, gyöngykavics
TÁPANYAG:	leginkább gyökéren, mérsékelt tápanyagigényű
ÜLTETÉS:	elől
FÉNYIGÉNYE:	közepes
TERM.VÉD.:	felméretlen




Cryptocoryne beckettii

Beckett vízikelyhe

(Thuill. ex Trim.)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Dél-Ázsia, Srí Lanka (régies nevén Ceylon) szigetének lassan mozgó vizeiben, mocsaraiban őshonos.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Mélyzöld, enyhén hosszúkas, lekerekített levelei vannak. A levelek kezdetben (főleg emers nevelésű példányoknál) egészen ovális, tojásdad alakúak, víz alatt azonban (fénytől függő mértékben) megnyúlhatnak. A szárok vöröses tónusúak, aránylag hosszúak. A levelek széle csak enyhén hullámos. Kiterjedt gyökérrzel rendelkezik.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A *Cryptocoryne wendtii* - csoport tagja, szintén Srí Lankáról származó faj. A srí lankai vízikelyhek könnyen tarthatóak, nem problémás növények, így elterjedtek az akvarisztikában. Ez a faj is körülbelül 60 éve ismert már akváriumokban is! Sokszor - tévesen - külön fajként kezelik triploid változatát, amit *Cryptocoryne petchii* néven árulnak.

Kezdők számára is kitűnő választás, a halak többsége nem bántja, tökéletesen illeszkedik biotóp és társas ázsiai medencékbe is. Remek előtéri, vagy kisebb akváriumok középső régiójának növénye. Kifejezetten külön tápozást nem igényel, de meghálálja a tápsót vagy kiegészítő táptalajt gyökérzónájában. Közepesen gyors növekedési ütemű. Átlagos megvilágítással beéri, ha sok fényt kap, akkor levelei világosabbak, míg kevesebb fény esetén inkább mélyzöldek lesznek. Keményebb, semleges kémhatású vízben is kitűnően gondozható.

Kiterjedt gyökérhálózatot alkot, hosszú fehér gyökereket ereszt. Számos oldalhajtást hoz, melyekkel a rendelkezésére álló teret egy idő után dúsán benövi, de ezen oldalhajtások leválasztásával és dugványozásával szaporíthatjuk is. Emers módon is növeszthető, paludáriumokba alkalmas. Az emers szaporíthatóságuk végett is kedveltek a Srí Lankáról származó fajok az akvarisztikában.

Általában jól beszerezhető vízikehely faj. Rá is jellemző a tipikus "kriptó-betegség", mely általában hirtelen vízminőség-változáskor, vagy áttelepítéskor történik. Ilyenkor a növény pár nap alatt ledobja összes levelét, de később tövéről újrahajt, semmiképp se dobjuk ki a tövet!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Cryptocoryne petchii*

Eng: Beckett's water trumpet

Egyéb köznevei: -

KATEGÓRIÁK:

[Indoausztrál régió növényei](#), [Akváriumi növények](#)

KULCSSZAVAK:

[Indoausztrál régió növényei](#), [Akváriumi növények](#), [Araceae](#), [Beckett vízikelyhe](#), [akvarisztika](#),

[Cryptocoryne beckettii](#), [Thuill](#), [Thuill. ex Trim.](#)

JELLEMZŐK:

[közepes növekedésű](#), [gyöngykavics talaj](#), [állóvízi](#), [átlagos keménységű](#), [barna vízi](#), [mérsékelt növekedésű](#), [kisméretű akvárium 50 literig](#), [előltre ültetendő](#), [Ázsia](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Dél-Ázsia](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [sárga vízi](#), [kicsi \(kisebb 20 cm-nél\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [India](#), [közepesen fényigényes \(500-1000 lux\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Sri-Lanka](#), [mérsékelt tápanyagigényű](#), [közepesen áramló vízi](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [kvarchomok talaj](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [sóder talaj](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

www.aquaticplantcentral.com/forumapc/plantfinder/details.php?id=46

Beküldte: mark24

Katalógusba került: 2012-10-30 13:42:07

Legutolsó frissítés: 2018-01-29 08:13:02

Katalógus ID: 5100

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/indoausztral-regio-novenyei/cryptocoryne-beckettii.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva