

## Cyphotilapia frontosa - Búbos szájköltő sügér

<b>ELSŐ LEÍRÓJA:</b>	Boulenger, 1906
<b>CSALÁD:</b>	Cichlidae
<b>MÉRET:</b>	20-25 cm
<b>C°:</b>	24-27
<b>pH°:</b>	7-8
<b>Nk°:</b>	12-25
<b>HELYIGÉNY:</b>	400 liter
<b>VISELKEDÉS:</b>	közepesen társas (inkább fajon belül)
<b>TÁPLÁLÉK:</b>	ragadozó
<b>TARTÓZKODIK?</b>	összes, leginkább középső
<b>ÉLETTARTAM:</b>	15-17 év
<b>TERM.VÉD.:</b>	nem értékelt



**Cyphotilapia frontosa**

*Búbos szájköltő sügér*

(Boulenger, 1906)

### TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Cyphotilapia frontosa – Búbos szájköltő sügér elterjedési területe (Map)

Kelet-Afrika; Tanganyika-tó

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Nagy, széles fejű, nagy szájú robosztus sügér. Úszói kékesek. Fehér alapszínű testét 4-6 fekete csík díszíti, amik meglehetősen vastagok. A hímek, koruk függvényében, hatalmas zsírhomlokot is növeszhetnek.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nem kimondottan agresszív sügér, de ragadozó mivoltja végett más kishalakat elfogyaszthat. Célszerű nagyobb tanganyikás fajokkal társítani. Csak kellően nagy akváriumban gondozható faj, 4-500 liter alatt ne is ábrándozunk a fajról. Ekkora medencében - más sügérekkel - 1 hímes háremben érdemes tartani, a hárembe nyugodtan telepíthetünk 3 nőtényt is. A természetben csoportosan járnak, akár 30 egyed is összeverődhet. Apró szemű talajt helyezünk medencéjébe, és egy-két kőbarlangot építhetünk, esetleg néhány tő Anubiast ültethetünk. Lomha, nyugodt halak. Nem túl aktív úszók, komótosan teszik dolgukat. Akváriumban jellemzően nem vadászik társhalaira, de a természetben éjszaka könnyen rabol más kisebb fajokra, de férgeket, lárvákat is rostál ki az aljzatból. Jól beakvarizált, közkedvelt és gyakori faj. Etetésére megfelelhetnek a különféle száraz lemezes, granulált, de leginkább nagyhalaknak gyártott sticksek, de élő és fagyasztott eleséget (pl. szűnyoglárva, élő kishal) igényel.

Szaporodása is komótos, nem jellemző a fészeképítés rá. Egy kiválasztott, esetleg kissé megtisztított helyen ívik, a nőtény szájába szedi, 30-50 körüli ikráit, amik durván 3 hét múlva úsznak el. Sórákkal indíthatóak. A szülők nem bántják kicsinyeiket.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Paratilapia frontosa*, *Pelmatochromis frontosus*, *Cyphotilapia frontosus*.

**Eng:** Humphead Cichlid.

**Egyéb köznevei:** Changongo, Pukkelcichlide, Humphead cichlid, Pahkikirjoahven, Tanganjikabeulenkopf.

## KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Boulenger, 1906](#), [Cichlidae](#), [Afrikai sügérek](#), [Búbos szájköltő sügér](#), [Akváriumi halak](#), [Cyphotilapia frontosa](#), [akvarisztika](#)

## JELLEMZŐK:

[nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [Afrika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Kelet-Afrika](#), [alsó szint](#), [közepesen aktív mozgású](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [középső szint](#), [békés viselkedés](#), [felső szint](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [Tanganjika-tó](#), [ragadozó](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [gyér növényzetigényű](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Liziczai Márk

**Katalógusba került:** 2012-10-28 09:01:17

**Legutolsó frissítés:** 2017-03-16 09:39:18

**Katalógus ID:** 4484

**Oldal linkje:** [https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju\\_halak/afrikai-fajok/cyphotilapia-frontosa.html](https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/cyphotilapia-frontosa.html)

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva