

Cyprichromis leptosoma - Sárgafarkú lazacsügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1898
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	13 cm
C°:	23,0-25,0
pH°:	8,0-9,0
Nk°:	9,0-19
HELYIGÉNY:	300 liter
VISELKEDÉS:	területvédő
TÁPLÁLÉK:	planktonevő
TARTÓZKODIK?	felső szint
ÉLETTARTAM:	8-12 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Cyprichromis leptosoma
Sárgafarkú lazacsügér
 (Boulenger, 1898)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Cyprichromis leptosoma – Sárgafarkú lazacsügér elterjedési területe (Map)

A Tanganyika-tóban endemikus, ahol rajban él a mélyebb vizekben.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Nyúlánk testű hal. A fej alsó része halványsárga és egy kis sárga árnyalat előfordul a farokúszó felső részén is. A hátúszó és a farok alatti úszó kékesfekete, belső szegélyük világos színű.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Ezt a békés rajhalat egy tanganyika-tavi biotóp akváriumában leggyakrabban magukban tartják, de társítható néhány más sügérral is. A Tanganyika-tóban a víz felső rétegében élnek. Legszívesebben nagyméretű rajban szeretnek élni, és bár a hímek nem igen túrik meg egymást, nagyobb méretű akváriumokban több példány is tartható. Az akváriumukat takarjuk le alaposan, mert kiváló ugró. Az élő eleséget, planktonot kedvelik, de alkalmanként elfogadják a száraz élelmet is. Legcélszerűbb egy 300 liter körüli medencében egy 10-14 egyedest rajt gondozni, harcsákkal társíthatóak minden további nélkül. A társhalakat meg kell válogatni, de néhány tanganyikai faj, amik inkább a talaj közelében mozognak, jó választás (pl. *Xenotilapia* sp.). Egyes afrikai sügérés társításokban a lazacsügereket a hasonlóan kemény vizet igénylő kalászhallakkal helyettesítik! Érdemes erős szűrést, jó vízmozgást, és sok oldott oxigént biztosítani neki!

Tenyésztése nem túl nehéz. Az ikrázás közvetlenül a vízfelszín alatt történik. A nőtény veszi a szájába az ikrákat, miután a hím azokat megtermékenyítette. 3 hét után a fiatal halak elhagyják anyjuk védelmező száját, és ezután már magukra kell vigyázniuk. Ekkor kezdődhet meg etetésük *Artemia* rákokcsákkal.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Paratilapia leptosoma*, *Limnochromis leptosoma*.

Eng: Bright-Finned Slender Cichlid.

Egyéb köznevei: Gulhalet jumbocichlide, Killiahven.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[akvarisztika](#), [Boulenger](#), [Cichlidae](#), [Afrikai sügérek](#), [1898](#), [Cyprichromis leptosoma](#), [Sárgafarkú lazacsügér](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[Afrika](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlátszó vízi](#), [plankton és detrituszfogyasztó](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Kelet-Afrika](#), [közepesen áramló vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [felső szint](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [nagyméretű 10-20 cm](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [Tanganyika-tó](#), [gyér növényzetigényű](#), [lúgos \(8pH-nál több\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-03-16 09:26:17

Katalógus ID: 4189

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/cyprichromis-leptosoma.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva