

## Danio albolineatus - Színjátzó dánió

ELSŐ LEÍRÓJA:	Blyth, 1860
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	5 cm
C°:	20-25
pH°:	6-8
Nk°:	4-15
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső szint
ÉLETTARTAM:	2-5 év
TERM.VÉD.:	gyakori


**Danio albolineatus**
*Színjátzó dánió*

(Blyth, 1860)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Danio albolineatus – Színjátzó dánió elterjedési területe (Map)

Myanmar, Vietnám, Kambodzsa, Laos, Burma,  
Szumátra és Thaiföld gyors folyású vizei.

Megtalálható többek között a Mekong és Irrawaddy  
folyásaiban is.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A szürkészöld alapszínű faj ivarérett példányai színjátzóak. Testük színe a megvilágítástól függ: oldalvilágításnál, főként ívási időszakban, látványos gyöngyházibolya fényben tündökölnék. A test hátulsó részén vékony aranyó vonal húzódik. Az úszók általában áttetsző zöldek, de alapjuk néha vörös vagy sárga árnyalatú lehet. A nőtények teste teltebb.

Nagyon hasonló faj a kék dánió (*Danio kerri*), de megkülönböztethetőek arról, hogy a színjátzó dánió esetén az aranyos sáv egy vastag csíkot jelent a törzsön, míg a kék dánió esetében általában kettő vékonyabb arany csíkról beszélhetünk. Ezen felül a színjátzó dánió színei jóvalta hivalkodóbbak, mint azt a kék dániónál felfedezhetjük.

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kitűnően ugrik, akváriumát le kell fedni. A háttérben legyen dús növényzet, elöl pedig elegendő kiúszótér. Sötét aljzat mellett még szebbek a színei. Mindenképpen rajban tartsuk! Amúgy különösebben nem igényes, így nem lehet problémás gondozni, még akkor sem, ha nincs túl sok tapasztalatunk, kezdőknek is javasolható, színpompás dániófaj. Arra mindenképpen figyeljünk, hogy vize azért legyen rendesen megsűrve, mert a felgyülemelő károsanyag-tartalmat ő sem kedveli. Akkor érzi igazán jól magát, ha gyorsan áramló, oxigénben dús medencébe kerül, melyet akár lekerekített kövekkel is dekorálhatunk, hasonlatossá téve lelőhelyéhez. Társítása teljesen problémamentes, egy színjátzó dániócsapat egy kisebb (~60 liter) medencében remekül megfér például az ékfoltos razbórával vagy a vörös karcsú díszmárnával néhány párduccsík és palacsinta algázó társaságában, míg nagyobb medencében gurámmal, egyéb díszmárnákkal, sziámi algázókkal is biotopikusan társíthatóak. Természetesen pontylazacokkal is nyugodtan tarthatóak, hogyha egy vegyes társas medencébe szánjuk őket.

Elfogadják a lemezes eledeleket, teljesen jól beakvarizált halak. Arra érdemes figyelni, hogyha csak és kizárólag szárazalattal etetjük őket, színeik megfakulnak, ezért érdemes színtápot használni. De természetesen a legjobb, ha a száraz eledel csak kiegészítő táplálék. Vitalitását és színeit is legjobban akkor őrizzük meg, ha változatos fagyasztott és élő eledeleket etetünk velük, kedvelik a szúnyoglárvát, artémiát, cyclopsot, de a kereskedelemben már számtalan fagyasztott mixet is találhatunk jobbnál jobb eledelkkel halaink számára.

Tenyésztése más dániófajokéhoz hasonlatos, már kevésbé gyakorlott díszhaltenyésztőként is sikereket érhetünk el vele. Legjobb eredményt úgy érhetünk el, ha medencéjükbe, amiben ívatni fogjuk őket, lágy és semeleges kémhatású vizet töltünk, 24-25 C-osan. Jobb eredmény eléréséhez csapatosan is ívathatjuk őket. Az ívató medencébe mindenképp helyezünk ikrarácsot, műfü-talajt vagy nagy adag finom levelű ikrázató növényt, mert a szülők megeszik ikráikat. A halak szabadon szórják az ikrát, nem ragasztják fel külön sehová. Természetesen párban is ikrázatható, de mindenképpen jól tápláljuk őket ívás előtt, lehetőleg élő eledellel. Az ívatómedencében keltsünk áramlást, ami ösztönzőleg hat majd rájuk. Általában kora reggel ívnak. Az ikrák 24-26 óra múltán kelnek ki, majd további pár nap múlva szabadon úsznak. Etetésükre először papucsállatkát használhatunk, de már a frissen kelt sórákkal is megbírkózhatnak.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Brachydanio albolineatus*, *Branchydanio albolineatus*, *Danio albolineata*, *Danio pulcher*, *Danio stoliczkae*, *Danio tweedei*, *Danio tweediei*, *Nuria albolineata*.

**Eng:** Gold danio, Golden danio, Pearl danio, Spotted Danio.

**Egyéb köznevei:** Tiga macam, Danie duhová, Danio duhové, Dánió moulmeinské, Danio perlové, Blá

danio, Hohtoseeprakala, Schillerbärbling, Danio tezewy, Zhemchuzhnyi, Blå Danio, Buncit, Tolu rupa.

## KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1860](#), [Blyth](#), [Danio albolineatus](#), [Színjátzó dánió](#)

## JELLEMZŐK:

[mindenevő](#), [nagyon aktív mozgású](#), [félúgos \(7.5-8 pH\)](#), [felső szint](#), [gyors vízáramlású](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [békés rajhal](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Ázsia](#), [gyér növényzetigényű](#), [Dél-Ázsia](#), [Vietnám](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Indonézia](#), [átlátszó vízi](#), [Szumátra](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Thaiföld](#), [közepes méretű akvárium 50-100 literig](#), [rövid életű 1-3 év](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2009-06-05 09:01:15

**Legutolsó frissítés:** 2017-01-31 22:27:01

**Katalógus ID:** 3949

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/danio-albolineatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva