



Danio kerri - Kék dánió

ELSŐ LEÍRÓJA:	Smith, 1931
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	5 cm
C°:	23-25
pH°:	6,5-7,0
Nk°:	4-12
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Danio kerri
Kék dánió
(Smith, 1931)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Danio kerri – Kék dánió elterjedési területe (Map)

A Bengáli-öböl szigeteinek és Thaiföld nyugati partvidékének folyóvizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Változatos színű, de általában szürkéskék színjászó hal. Főként ívás idején, csillogó oldalán átsejlik finom pasztellkék fénye. Sötét közepű, arany karimájú szemétől két, vékony aranyló vonal fut hátra a faroknyél végéig. Úszói általában áttetsző zöldek, de lehetnek sárgás árnyalatúak is. Az ivari különbségek a hím élénkebb színeiben és a nőtény mélyebb testalakjában nyilvánulnak meg.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nem kapható túl gyakran, de szerencsére az utóbbi időben néha felbukkan. Tartása nem nehezebb, mint mondjuk a színjátészó dánióé. Nagyon hasonló fajok, megkülönböztetésüknel figyeljünk oda. Legbiztosabb beazonosítsi pontjuk, hogy a kék dánió oldalán kettő aranyló csík fut, míg ez a színjátészónál egy vastagabb és élénkebb sávban összpontosul. Ha sötét az aljzat, és esetleg tompított világítást alkalmazunk a szépen növényesített medencénkben, csodás színeket fog mutatni. Rajhal, és remek ugró, medencéjét fedjük. Közepesen áramló, jól szűrt és lehetőleg oxigéndús vízben gondozzuk. Békésen viselkedik más halakkal szemben, ezért egy remek társasági fajt ismerhetünk meg a kék dánióban. Etetésére a száraz tápok is megfelelnek, de egészítsük ki lehetőleg élő és fagyasztott eledelkkel is!

Tenyésztése sem nehezebb lényegesen, mint a hasonló fajoké, lágy és semleges vízbe helyezzük ki a párt vagy csapatot ikrarács fölé. Mindenképpen etessük jóféle eledellel őket ívás előtt, lehetőleg élővel. Az ikrázás kora reggel, hajnalban történhet, az ikrákat szabadon szórják majd - ha tehetik - fogyasztanak is belőle! Ezt megakadályozandó van szükségünk ikrarács által nyújtott védelemre, sőt, amint tehetjük, a tenyészállatokat is távolítsuk el. Az ivadékok elúszásuk után papucsállatkával, frissen kelt artémiával, rotatóriával remekül nevelhetőek!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

bambusz dánió

syn: *Brachydanio kerri* .

Eng: Blue danio.

Egyéb köznevei: Danio modré, Dánió modré, Ø-danio, Hehkuseeparakala, Kultaseeparakala, Inselbärbling, Kerridanio.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [1931](#), [Akváriumi halak](#), [Smith](#), [Danio kerri](#), [akvarisztika](#), [Kék dánió](#)

JELLEMZŐK:

[nagyon aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [gyors vízáramlású](#), [felső szint](#), [békés rajhal](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [barna vízi](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Ázsia](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [Dél-Ázsia](#), [igenlágynyvízi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Thaiföld](#), [lágynyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepes méretű akvárium 50-100 literig](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2017-01-31 22:27:36

Katalógus ID: 3951

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/danio-kerri.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva