Dawkinsia tambraparniei - Bazaltmintás díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Silas, 1954
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	10-12 cm
C°:	18-26
pH°:	6-8
Nk°:	4-15
HELYIGÉNY:	160-180 liter
VISELKEDÉS:	rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	leginkább középső
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	veszélyeztetett



Ezzel a fajjal részletesebben foglalkozunk a következő cikkben:

Dawkinsia tambraparniei
Bazaltmintás díszmárna
(Silas, 1954)

TOVÁBBI KÉPEK:









TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Délkelet-ázsiai elterjedésű, Indiában a Tambraparni folyórendszer lakója.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Szokásos "márna" kinézetű hal, orsó alakú, karcsú testtel. Alapszínezete szürkésfehér, enyhén krémszínű. Testét egy halványfekete hosszanti sáv díszíti, a testközepén, a farktő kezdetén és a farktő végén egy-egy fekete folttal. Úszói szürkések, a fark és fark alatti úszó szegélye piros. Ez a pirosság az ivarérett hímek esetében még intenzívebb lesz, és a háton rozsdás szín jelenik meg. Az oldaluk kifejletten kékeszölden irizál. Hátúszójuk sugarai is kifejlődésükkel együtt megnyúlnak, nagyon szép díszt alkotván halunkon.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Sajnos a fajt nagyon sokáig összetévesztették az aruliusz díszmárnával, és ezen a néven vált közismertté. A valódi aruliusz márnák viszont csak elvétve jelentek meg a hazai forgalomban. Ez a tévedés alig 1-2 éve tisztázódott csak, addig az elfogadott aruliusz díszmárna a kereskedelemben e pompás faj volt. Sajnos még manapság is sok helyen találkozni téves megnevezéssel.

Tartása nem problémás, még kezdőknek is beválik a faj. Hőmérséklet-tűrőképessége meglehetősen tág, akár fűtetlen medencében is tökéletesen jól érzi magát (természetesen szobahőmérsékleten), de a 26-27 C-os trópusi társításokba is alkalmas. A vízkeménységre és pH-ra sem érzékeny, csapvizes medencében is gondozhatjuk, bár némi lágyítást kedvel.

Attraktív, aktív csapathal! Legalább 6-8 állatot szerezzünk be, és 160-180 liter alatti medencébe ne is helyezzük őket. Mozgékonyak, így egy kifejlett csapatnak később lehet, hogy egy 200 literes medence lesz a legoptimálisabb. Aljzatnak sódert töltsünk be, kövekkel, kevés ággal vagy bambuszrúddal dekorálhatunk. Átlagos világítás megfelelő. Szűrés tekintetében erős külső filtrálást javaslok, már csak a medence méreteit tekintve is. Egy kis légporlasztást is használjunk bátran, kedvelik az oxigéndús vizet. Esőztetést is használhatunk, mivel szívesen lubickolnak szemben az áramlatokkal.

A növényesítést tekintve a nagyon gyenge levelű fajokat kerüljük, mert friss hajtásait megcsipkedhetik. Amúgy Cryptocorynek, Echinodorusok, Anubiasok, Vallisneriák, Nomaphilák, és hasonló fajok teljesen optimálisak mellé. Etetésére a száraz tápok is alkalmasak, de igazi szépségét és vitalitását élő és/vagy fagyasztott eledelek mellett éri el, kapjon rendszeresen artémiát, szúnyoglárvát, tubifexet!

Társítani könnyű, békés hal, más pontyfélék (dániók, razbórák, márnák, talajlakó pontyfélék), csíkhalak, akár gurámik megfelelő társa lehet, de szivárványhalakkal, vagy biotópidegen elevenszülőkkel, nagyobb lazacokkal is egybekerülhet társas akváriumában. Tökéletesen alkalmas egy bemutató, nyilvános akváriumba.

Tenyésztése is megoldott akváriumi körülmények között. A nemek jól megkülönböztethetőek, párban vagy csapatosan tegyük ki egy relatíve nagy ívató medencébe, amibe ikrarácsot helyezünk, ami azért fontos, hogy megvédjük az ikrákat, ivadékokat szüleik falánkságától. Lágy, semleges közeli víz kerüljön e medencébe, kevés jávai mohát vagy más ikráztató növényt is betehetünk az akváriumba. Ívás után a szülőket emeljük ki, és várjuk meg az ivadékok elúszási idejét is (az ikrák lerakásától számított 2-3 nap), majd frissen kelt artémiával, papucsállatkával, cyclopsszal indítsunk. Az infusoriásodást kerüljük! Tágas helyen napi kétszer legalább etessük meg őket, és a víz frissességéről rendszeres részleges vízcserékkel gondoskodjunk!

Sajnos a faj a vadonban már veszélyeztetett, ezért óvjuk és védjük őket, tartásuk során próbáljunk minél optimálisabb feltételeket és körülményeket teremteni, és ha lehetőségünk van rá, tenyésszük is e pompás fajt!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Puntius tambraparniei, Puntius arulius tambraparniei*.

Eng.: "Arulius" barb

Egyéb köznevei: -

KATEGÓRIÁK:

Pontyfélék, Akváriumi halak

KULCSSZAVAK:

Akváriumi halak, 1954, akvarisztika, Bazaltmintás díszmárna, Dawkinsia tambraparniei, Silas, Cyprinidae, Pontyfélék

JELLEMZŐK:

hidegvízű élőhelyek (5-20°C), átlagos növényzetigényű, India, normálméretű akvárium 100-200 literig, nagyméretű 10-20 cm, közepes hőigényű 20-25°C, Ázsia, átlátszó vízi, Dél-Ázsia, közepesen keményvízi 10-15°Nk, sárga vízi, féllúgos (7.5-8 pH), közepesen áramló vízi, nagyon aktív mozgású, félsavas (6-6.5 pH), közepesen aktív mozgású, gyors vízáramlású, normál (6.5-7.5 pH), mindenevő, békés rajhal, igenlágyvízi (0-5°Nk), középső szint, lágyvízi (5-10 Nk°), átlagos élethossza 3-6 év.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk
Katalógusba került: 2013-09-15 09:01:18
Legutolsó frissítés: 2017-08-03 20:28:16
Katalógus ID: 4520
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/dawkinsia-tambraparniei.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva