

Devario aequipinnatus - Óriás dáníó

ELSŐ LEÍRÓJA:	Jerdon, 1849
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	9-11 cm
C°:	18-25
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	5-12
HELYIGÉNY:	150 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Devario aequipinnatus

Óriás dáníó

(Jerdon, 1849)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Devario aequipinnatus – Óriás dáníó elterjedési területe (Map)



Leginkább Észak-Indiában gyakori, de megtalálható még Nepálban, Bangladesben, Thaiföldön és Myanmarban is. A közepesen gyorsan folyó vizek lakója.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Nagyon karcsú és hosszúra nyúlt alakú, oldalt erősen lapított. A felsőállású szájon egy igen rövid bajuszszál pár látható; egy további pár csökevényes, vagy teljesen hiányzik. Az oldalvonal enyhe ívben fut. Hazájában 15 cm, akváriumban max. 12 cm hosszúra nő.

Citromtól narancssárgáig terjedő alapon több acélkék hosszanti csík húzódik, amelyek a kopolyúfedők

mögött feloldódnak és rövid keresztsávokat alkotnak. A hím karcsúbb és színesebb, mint a nőstény, a hosszanti csíkok a felső farok-úszólebenyben húzódnak. A nőstény hosszanti csíkjai egyenesen futnak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A *Devario* fajok nagyon elevenek, békés természetűek, társas tartásra alkalmasak. A méretüknek megfelelő bármilyen élő- és száraz-eleséget elfogadnak. Tartásuk hasonló a pontyfélék többségéhez. Mindenképpen rajban tartjuk, hiszen a dáníófélék közé tartozik, legalább 6 egyedet. Társításuk problémamentes, teljesen alkalmasak egy átlagos társas medencébe is, de egy dél-ázsiai biotóp, vagy akár egy hűvösebb vizes ázsiai medence lakói is lehetnek. Tartására a 23-24 C közötti hőmérséklettartomány a legoptimálisabb huzamosabb időre. Arra ügyeljünk, hogy olyan fajok ne kerüljenek mellé, melyek veszélyesek rá (pl. nagytestű agresszív sügerek), vagy amiket elfogyaszthat (törperazbórák például). A nyugodt, lassú halakat, mint amilyen a vitorláshal is, zavarhatja.

Mindenképpen tágas, nyílt vízterületre van szükséges, hogy jól érezze magát, és ehhez egy tágas kiúszóternek kell társulnia. Háttérnövényzetnek ültethetünk pár tő valliznériát, előtérbe pedig kisebb *Cryptocoryne*-kat helyezhetünk, de mindig legyen sok helye az úszásra. Lekerekített kövekkel, fűzágakkal dekorálhatunk. A tiszta vizet kedveli, nem tolerálja túl jól, ha megemelkedik a károsanyag-tartalom. E célból rendszeresen (kéthetente) cseréljük le vizének úgy egyharmadát, valamint célszerű külső szűrőt alkalmazni. Habár lelőhelyén nem a legsebesebb patakok lakója, az áramlást kedveli, ezt ne feledjük, de esetleg nem a legmagasabb teljesítményre kell a szűrőt állítani. A víz legyen oxigéndús!

Tenyésztéskor nagyobb medencére és frissvíz-utántöltésre van szükség. Az ívást többnyire a nőstény kezdeményezi, s heves kergetőzés után a reggeli órákban szokott lefolyni. A nászjátékok néha igen kecsesek és tetszetősek, főleg egymás körül keresztbe forognak, és az úszóikkal legyezgetnek. Az ikra kifecskendezése néha úgy következik be, hogy a hím egy kis ideig átöleli a nőstényt. A párok a rajban találhatnak egymásra. A dáníók nagyon termékenyek, a tenyésztőnek azonban védenie kell az ikrákat a szülőktől, mert erősen ikrarablók.

Ez a faj rettenetesen hasonlít a [[malabári dáníóra](#)], megkülönböztetésük már szinte lehetetlen, mivel gyakran egybe is ívnak! Próbáljuk meg a lehető legalaposabban megkülönböztetni őket! Ennek a fajnak testszíne erősebben kék, egy picivel magasabb hátfelépítésű, és gyakran több lehet a sárga minta, akár csík formájában is testén. A farkúszó színezettsége valamiképpel gyengébb lehet, de ez hangulatifüggő is egyben. Teste kicsit nyúltabb is. Jelen pillanatban sajnos megkülönböztetésük szinte lehetetlen, és ezt még több, bár ritkábban előforduló, hasonló faj is nehezíti (pl.: *D. devario*, *D. regina*)! Támpont, hogy a malabári dáníónál a test türkiz színe egy csík formájában a farkúszón folytatódik, míg az óriás dáníó esetében ez akár teljesen hiányozhat!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Danio aequipinnatus*, *Danio aequipinnulus*, *Danio lineolatus*, *Leuciscus aequipinnatus*, *Leuciscus lineolatus*, *Perilampus aequipinnatus*, *Pteropsarion aequipinnatus*.

Eng: Giant Danio.

Egyéb köznevei: Chebli, Kæmpedanio, Stor danio, Turkoosiseeparakala, Malabaricus, Malabarkärpfling, Bidaryelesaslu, Bidrele-saslu, Trey changwa, Bhitte, Danio malabarski, Selaiparavai, Vannathipodi.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1849](#), [Devario aequipinnatus](#), [Jerdon](#), [Óriás dáníó](#), [Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[átlátszó vízi](#), [Thaiföld](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [sárga vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [nagyon aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [gyors vízáramlású](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [felső szint](#), [békés rajhal](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [gyér növényzetigényű](#), [Ázsia](#), [India](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Dél-Ázsia](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-29 14:11:26

Katalógus ID: 3956

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/devario-aequipinnatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva