

Devario malabaricus - Malabári dáníó

ELSŐ LEÍRÓJA:	Mcclelland, 1839
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	8 cm
C°:	18-24
pH°:	6-7,5
Nk°:	5-15
HELYIGÉNY:	150 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Devario malabaricus

Malabári dáníó

(Mcclelland, 1839)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

India délnyugati része és Srí-Lanka hegyi patakjai.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Nagyon karcsú és hosszúra nyúlt testű, oldalt erősen lapított. A felsőállású szájon egy igen rövid bajuszszál pár látható; egy további pár csökevényes, vagy teljesen hiányzik. Az oldalvonal enyhe ívben fut. Hazájában 15 cm, akváriumban 10 cm hosszúra nő.

Citromtól narancssárgáig terjedő alapon több acélkék hosszanti csík húzódik, amelyek a kopolyúfedők mögött feloldódnak és rövid keresztsávokat alkotnak. A hím karcsúbb és színesebb, mint a nőstény, a hosszanti csíkok a felső farok-úszólebenyben húzódnak. A nőstény hosszanti csíkjai egyenesen futnak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A malabári dáníó mind kinézetre, mind tartásra, mind tenyésztésre igen hasonlatos az óriás dáníóhoz. Megkülönböztetésük is igencsak nagy kihívás, sőt mondhatjuk, a kereskedelmi példányok esetén már lehetetlenség, hisz a két fajt gyakran egybeívatják - akár akaratlanul is. Vad egyedeknél a támpont az, hogy az óriás dáníó elterjedési területe Észak-India, Nepál, Thaiföld vidékére esik, míg a malabári dáníó Dél-India, Srí Lanka régiójában honos. Kinézetre szinte semmi különbséget nem fedezhetünk fel, esetleg a farkúszón látszódnó csík ami segíthet. A malabári dáníó esetében ugyanis a test középső régiójának türkizzöld színe többé-kevésbé erőteljesebben folytatódik a farkúszón, míg az óriás dáníók esetében csak igen halványan vagy semennyire sem látszik. Beazonosításukat nehezíti, sőt akár még keveredhetnek is rokon fajokkal, mint amilyen a *Devario regina*, *D. devario*, *D. acrostomus*, *D. assamensis*.

A *Devario* fajok nagyon elevenek, békés természetűek, társas tartásra alkalmasak. A méretüknek megfelelő bármilyen élő- és száraz-eleséget elfogadnak. Célszerű azért az élő és fagyasztott kiegészítés, hogy vitalitásukat és színeiket megőrizték. Tartásuk hasonló a pontyfélék többségéhez. Mindenképpen rajban tartsuk, hiszen a dáníófélék közé tartozik, legalább 6 egyedet. Társításuk problémamentes, teljesen alkalmasak egy átlagos társas medencébe is, de egy dél-ázsiai biotóp, vagy akár egy hűvösebb vizes ázsiai medence lakói is lehetnek. Arra ügyeljünk, hogy olyan fajok ne kerüljenek mellé, melyek veszélyesek rá (pl. nagytetű agresszív sügérek), vagy amiket elfogyaszthat (törperazbórák például). A nyugodt, lassú halakat, mint amilyen a vitorláshal is, zavarhatja.

Mindenképpen tágas, nyílt vízterületre van szükséges, hogy jól érezze magát, és ehhez egy tágas kiúszótérnek kell társulnia. Háttérnövényzetnek ültethetünk pár tő valliznériát, előtérbe pedig kisebb *Cryptocoryne*-kat helyezhetünk, de mindig legyen sok helye az úszásra. Lekerekített kövekkel, fűzágakkal dekorálhatunk. A tiszta vizet kedveli, nem tolerálja túl jól, ha megemelkedik a károsanyag-tartalom. E célból rendszeresen (kéthetente) cseréljük le vizének úgy egyharmadát, valamint célszerű külső szűrőt alkalmazni. A víz legyen oxigéndús és a szűrő teljesítményét fokozhatjuk is, hisz a gyors folyású vizeket kedveli, szívesen lubickol az áramlatokban.

Tenyésztéskor nagyobb medencére és frissvíz-utántöltésre van szükség. Az ívást többnyire a nőstény kezdeményezi, s heves kergetőzés után a reggeli órákban szokott lefolyni. A nászjátékok néha igen kecsesek és tetszetősek, főleg egymás körül keresztbe forognak, és az úszóikkal legyezgetnek. Az ikra kifecskendezése néha úgy következik be, hogy a hím egy kis ideig átöleli a nőstényt. A párok a rajban találhatnak egymásra. A dáníók nagyon termékenyek, a tenyésztőnek azonban védenie kell az ikrákat a szülőktől, mert erősen ikrarablók.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Danio malabaricus*, *Danio micronema*, *Eustira ceylonensis*, *Paradanio aurolineatus*, *Perilampus aurolineatus*, *Perilampus canarensis*, *Perilampus ceylonensis*, *Perilampus malabaricus*, *Perilampus mysoricus*, *Puntius malabaricus*.

Eng: Malabar danio.

Egyéb köznevei: Saldanikana, Chebli, Danie malabarská, Danio malabarské, Danio stejnopruhé, Danio

velké, Malabarbarbe, Malabardanio, Siniseepprakala, Malabarbärbling, Ozhukkilatti, Balakimoru, Balooki, Ballandhu, данио малабарский, Gigantskiy danio, Rath kailaya, Malabardanio, Kaili, Keyal meen, Selvaiparavai, Vannathipodi.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Malabári dáníó](#), [McClelland](#), [Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#), [1839](#), [akvarisztika](#), [Devario malabaricus](#)

JELLEMZŐK:

[közepes hőigényű 20-25°C](#), [gyors vízáramlású](#), [átlátszó vízi](#), [békés rajhal](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [felső szint](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [gyér növényzetigényű](#), [átlagos növényzetigényű](#), [India](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [Sri-Lanka](#), [Ázsia](#), [Dél-Ázsia](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [nagyon aktív mozgású](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-29 14:09:28

Katalógus ID: 3955

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/devario-malabaricus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva