

## Dicrossus filamentosus - Kockás törpesügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Ladiges, 1958
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	6-8 cm
C°:	23,0-25,0
pH°:	5,0-7,0
Nk°:	5-8
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	békés, társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



**Dicrossus filamentosus**

*Kockás törpesügér*  
(Ladiges, 1958)

### TOVÁBBI KÉPEK:

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Az Orinoco-vidék folyói.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Arról kapta a nevét, hogy oldalán két vízszintes sorban négyszögletes, sötét foltok húzódnak. A foltok egyik oldalán oldalfényben jól látható kékes vonal fut. Az úszók piros pöttyösek, szegélyük világoskék és megnyúlt sugarakban végződnek. A szem alatti vörös vonal az orrtól a kopolyúfedőig ér.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Félénk faj, leginkább lágy, savas vízben, kövek és növények között érzi jól magát. A legjobb trióban tartani, azaz egy hímeket két nősténnyel. Az élő táplálékot szereti, de alkalomadtán a száraz élelmet is

elfogadja. Elég békés, de főleg szaporodáskor kissé agresszív. A faj érdekessége, hogy a nőstények hasi úszói az első ívás után élénk pirosak lesznek. Az ívás általában egy félreeső, megtisztított lapos berendezési tárgyra történik, erre rakják 50-100 ikrájukat. Az ikrákat a nőstény gondozza. Elúszás után az ivadék elég kis méretű, ezért az első pár napon kis méretű eleséggel tápláljuk, és ha már kissé felcseperedtek *Artemia naupliusszal* könnyen felnevelhetőek. A nőstény elkergeti a hímeket is az ivadékok környékéről. Rossz anyaság a túltenyésztett, leromlott halaknál fordulhat elő. A vörös úszó csalogatóan hat az ivadékokra, a nőstény így kordában tarthatja őket.

Leginkább lazacokkal, páncélos- és algázó harcsákkal szoktuk őket társítani. Ekkora medencében (80 liter) más törpesügéért ne helyezzünk mellé, nagyobb akváriumban lehetséges. Gyakran cseréljük a vizet részlegesen, szereti az erős biológiai tisztítást, esetleg Tebang-leveles, égetobozos vízkezelést is. A dús növényzet fontos, rejtőzködik. Legyenek búvóhelyek is, például kőbarlangok, kókuszshéjak. Amúgy békés és félénk. Biztonságérzetét és színezetét növeli, ha aljzata sötét, és a megvilágítás tompított (úszónövényzettel, vagy gyengébb világítási erővel)

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Crenicara filamentosa*, *Dicrossus filamentosa*.

**Eng:** Checkerboard lyretail, Chessboard cichlid, Lyrefinned checkerboard cichlid.

**Egyéb köznevei:** Lyrehaleskakbratcichlide, Ruutuakara, Gabelschwanz-Schachbrettcichlide, Schackbrädescichlid.

## KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Ladiges](#), [Amerikai sügérek](#), [Cichlidae](#), [Akváriumi halak](#), [1958](#), [akvarisztika](#), [Dicrossus filamentosus](#), [Kockás törpesügér](#)

## JELLEMZŐK:

[félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Dél-amerika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [Orinoco, savas \(6pH alatt\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Guyanák](#), [alsó szint](#), [közepesen áramló vízi](#), [fekete vízi](#), [békés viselkedés](#), [lassan mozgó vízi](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [lassú mozgású](#), [Amerika](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [barna vízi](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2008-05-14 09:01:16

**Legutolsó frissítés:** 2017-02-01 17:03:53

**Katalógus ID:** 4190

**Oldal linkje:** [https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju\\_halak/amerikai-fajok/dicrossus-filamentosus.html](https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/dicrossus-filamentosus.html)

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva